11290/A
E. XIV
18/

Pirated reprint
of 4th ed.

ARNAULT de NOBLÉ.

Felizet
Paris 09

LE MANUEL
DES DAMES
DE CHARITÉ,
OU
FORMULES DE MEDICAMENS
FACILES A PRÉPARER,

Dreſſées en faveur des Perſonnes charitables, qui diſtribuent des Remédes aux Pauvres dans les Villes & dans les Campagnes :

Avec des Remarques pour faciliter la juſte aplication des Remedes qui y ſont contenus ;

UN TRAITÉ ABREGÉ DE LA SAIGNÉE,

Et un Extrait de pluſieurs Remedes choiſis, tirés des EPHEMERIDES D'ALLEMAGNE.

SIXIEME EDITION,

Revûe, corrigée, & augmentée de la Deſcription des Maladies.

A PARIS,
Chez DEBURE, l'aîné, Quai des Auguſtins, à l'image Saint Paul.

M DCC. LXII.
Avec Aprobation & Privilège du Roi.

Rogationem Contribulati ne abjiciat, & non avertas faciem tuam ab Egeno.

Ecclesiastic. cap. 4. v. 4.

Ne rejettez point la priere de l'Affligé; & ne détournez point votre visage du Pauvre.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

AVIS
DU LIBRAIRE.

CET Ouvrage eſt ſi important, & il eſt d'une ſi grande conſéquence qu'il ſoit exact & correct, que nous avons cru devoir prendre des précautions pour en empêcher la contrefaçon. On ſçait que les Livres que l'on contrefait dans les Pays étrangers ou dans les Provinces, s'impriment toujours à petits frais & à la hâte ; qu'ils ne peuvent être revus par l'Auteur, & que le plus ſouvent on ne ſe donne pas même la peine d'en confier la correction à des perſonnes entendues & attentives : de-là vient que ces Editions contrefaites ſont toujours fautives ; quelquefois même elles fourmillent de fautes. Or, on conçoit de quelle importance il eſt pour le Public qu'il ne s'en gliſſe aucune, du moins eſſentielle, dans un ouvrage de la nature

de celui-ci ; une mépriſe, une erreur ; une doſe de plus ou de moins dans la Formule d'un médicament, peut devenir une faute capitale, & cauſer la mort.

A MONSEIGNEUR PAJOT,

CHEVALIER, CONSEILLER du Roi en ſes Conſeil, Maître des Requêtes Ordinaire de ſon Hôtel, Honoraire, & Intendant de Juſtice, Police & Finances en la Généralité d'Orléans.

MONSEIGNEUR,

En *Vous preſentant ce petit Ouvrage notre deſſein n'eſt pas d'entreprendre votre éloge. Content de mériter les louanges qui ſont dues à la ſupériorité de votre Génie, & aux qualités éminentes dont vous êtes orné, Vous ne ſouffrez qu'avec peine qu'on vous les faſſe apercevoir. Le ſeul motif qui nous fait prendre la liberté de vous le preſenter, eſt de faire connoître au Public, que les Conſultations gratuites que nous avons établies en faveur des Pauvres, & pour l'uſage deſquels ce Livre*

eſt fait, ſont une ſuite de vos vues pour le bien de cette Ville, & que dans la fonction d'Intendant que vous y rempliſſez avec tant de diſtinction & d'une maniére ſi avantageuſe pour toute notre Province, le Pauvre & le Riche ſont également l'objet de vos ſoins. Nous eſpérons, MONSEIGNEUR, *que Vous voudrez bien continuer vos bontés pour cet établiſſement, & que le même eſprit qui vous l'a fait deſirer, vous engagera à le rendre ſtable. Le Collége, de ſon côté, ne negligera rien pour ſeconder vos intentions dans un projet auſſi utile, & par-là mériter l'honneur de votre Protection.*

Nous ſommes avec le plus profond reſpect.

MONSEIGNEUR,

Vos très-humbles & très-obéiſſans Serviteurs,
ARNAULD DE NOBLEVILLE, Médecin ordinaire du Roi.
SALERNE, Corréſpondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris.
LOIRE' DU PERRON, de la Société Littéraire d'Orléans.
VILLAC DE LAVAL.
HARDOUINEAU, Médecin des Hôpitaux militaires à Namur.
GUYON.
LE MONNIER.

PRÉFACE.

QUOIQU'IL ait paru jusqu'ici plusieurs Ouvrages dans le goût de celui qu'on donne aujourd'hui au Public, on a cependant lieu de penser qu'aucun de ces Ouvrages n'a suffisamment rempli son objet. Les uns sont pleins de Remedes très-composés, difficiles à préparer & fort chers; ce qui jette dans beaucoup de dépense, embarrasse les Personnes charitables, qui par leur état ne sont point Artistes, & demande un tems considérable, que d'autres occupations ne permettent pas quelquefois de donner. D'ailleurs, toutes ces Préparations composées & fort cheres, tournent le plus souvent en pure perte: car pour peu qu'on soit au fait du service des Pauvres, on sçait combien il est difficile de les assujettir à prendre aucun Remede, & qu'ils n'en demandent que pour obtenir d'autres charités qu'ils n'auroient point sans cela; de sorte qu'ils les laissent perdre, lorsqu'ils le peuvent faire sans qu'on s'en

aperçoive, ou lorſqu'ils n'en reçoivent pas un ſoulagement aſſez prompt. On doit donc avoir attention de ne chercher pour eux, autant qu'il eſt poſſible, que des Remedes faciles à prendre, faciles à préparer, & de peu de dépenſe. Ces derniers n'en ſont pas pour cela moins bons; & l'expérience prouve tous les jours, que les plus ſimples & les plus communs produiſent ſouvent les meilleurs effets. Auſſi s'eſt-on attaché dans cet Ouvrage à n'en preſcrire aucun qui ne pût ſe trouver aiſément ſous la main, ou dont les préparations ne fuſſent communes chez les Apoticaires, & à les décrire tous d'une façon ſi claire, que les perſonnes les moins verſées dans l'Art de la Pharmacie, puſſent en préparer chez elles la plus grande partie.

D'autres Auteurs en preſentant pluſieurs Remedes contre une même maladie, embarraſſent ſi fort pour le choix, qu'on ne ſçait auquel donner la préférence; & comme dans ce mêlange il s'en trouve quelquefois d'inutiles, & même de dangereux, c'eſt ſouvent par ceux-ci que l'on commence; ce qui rebute le Malade par l'inutilité ou le mauvais effet du Médicament, & lui fait

refuſer enſuite ceux qui pourroient le guérir.

On a évité ce nouvel inconvénient, en ne donnant le plus ſouvent qu'un ſeul Remede pour chaque indication; ce qui détermine tout-d'un-coup les perſonnes qui ne ſont pas en état de choiſir ſur différentes Recettes, à celle qui convient le mieux à la ſituation preſente du Malade.

On a de plus ajoûté des Notes au bas des Formules qui pouvoient ſouffrir des réſerves, afin que leur uſage ne fût jamais ſuivi d'aucun accident, & l'on eſpere qu'au moyen de ces Régles les perſonnes prudentes diſtingueront facilement les cas où le Remede peut être donné avec ſûreté. On a banni de ces Notes toutes théories de Médecine; elles ſupoſeroient dans les perſonnes pour qui ce Livre eſt fait, des connoiſſances d'Anatomie & de Phyſique, dont elles ne ſe piquent pas : il leur faut une Médecine ſenſible, exacte, & de pure pratique; leur en propoſer davantage, ce ſeroit les embarraſſer, & leur faire perdre le fruit de ce petit Ouvrage.

La Saignée & la Purgation ſont,

comme on ſçait, les deux principaux Remedes de la Médecine, & preſque les ſeuls qu'on puiſſe employer auprès des Pauvres ; on a cru que quelques Réfléxions ſur l'uſage des différentes Saignées ne ſeroient point ici hors d'œuvre, & qu'elles aideroient les perſonnes qui les pratiquent, à les faire avec plus de diſcernement. Les fautes qui ſe commettent en ce genre, ne ſont pas legéres ; une Saignée déplacée cauſe ſouvent la mort, ou jette le Malade dans une ſituation fâcheuſe, dont on a bien de la peine à le tirer. Il eſt donc néceſſaire d'en avoir au moins des notions générales, qui puiſſent guider dans les cas ordinaires, & qui faſſent ſentir la néceſſité d'un Médecin dans ceux qui ſont embarraſſans. Ces réfléxions ſont tirées des Ecrits de pluſieurs ſçavans Médecins *, & l'on peut aſſurer qu'elles ſont le précis de ce qu'on a dit de meilleur ſur cette matiere.

Enfin, on a joint à ces Formules un Tarif de tous les Remedes compoſés qui y entrent. Ce Tarif n'a été réglé que ſur le prix des Drogues que pluſieurs Apoticaires de Paris, & d'autres

* Meſſieurs Aſtruc, de Courcelles & Martin.

Villes du Royaume, fourniſſent depuis quelques années à des Perſonnes charitables en faveur des Pauvres ; ainſi il ne doit point ſervir de régle pour le Public. On ne croit pas d'ailleurs que perſonne ait droit de s'en plaindre, puiſque la choſe n'eſt pas nouvelle. Pluſieurs Médecins * ont donné en différens tems de pareils Tarifs ; & même depuis quelques années les Médecins de Prague ont donné au Public un Volume *in-folio*, tant en Latin qu'en Langue vulgaire, qui ne contient que le prix des Médicamens ſimples & compoſés qui ſe vendent chez les Droguiſtes & les Apoticaires de cette grande Ville : enſorte que tout le monde peut ſçavoir aiſément ce que telle ou telle Drogue doit coûter, ſans qu'on puiſſe la ſurfaire ; ce qui eſt certainement d'une grande utilité pour le Public, & qui dans ce cas-ci eſt d'autant plus néceſſaire qu'il s'agit de ménager les charités deſtinées pour les Pauvres, qu'on peut apliquer à leurs uſages en bien des maniéres differentes.

* M. Guibert, *le Médecin charitable*, 1660. M. Lemery. *Dictionnaire des Drogues ſimples*, 1714. Tarif des Médecins de Prague, 1737.

Quoique cet Ouvrage ne ſupoſe point de Médecins, il ne faut pas cependant s'imaginer qu'on doive ſe paſſer de leur avis, lorſqu'on peut l'avoir facilement. Ce ſeroit tenter Dieu, & ſortir de l'ordre, que de ne les point conſulter, puiſque c'eſt ordinairement par leur moyen qu'il opére la guériſon des maladies. Il n'y a que des perſonnes ignorantes & orgueilleuſes qui puiſſent penſer autrement, & qui par une routine de quelques années de mauvaiſe Pratique s'imaginent être en droit de décider affirmativement dans les cas même les plus épineux: auſſi n'eſt-ce point pour ces Perſonnes que ce Livre eſt fait; mais pour ces Ames ſimples & charitables, qui craignent toujours de mal faire, qui demandent des avis, & les ſuivent volontiers. On eſt perſuadé que le Seigneur, qu'elles ne perdent jamais de vue, les dirigera dans les cas difficiles, & qu'elles réuſſiront dans une œuvre qu'elles n'exercent que par amour pour le Prochain, & dans la vûe d'accomplir la Loi, dont la plénitude eſt la Charité.

AVERTISSEMENT

Sur la Seconde Edition.

LA premiere Edition de ce petit Livre a été reçue ſi favorablement du Public, qu'on a tout lieu d'eſpérer que celle-ci ne lui fera pas moins de plaiſir. Quoique le fond de l'Ouvrage ſoit le même, les changemens conſidérables que l'on y a faits le rendront encore plus utile aux Perſonnes charitables pour leſquelles il eſt deſtiné. Preſque toutes les Remarques en ont été été étendues & éclaircies ; & comme il y a en différens endroits du Livre, & ſous differens titres, pluſieurs Remedes qui concourent enſemble, & qui doivent être employés dans la même maladie, on les a tous raprochés ſous un même point de vue, afin que d'un ſeul coup d'œil on pût voir tout l'uſage que l'on peut faire du Livre pour les cas particuliers ; ce qui conſtitue une methode curative abregée pour chaque maladie, & fait beaucoup mieux ſentir l'utilité de l'Ouvrage. De plus, l'expérience ayant fait connoître depuis la premiere Edition plu-

sieurs bons Remedes, dont on a eu occasion de faire usage, on les y a ajoutés, ou substitués à d'autres qui ont paru moins sûrs, & qu'on en a retranchés. On trouvera dans cette nouvelle Edition le Tarif des Drogues plus étendu qu'il n'étoit : on doit à ce sujet rendre à Messieurs les Apoticaires d'Orléans, où ce Livre a d'abord paru, la justice de dire qu'ils se sont portés avec zele à rendre service aux Pauvres, en se bornant aux prix qui y sont taxés ; on est persuadé que les autres Apoticaires du Royaume chez qui cet Ouvrage a pû pénétrer, ont agi de même, & qu'ils ont bien senti que c'étoit le seul intérêt des Pauvres qui avoit engagé à le publier, & non pas, comme quelques-uns d'eux l'avoient d'abord pensé, l'envie de détruire une profession aussi utile au Public ; mais qui malheureusement tombe tous les jours, par le grand nombre de gens qui s'ingérent de la faire sans en avoir la science ni le caractere.

Nous finirons cet Avertissement en répondant à la plainte que quelques personnes nous ont faite, que nos Remedes étoient souvent trop chargés d'ingrédiens, quoique nous eussions promis de n'en donner que de simples & de faciles à prépa-

rer ; nous leur répondrons que ce que nous en avons fait a été pour la commodité du Public. Si nous n'euſſions mis que deux Plantes dans les Tiſanes, Apozêmes, Bouillons, &c. où ſouvent nous en mettons quatre, on n'auroit peut-être pas trouvé facilement ces deux Plantes, ce qui auroit embarraſſé pour faire le Remède ; mais en mettant pluſieurs qui ont à peu près la même vertu, on peut ne prendre que celles que l'on trouve aiſement ſous ſa main, & le Médicament aura toujours le-même effet. Il faudra ſeulement avoir attention d'augmenter les doſes des Plantes dont on ſe ſervira, à proportion de celles qu'on aura retranchées. Il en eſt de même des Potions & des Juleps, dans leſquels entrent des Eaux diſtillées : ſi l'on manque de ces Eaux, on pourra y ſubſtituer l'infuſion d'une pincée des Plantes qui les compoſent ; cela reviendra à peu près au même : les Malades ſeroient fort heureux, ſi les Ordonnances des Médecins n'étoient jamais falſifiées plus dangereuſement.

AVIS AU LECTEUR.

Sur cette ſixieme Edition.

L'Accueil favorable que le Public a fait à cet Ouvrage, nous a engagés à donner à cette nouvelle Edition toute la perfection dont nous l'avons crue ſuſceptible. Pluſieurs Perſonnes nous ayant repreſenté que les Remédes que nous donnons pour chaque maladie, en ſupoſoient la connoiſſance, ce qui n'arrivoit cependant pas toujours, puiſqu'il étoit même fort ordinaire que les perſonnes qui commençoient à pratiquer la Médecine, ne ſçavoient pas faire la différence des unes avec les autres, & étoient fort embarraſſées pour ne les pas confondre ; qu'ainſi il paroiſſoit néceſſaire, pour ne leur rien laiſſer à deſirer, de donner la deſcription des maladies, pour leſquelles nous propoſons des Remédes : nous avons cru devoir aquieſcer au ſentiment de ces perſonnes ; & nous avons inſéré dans chaque Remarque une courte deſcription de la maladie dont il y eſt parlé. Nous avons rendu cette deſcription autant ſuccinte qu'il nous a été poſſible, pour ne point trop groſſir ce Volume : cependant nous croyons n'y avoir rien omis d'eſſentiel, & que le tableau de chaque maladie eſt aſſez frapant, pour qu'on puiſſe non-ſeu-

lement la reconnoître avec facilité, mais encore ne la pas confondre avec aucune autre. Par ce moyen les personnes les moins instruites seront en état d'apliquer utilement nos Remédes, & d'éviter toutes les mépriſes qui ſont ici d'une extrême conſéquence. Les autres changemens que nous avons faits dans cette Edition, conſiſtent en quelques corrections & additions de nouveaux Remédes dont l'expérience nous a fait reconnoître l'utilité. M. de Laſone, célébre Médecin de la Faculté de Paris, & de l'Académie Royale des Sciences, nous en a bien voulu communiquer quelques-uns, que nous avons placés ici pour le bien du public, & dont nous lui marquons avec plaiſir notre juſte reconnoiſſance.

EXPLICATION

De quelques termes de Médecine qui ſont répandus dans cet Ouvrage.

A

Abſorbans, Matiére poreuſe & ſpongieuſe, qui s'imbibe aiſément de ſels, de liqueurs, &c.

Acides, Sels pointus, piquans, inciſifs, pénétrans.

Acrimonie, Acreté.

Affections ſoporeuſes, Maladies dans leſquelles les Malades ſont toujours aſſoupis.

Album Rhaſis, Onguent vulgairement apelé *Blanc-Raiſin*.

Altérant, Remedes qui cauſent quelque changement évident, ſoit dans les parties ſolides, ſoit dans les humeurs, & ſans évacuation manifeſte.

Alvéole, Trou ou Cavité de la Machoire qui reçoit une Dent.

Amulette, Sorte de préſervatif empyrique, Remede externe, ou Topique, qu'on aplique ſur quelque Partie du corps.

Anévryſme, Tumeur cauſée par un ſang artériel épanché.

Anodyns, Remedes adouciſſans, qui apaiſent les douleurs, ou qui opérent doucement.

Aorte, c'eſt la grande Artére qui ſort du cœur, & qui porte le ſang par ſes ramifications dans toutes les Parties du corps.

Apéritifs, Remedes qui levent les embarras ou obſtructions des viſcéres.

Aphthes, Petits ulcéres qui occupent le plus ſouvent la Bouche, les Lévres & l'Oéſophage.

Aſthme humide, Maladie du Poumon, où l'on touſſe & où l'on crache beaucoup, à la différence de l'Aſthme ſec, dans lequel on touſſe beaucoup ſans cracher.

Aſtringens, Remedes qui reſſerrent & qui fortifient.

Atonie, Relâchement d'une Partie, dont le ton eſt détruit ou forcé.

B

Béchiques, Remedes pectoraux, & proprement ceux qui apaiſent la Toux.

Bourbillon, Pus épaiſſis qui ſort d'un Clou ou Furoncle.

Bronches, Parties qui entrent dans la compoſition du Poumon.

C

Cachexie, Altération vicieuſe des humeurs.

Cachochymie, Amas de mauvaiſes humeurs.

Calcul, Pierre dans la Veſſie.

Calmans, Remedes qui rétabliſſent le cours du ſang dans ſon ordre, & qui donnent de la tranquillité.

Cardialgie, Douleur au creux de l'Eſtomac, avec anxiété, nauſées, vomiſſement.

Carminatif, Remede propre pour chaſſer les Vents.

Céphalique, Remede propre pour les Maladies de la Tête.

Chyle, c'eſt un ſuc blanchâtre, prove-

Hypocondres, Parties internes du Ventre, au deſſous des côtes.

Hypocondriaque, Malade dont l'indiſpoſition vient du vice des Hypocondres.

Hiſtériques, Remedes ou Maladies concernant les Vapeurs.

I

Inciſer, diviſer, atténuer.

Indication, c'eſt la connoiſſance d'une maladie, & de ſes accidéns, qui indique ou fait choiſir les Remedes propres pour la guérir.

Interſtice, Intervalle.

L

Laſſitude ſpontanée, eſt celle qui naît de quelque cauſe interne, ſans avoir été occaſionnée par aucun mouvement du corps.

Laxatif, Remede qui relâche.

Lépre, Maladie de la peau, avec des ulcéres croûteux par tout le corps.

Levains mauvais de l'Eſtomac, Impuretés de l'Eſtomac.

Lienterie, Sorte de Dévoiement dans lequel on rend les Alimens comme on les a pris, ou à demi-digérés.

Lochies, Vuidanges ou évacuations qui ſuivent les Accouchemens.

Luter, Luter un vaiſſeau dans le ſens qu'on l'entend ici, c'eſt mettre dans l'endroit où le couvercle ſe joint au bord du vaiſſeau, un tour de pâte qui, étant ſéchée, empêche l'évaporation de la matiére qu'on y a mis infuſer ou bouillir.

Lymphe, Suc aqueux, doux & ſpiritueux, qui nourrit les Parties, & qui

eſt contenu dans des vaiſſeaux particuliers, apelés Lymphatiques.

M

Magdaleons, Rouleaux d'Emplâtres formés en cylindre, ou bâtons longs comme le doigt.

Maladies aigues, Maladie vive qui ſe termine promptement.

Maladie chronique, Maladie longue, qui dure quelquefois des mois, & même des années.

Malaxer, Ramollir & paîtrir des Drogues, pour les rendre plus unies, plus molles, & plus coulantes.

Malléole, Cheville du pied.

Manie, Aliénation d'eſprit, ou délire avec fureur.

Maraſme, Conſomption, amaigriſſement ou dépériſſement total, maigreur exceſſive.

Menſtrues, Flux menſtruel, Régles, c'eſt l'évacuation ſanguine qui ſe fait tous les mois dans le Sexe.

Météoriſme, Elévation ou Gonflement du Bas-Ventre.

Mézentére, Membrane qui eſt au milieu des Inteſtins, & à laquelle ils ſont attachés.

Minoratif, Purgation douce & legére.

Mucilagineux, onctueux, gluant.

Mucoſité, Humeur viſqueuſe & onctueuſe, qui enduit intérieurement les Inteſtins, la Veſſie, & d'autres Parties, pour empêcher les ſels d'y faire des impreſſions douloureuſes.

Muſcle, Faiſceau épais de fibres; ou fi-

lets charnus, capables de s'allonger & de s'accourcir. Les muscles sont les auteurs des mouvemens du corps.

N

Narcotique, Remede qui fait dormir.

Nausée, Envie de vomir, dite vulgairement Mal de Cœur.

Nitre, Salpêtre.

O

Obstruction, c'est un embarras dans les vaisseaux causé par un épaississement d'humeurs, qui empêche les liqueurs d'y couler.

Oedême, Bouffissure.

Ophthalmie, Inflammation de l'Oeil.

Oscillation, Mouvement d'ondulation, de dilatation & de contraction des Fibres, des Membranes, des Vaisseaux.

P

Parois, Surface interne de l'Estomac, des Intestins, de la Vessie, & des autres Parties du corps qui ont des cavités.

Paroxisme, Accès ou Redoublement.

Péripneumonie, Fluxion de Poitrine.

Phthisie, Maladie qui desséche les Poumons, & tout le corps, & qui est accompagnée d'une grande langueur.

Placenta, ou Arriere-Faix.

Plethore, Surabondance de sang.

Pleure, Membrane, ou Peau qui tapisse intérieurement la Poitrine.

Premieres Voies, ce sont l'Estomac & les Intestins pris ensemble, ou les prémiers couloirs qui reçoivent les sucs alimenteux.

R

Raports nidoreux, Raports qui ont une odeur de brûlé, de pourri, ou d'œufs couvis.

Rigidité, Roideur.

S

Sang couenneux, Couleur & consistence de sang ordinaire dans les maladies inflammatoires, ressemblant à une Couenne de Lard.

Sanie, Matiére aqueuse sanguinolente, qui sort d'un Ulcére.

Saphêne, Veine qu'on ouvre quand on saigne du pied.

Schirre, Tumeur glanduleuse, dure & sans douleur, causée par l'épaississement des liqueurs.

Sécrétion, Séparation de quelque liqueur.

Sédiment, Dépôt qui se fait au fond du verre, où l'on a mis reposer de l'Urine; on l'appelle briqueté, lorsqu'il est rouge comme de la brique pilée.

Séroſité, Partie aqueuse du sang.

Somnifére, Reméde propre pour procurer le sommeil.

Spaſme, Convulsion.

Sudorifiques, Remédes qui excitent les sueurs.

Syncope, Perte de connoissance.

T

Ténesme, Epreinte, douleur causée au Fondement par une matiére âcre, qui donne de fausses envies d'aller à la selle.

Ton, Etat de fermeté naturelle de chaque partie du corps.

Topique, Reméde qui s'applique exté-

rieurement, comme un Collyre, un Cataplasme.

Trachée-Artére, le canal de la respiration, qui va du fond de la bouche dans les Poumons.

Tubercules, ce sont de petites tumeurs glanduleuses, remplies d'une humeur épaisse, répandue sur la surface & dans la substance du Poumon qui, quand elles viennent à supurer, produisent la Phthisie pulmonaire : on apelle ces Tubercules crûs, quand ils ne sont pas encore supurés.

V

Vermineux, qui est produit par des Vers.

Viscéres, Parties principales du corps, destinées à quelques fonctions propres & principales, comme le Foie à la bile, le Cerveau aux esprits, &c.

Visqueux, Gluant, glaireux.

Ulcére ichoreux, Ulcére qui rend un pus clair, séreux, mal digéré.

Ureiére, Canal qui conduit l'Urine du Rein dans la Vessie.

LISTE ALPHABETIQUE

DES MEDICAMENS,

Tant ſimples que compoſés, qui entrent dans les Formules ci-deſſous;

Avec le Tarif du Prix des Drogues ſimples, étrangéres, & des Médicamens compoſés.

Absinthe.
Æthiops minéral, 7 *ſols* l'once.
Aigremoine.
Alkekenge.
Aloès hépatique, 1 *liv.* 5 *ſols* la demi-liv.
Soccotrin, 8 *ſols* l'once.
Alun purifié, 2 *ſols* l'once.
Amandes douces.
Ancolie.
Anis.
Antimoine crû, 4 *ſols*
Antimoine diaphorétique, 8 *ſols*
Arcanum duplicatum, ou Sel de *duobus*, 5 *ſols* } l'once.
Armoiſe,
Arrête-bœuf.
Aſperge.
Aſſa fœtida, 10 *ſols* l'once.
Aunée, ou *Enula Campana.*
Avoine.

B

BArdane, (Grande)
Baume d'*Arcœus*, 5 *ſols* l'once.
Beaume de ſouffre Térébenthiné, 8 *ſols* l'once.
Baume tranquille, 5 *ſols* l'once.
Becabunga.
Bec-de-Grue *ou* Herbe à Robert.
Bétoine.
Beurre.
Blanc de Baleine, 2 *liv.* la demi-liv.
Bol d'Arménie, 18 *ſols* la demi liv.
Borax raffiné, 8 *ſols* l'once.
Boullon blanc.
Bouis, *ou* Buis.
Bourrache.
Bryone, *ou* Couleuvrée.
Bugloſe

C

CAmomille Romaine.
Camphre, 10 *ſols* l'once.
Canelle, 4 *liv.* la demi-liv.
Canthariides, 5 *ſols* l'once.
Capillaire.
Carotte.
Caſſe en bâton.
Caſtoreum. 15 *ſols* l'once.
Cerat de Galien, 3 *ſols* l'once.
Cerat Diapalme, 3 *ſols* l'once.
Cerfeuil.
Céruſe. 12 *ſols* la liv.
Chardon-Roland.
Chardon à Foulon.
Chélidoine, (Grande) *ou* Eclaire.
Chicorée ſauvage,
blanche.
Chien-dent.

Chou rouge.
Cinnabre, 10 *sols* l'once.
Cire jaune *ou* Vierge.
Cire blanche.
Citron.
Cochenille.
Cochlearia, ou Herbe aux cuillers.
Colophane.
Coloquinte, 5 *sols* l'once.
Concombre sauvage.
Confection *Hamech*, 50 *sols* } la demi-liv.
Alkermès, 50 *sols* }
d'Hyacinthe, 50 *sols* }
Conserve de Kynorrhodon, 30 *sols* la demi-liv.
Conserve de Fumeterre, 30 *sols* la demi-liv.
Conserve liquide de Roses rouges, 22 *sols* la demi-liv.
Consoude, (Grande)
Coquilles d'Huitres préparées, 6 *sols* } l'once.
Corail rouge préparé, 6 *sols* }
Coralline, 3 *sols* }
Corne de Cerf, 2 *sols* }
Craie préparée, 2 *sols* }
Crême de Tartre, 6 *sols* la demi-liv.
Cresson de Fontaine,
de Jardin *ou* Alénois.
Croisette.

D

Diagréde, 30 *sols* l'once.

E

Eau-de-vie camphrée, 30 *sols* la pinte.
de Chaux.
de Vie.
Vulnéraire. 50 *sols* la pinte.

Eau diſtillée de Canelle, 3 *liv.* la chop.
de Canelle orgée, 45 *ſols* la chop.
de Cériſes noires, 30 *ſols* la pinte.
de Chardon-beni, 25 *ſols* la pinte.
d'Euphraiſe, 25 *ſols* la pinte.
de Fleurs d'Orange, 25 *ſols* la chop.
des Fleurs de Tilleul,
de Fleurs de Sureau,
de Fenouil,
de Laitue,
de Lis,
de Méliſſe,
de Menthe,
de Morelle,
de Pariétaire,
de Pavot rouge, Ponceau *ou* Coquelicot,
de Plantain,
de Renouée, *ou* Centinode,
de Roſes,
} 25 *ſols* la pinte.
Ecorce intérieure du Sureau.
Electuaire *Diaſcordium*, 10 *ſols* l'once.
Diaphenic, 30 *ſols*
Diaprun ſolutif, 30 *ſols*
Catholicon double, 30 *ſols*
Lénitif fin, 20 *ſols*
} la demi liv.
Ellébore blanc, 2 *ſols* l'once.
Emplâtre de Céruſe, 24 *ſols*
de Ciguë, 30 *ſols*
de *Diachylon gommé*, 30 *ſols*
de Mélilot, 25 *ſols*
de *Minium*, 20 *ſols*
de Nuremberg, 36 *ſols*
Oxycroceum, 30 *ſols*
de Vigo, 40 *ſols*
Véſicatoire. 30 *ſols*
} la demi liv.

Encens, 15 *sols* la demi-liv.
Esprit de Sel Ammoniac, 10 *sols* l'once.
de Vin, 25 *sols* la chop.
de Vin camphré, 36 *sols* la chop.
Volatil de Corne de Cerf, 30 *sols* l'once.
Euphorbe, 2 *sols* l'once.
Extrait de Geniévre, 4 *sols* l'once.
de Lierre terreſtre, 20 *sols* l'once.
d'*Opium* ou Laudanum ſolide, 15 *sols* le gros.
de Véronique, 20 *sols* l'once.
de Tuſſilage *ou* Pas d'âne, 25 *sols* l'once.

F

Farine de Féves.
de Froment,
de Seigle.
Fénugrec.
Figues graſſes.
Filipendule.
Fleurs de Benjoin 4 *sols* le gros.
de Souffre, 6 *sols* la demi-liv.
de Sureau.
de Troëſne.
Follicules de Séné.
Fougére mâle.
Frailier.
Fumeterre

G

Galbanum, 10 *sols* l'once.
Gayac.
Génévrier.
Gingembre, 2 *sols* l'once.
Gomme Adragant, 25 *sols* la demi-liv.
Ammoniac, 10 *sols* l'once.
Arabique, 8 *sols* la demi-liv.

Gomme Elemi.
Gutte, 10 *ſols* l'once.
Tacamahaca, 45 *ſols* la demi-liv.
Graine de Lin.
de Kermès.
Graiſſe de Porc, *ou* Sain-doux.
Guimauve.

H

Héble.
Hiére-picre, 5 *ſols* l'once.
Houblon.
Houx. (Petit)
Huile d'Amandes douces, 20 *ſols* la demi-liv.
de Camomille, 15 *ſols* la demi-liv.
de Laurier, 15 *ſols* la demi liv.
de Lin, 20 *ſols* la demi-liv.
de Lis, 15 *ſols* la demi-liv.
de Gérofles, 50 *ſols* l'once.
de Millepertuis, 15 *ſols* la demi-liv.
de Noix, 6 *ſols* la demi-liv.
d'Olives.
Roſat, 15 *ſols* la demi-liv.
de ſuccin, 10 *ſols* l'once.
de Tartre par défaillance.
de Térébenthine, 8 *ſols* la demi-liv.
de Vers de terre, 20 *ſols* la demi-liv.
Hydromel ſimple.
compoſé.
Hyſſope.

I

Jalap, 6 *ſols* l'once.
Ipécacuanha, 20 *ſols* l'once.
Iris de notre Pays, *ou* Flambe de Florence, 2 *ſols* l'once.

K

Karabé *ou* Succin, 4 *sols* l'once.
Kermès minéral, 20 *sols* le gros.

L

Laitue.
Lard.
Lavande.
Laudanum liquide de Sydenham, 25 *sols* l'once.
Lierre terreſtre.
Lilium de Paracelſe, 30 *sols* l'once.
Limaille de Fer, 3 *sols* la demi-liv.
Litharge, 12 *sols* la demi-liv.
Lis des Vallées, *ou* de Muguet.

M

Macis, 4 *sols* le gros.
Manne,
Marjolaine.
Mauve.
Mélilot.
Méliſſe.
Mercure crû, 3 *liv.* la demi-liv.
doux ſublimé ſix fois, 20 *sols* l'once.
précipité blanc, 10 *sols* l'once.
Miel blanc, *ou* de Narbonne.
Mercurial, 12 *sols* } la
Roſat, 15 *sols* } demi-
Violat, 12 *sols* } liv.
Millepertuis.
Minium, 3 *sols* l'once.
Morelle,
Moutarde.
Myrrhe, 40 *sols* la demi-liv.

N

Navet.
Noix de Galle.

Muſcade.

O

Oeillet rouge, *ou* Noble.
Oignon blanc.
de Lis.
de Scille.
Ongue it *Album Rhaſis*, 2 *ſols* 6 *den.* l'once.
de la Mere, 3 *ſols* l'once.
de Céruſe, 3 *ſols* l'once.
de *Pompholyx*, 4 *ſols* l'once.
Ægyptiac, 5 *ſols* l'once.
Enulé, 25 *ſols* la demi-liv.
Napolitain. 20 *ſols* la demi-liv.
Populeum, 15 *ſols* la demi-liv.
Roſat, 15 *ſols* la demi-liv.
Supuratif, *ou Baſilicum*, 18 *ſols* la demi-liv.
de Styrax, 30 *ſols* la demi-liv.
de Tuthie, 12 *ſols* l'once.
Véſicatoire, 30 *ſols* la demi-liv.
Opiate de Salomon, 8 *ſols* l'once.
Orange aigre.
Orénette.
Orge entiere
mondée.
Origan.
Ortie blanche.
piquante.
Oſmondel, *ou* Fougére fleurie.
Oxyme Scillitique, 20 *ſols* la demi-liv.
Ozeille.

P

Pariétaire.
Paſſe-roſe, *ou* Bourdon.
Patience ſauvage.
Perles préparées.

Perſil.
Pierre Hématique, 20 *ſols* le gros.
Pierre infernale, 20 *ſols* le gros.
Pilules de Morton. 20 *ſols* le gros.
de Styrax, 30 *ſols* le gros.
Purgatives univerſelles, 30 *ſols* l'once.
Hydragogues, 30 *ſols* l'once.
Cochées majeures, 30 *ſols*
Hyſtériques, 30 *ſols*
Vermifuges, 25 *ſols*
de Duobus, 25 *ſols* } l'once.
Anti-Aſthmatiques, 20 *ſols*
Piſſenlit.
Pivoine mâle.
Plantain.
Plomb brûlé. 3 *ſols* l'once.
Poirée, *ou* Bette.
Pois rouge, *ou* Haricot.
Poivre blanc,
long,
rond *ou* noir, } 3 *ſols* l'once.
Poix de Bourgogne, 4 *ſols* la demi-liv.
Poix navale.
Polypode de Chêne.
Poudre Cornachine, autrement dite Poudre de Comte, 15 *ſols* l'once.
de Cloportes, 24 *ſols*
de Guttéte, 25 *ſols*
contre les Vers, ou *Semen contrà*, 5 *ſols* } l'once.
de Vipéres, 30 *ſols*
Pouliot.
Pourpier.
Pulmonaire.
Pulpe de Caſſe.

Pulpe de Pruneaux.
Pirétre, 3 *ſols* l'once.

Q

Quinquina 3 *liv.* la demi-liv.

R

Raifort ſauvage.
Régliſſe, 6 *ſols* la-demi liv.
Réſine.
Rhubarbe.
Romarin.
Ronce.
Roſe rouge.
pâle.
Ris.

S

Sabine.
Saffran Oriental, *ou* du Gâtinois.
de Mars apéritif, 5 *ſols* l'once
Sang-Dragon, 12 *ſols* l'once.
Santal rouge.
Saſſafras.
Sauge.
Savon blanc.
d'Alicante.
noir.
Sceau de Salomon.
Scorſonnere.
Sel de Glauber, 20 *ſols* la demi-liv.
d'Epſom, 10 *ſols* la demi-liv.
d'Abſinthe, 10 *ſols* l'once.
de Nitre purifié, 10 *ſols* la demi-liv.
de Prunel ou Criſtal minéral.
10 *ſols* la demi-liv.
Végétal, 30 *ſols* la demi-liv.
Ammoniac, 4 *ſols* l'once.
(ou *Sucre*) de Saturne, 10 *ſols* l'once.
de Mars de Riviére, 8 *ſols* le gros.

Sel de Tamariſc.
Semence d'*Agnus Caſtus*.
d'Anis.
de Fenouil.
de Creſſon Alénois.
de Moutarde.
de Roquette.
de Violette.
Semences (quatre) froides majeures.
Séné mondé.
Seneçon.
Serpentaire de Virginie, 8 *ſols* l'once.
Serpolet.
Solanum, dit *Belladona*, ou Bouton noir.
Souci ſauvage, *ou* des Vignes.
Souffre.
Styrax.
Sublimé Corroſif, 2 *ſols* 6 *den.* le gros.
Sucre-Candi.
Sucre blanc; *ou* raffiné.
Suif de Bouc.
de Cerf.
de Bélier.
de Mouton.
Syrop d'Abſinthe } 20 *ſols* la
de Capillaire. } demi-liv.
de Chicorrée compoſé de Rhubarbe, 40 *ſols* la demi-liv.
des cinq Racines, 20 *ſols* la demi-liv.
de Coing, 20 *ſols* la demi-liv.
Diacode, *ou* de Pavot blanc, 25 *ſols* la demi-liv.
d'*Eryſimum*, ou d'Herbes aux Chantres, 20 *ſols* la demi-liv.
de Guimauve, } 20 *ſols* la
de Fleurs de Pêcher, } demi liv.

Syrop de Nénuphar,
de grande Conſoude,
de Lierre terreſtre,
de Limon,
de Fumeterre,
de Mûres,
de Nerprun,
de Pavot rouge, *ou* Coquelicot. } 20 *ſols* la demi-liv.

d'Oeillet, } 25 *ſols* la demi-liv.
de Pivoine compoſé, }

de Pivoine ſimple, } 20 *ſols* la demi-liv.
de Roſes léches, }

Violat, *ou* de Violette, 25 *ſols* la demi-liv.

T

TAbac.
Tablettes Martiales, la doſe totale de ſix onces, 40 *ſols*
Tablettes de *Citron*, 25 *ſols* la demi-liv.
Diacarthami, 25 *ſols* la demi liv.
Tartre *émétique*, ou *ſtibié*, 25 *ſols* l'once.
Vitriolé, 5 *ſols* l'once.
Martial ſolube, 12 *ſols* l'once.
Teinture d'Aunée, 4 *ſols* l'once.
de *Caſtoreum*, 10 *ſols* l'once.
de Myrrhe, 8 *ſols* l'once.
Terre ſigillée, 10 *ſols* la demi-liv.
Térébenthine de Veniſe, 15 *ſols* la demi-liv.
Thalitron.
Thériaque, 3 *liv.* la demi-liv.
Thym.
Treffle d'eau, ou *Ménianthes*,
Trochiſques de Myrrhe, 20 *ſols* l'once.
Trochiſques Alhandal, 30 *ſols* l'once.
Turquette, *ou* Herniole

Tuſſilage, *ou* Pas d'âne.
Tuthie préparée. 20 *ſols* l'once.

V

Valériane ſauvage, *ou* des bois.
Verd de-Gris.
Véronique mâle.
Verre d'Antimoine, 3 *ſols* l'once.
Verveine.
Vinaigre de Vin, *ou* commun.
Scillitique, 2 *ſols* 6 *den.* l'once.
Vin émétique trouble, 20 *ſols* la chop.
Violier.
Vitriol blanc, 12 *ſols* la demi-liv.
Vulnéraires de Suiſſe.

Y

Yeux d'Ecreviſſes préparés, 6 *ſols* l'once.

REMARQUE

Le Prix des Drogues compoſées ci-deſſus, peut être regardé comme invariable, parce que dans les Médicamens compoſés le travail de l'Artiſte eſt preſque tout ce qui en fait la valeur, la Drogue par elle-même y entrant pour peu de choſe; & comme ce travail eſt le même dans tous les tems, c'eſt ce qui fait que le plus ou le moins de cherté des Drogues ſimples qui y entrent, ne peut guéres y aporter de différence ſenſible.

POIDS & MESURES,

Qui sont d'usage en Médecine.

LE Poids commence par un Grain, & se continue par un Scrupule, une Dragme ou un Gros, une Once & une Livre.

Le Grain est la pesanteur d'un grain d'orge de moyenne grosseur.

Le Srupule est la pesanteur de vingt-quatre grains.

La Dragme, ou le Gros, contient trois Scrupules, ou soixante & douze Grains.

L'Once comprend huit Gros, ou cinq cens soixante & seize Grains.

La Livre en Médecine qui étoit autrefois de douze Onces, est à present de seize Onces.

On compte encore les ingrédiens solides par Manipules ou Poignées, par Pincées, par Paires & par Nombre.

Les mesures ordinaires des Ingrédiens liquides sont la Pinte, la Chopine, le demi-Septier de Paris égal à peu-près au Septier d'Orléans, le Poisson de Paris égal à peu près au demi-Septier d'Orléans, le demi-Poisson & la Goutte.

Le Manipule, ou la Poignée, est tout ce qu'on peut prendre à la fois avec la main.

La pincée est tout ce qu'on peut prendre des trois premiers doigts, en commençant par le pouce.

La pinte de Paris & celle d'Orléans contiennent un peu moins de trente-deux Onces, ou deux livres d'eau.

La Chopine, qui peſe environ une Livre, contient un peu moins de ſeize Onces d'eau.

Le demi-Septier de Paris, égal à peu près au Septier d'Orléans, contient environ huit Onces ; & ainſi du reſte.

La Goutte eſt la moindre quantité de liqueur qui ſe ſepare en verſant doucement.

On ſe ſert de ces différentes maniéres en doſant, ſuivant les différentes matiéres qu'on preſcrit ; ainſi les Bois, les Racines & les Ecorces des Plantes, ſe doſent par Scrupules, Gros & Onces, &c. auſſi-bien que les Semences, dont il y en a beaucoup qu'on ordonne auſſi par Pincées.

Les feuilles vertes ſe preſcrivent par Poignées, & les ſéches par Poids & par Pincées ; les Fleurs auſſi par Pincées : les Fruits s'ordonnent par Paires ou par Nombres. Les Amandes, les citrons, les Raiſins, les Pommes, &c ſe doſent par Nombre & quelques-uns par Poids.

Les Racines & les Feuilles des Plantes qui croiſſent dans le pays, doivent être, autant qu'il ſe peut, employées fraîches ; lorſqu'il les faudra employer ſéches, nous en avertirons en ſon lieu.

TABLE DES CHAPITRES.

Premiere Partie, *Remedes internes.*

CHAPITRE I. Apozêmes, Décoctions & Infusions, *Page* 1
§. I. *Des Apozêmes*, ibid.
§. II. *Des Décoctions*, 19
§. III. *Des Infusions*, 31
CHAP. II. Tisanes, Hydromels, & Emulsions, 34
§. I. *Des Tisanes*, ibid.
§. II. *Des Hydromels*, 59
§. III. *Des Emulsions*, 62
CHAP. III. Bouillons & Vins Médicamenteux, 66
§. I. *Des Bouillons Médicamenteux*, ibid.
§. II. *Des Vins Médicamenteux*, 75
CHAP. IV. Lavemens & Supositoires, 91
§. I. *Des Lavemens*, ibid.
§. II. *Des Supositoires*, 100
CHAP. V. Potions altérantes *ou* Correctives, 102
CHAP. VI. Potions purgatives, 116
Remarques générales sur l'usage des Purgatifs, 126
Remarques générales sur l'usage de l'Emétique, 132
Purgatifs pour les Enfans. Régles générales, 139
CHAP. VII. Juleps & Lohochs, 147
§. I. *Des Juleps*, ibid
§. II. *Des Lohochs*, 157

CHAP. VIII. Poudres, Bols, & Opiates, 164
§. I. *Des Poudres*, ibid.
§. II. *Des Bols*, 181
§. III. *Des Opiates*, 195
CHAP. IX. Pilules & Tablettes, 218
§. I. *Des Pilules*, ibid.
§. II. *Des Tablettes*, 230

Seconde Partie, *Remedes externes.*

CHAP. I. Fomentations & Cataplasmes, 235
§. I. *Des Fomentations*, ibid.
§. II. *Des Cataplasmes*, 244
CHAP. II. Linimens *ou* onctions, 254
CHAP. III. Collyres & Gargarismes, 264
§. I. *Des Collyres*, ibid.
§. II. *Des Gargarismes*, 268
CHAP. IV. Onguens & Emplâtres, 272
§. I. *Des Onguens*, ibid.
§. II. *Des Emplâtres*, 291

REMEDES

Extrait des Ephémérides d'Allemagne, 299.

TRAITÉ DE LA SAIGNÉE.

Régles à observer pour placer comme il faut les différentes Saignées dans tous les cas de Pratique, suivant les vraies indications. 343
ARTICLE I. *Combien y a-t'il d'especes de Saignées*, 344
ART. II. *De l'utilité de la Saignée évacuative*, 346
ART. III. *De l'utilité de la Saignée révulsive*, 348
ART. IV. *De l'utilité de la Saignée derivative*, 350

ART. V. *Quels ſont les cas qui permettent ou défendent la Saignée*, 351
ART. VI. *Quelles ſont les Précautions néceſſaires pour la Saignee*, 355
ART. VII. *Du Manuel de la Saignée*, 362
Des qualités que doit avoir un Chirurgien, pour bien ſaigner, 363
Des Vaiſſaux qu'on doit ouvrir, ibid
Des Veines que l'on ouvre aux Bras, 364
Des Veines que l'on ouvre aux Pieds, 365
Des Veines que l'on ouvre à la Gorge, 366
Des Lancettes, 367
De la maniere d'ouvrir les Vaiſſeaux, 369
De la Saignée du bras, 371
Remarques, 376
De la Saignée du Pied, 379
Remarques, 387
De la Saignée de la Gorge, 382
Remarques, 384
Accidens de la Saignée, 385
De la Saignée blanche ibid
De la Syncope, 386
Des Dépôts, 387
Du Thrombus, ibid
De l'Ecchymoſe, 388
De la Tumeur limphatique, 389
De la douleur & de l'engourdiſſement, 390
De la Piqûre du Tendon, 391
De la Piqûre de l'Aponévroſe, 393
De la Piqûre du Périoſte, 394
De la Piqûre de l'Artére, 395
De l'Artériotomie, 398

Fin de la Table des Chapitres.

APROBATION

De Monsieur DE LASONE, *de l'Académie Royale des Sciences, Censeur Royal des Livres, & Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris.*

J'Ai lû par ordre de Monseigneur le Chancelier, *Le Manuel des Dames de Charité.* Cet Ouvrage, qui a si justement mérité l'aprobation du Public, reparoît dans cette nouvelle Edition avec des additions essentielles, qui semblent lui donner tout le dégré d'utilité dont il est susceptible. A Paris ce 15 Décembre 1757.

LASONE.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il

apartiendra : SALUT. Notre amé Jean DEBURE, l'aîné, Libraire à Paris, Ancien Ajoint de la Communauté, Nous a fait expoſer qu'il deſireroit faire imprimer & donner au Public des Ouvrages qui ont pour titre : *Nouveau Traité de la Sphére* : *Le Manuel des Dames de Charité* : *Réflexions Chrétiennes ſur les grandes Vérités de la Foi*, s'il Nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceſſaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expoſant, Nous lui avons permis & permettons par ces Preſentes, de faire imprimer leſdits Ouvrages autant de fois que bon lui ſemblera, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le tems de ſix années conſécutives, à compter du jour de la date des Preſentes : Faiſons défenſes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient, d'en introduire d'impreſſion étrangere dans aucun lieu de notre obéiſſance : comme auſſi d'imprimer ou faire imprimér, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire leſdits Ouvrages ni d'en faire aucuns extraits, ſous quelque prétexte que ce puiſſe être, ſans la permiſſion expreſſe & par écrit dudit Expoſant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expoſant, ou à ceux qui auront

droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts : A la charge que ces Preſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreſſion deſdits Ouvrages ſera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele ſous le contre ſcel des Preſentes ; que l'Impétrant ſe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. qu'avant de les expoſer en vente, les manuſcrits qui auront ſervi de copie à l'impreſſion deſdits Ouvrages, ſeront remis dans le même état où l'aprobation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier-Garde des Sceaux de France le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Preſentes. Du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant ou ſes ayant cauſe, plainement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Preſentes qui ſera imprimée tout au long au commencement ou à la fin deſdits Ouvrages, ſoit tenue

pour duement ſignifiée ; & qu'aux copie collationnées par un de nos amés & feaux Conſeillers-Secrétaires, foi ſoit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l'éxécution d'icelles tous Actes requis & néceſſaires, ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eſt notre plaiſir. Donné à Verſailles, le ſixieme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil ſept cens cinquante-cinq, & de notre Regne le quarante-unieme. Par le Roi en ſon Conſeil.

Signé, LE BEGUE.

Regiſtré ſur le Regiſtre XIII. *de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris*, N°. 574. *fol.* 444. *conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du* 28 *Février* 1723. *A Paris le* 13 *Septembre* 1755.

DIDOT, *Syndic.*

LE MANUEL
DES
DAMES DE CHARITÉ.

PREMIERE PARTIE.
REMEDES INTERNES.

CHAPITRE PREMIER.

APOZEMES, DECOCTIONS, & Infusions.

§. I. DES APOZÊMES *.

APOZEME TEMPERANT.

PRENEZ des feuilles
de Bourache,
de Bugloſe,
de Poirée,

* *L'Apozême eſt une forte décoction de racines & de feuilles de plantes. On le diviſe en*

de Chicorée blanche, lavées & coupées, de chacune demi-poignée.

Faites-les bouillir dans trois chopines d'eau commune, que vous réduirez à une pinte.

Paſſez enſuite la liqueur avec une legére expreſſion, & ajoutez à la colature (*a*) du ſyrop de Violette,

ou de Nénuphar, une once.

La doſe eſt d'un verre tiéde, de trois heures en trois heures.

Remarque. Cet Apozême eſt très-convenable dans les occaſions où il faut tempérer les humeurs, détremper le ſang, & diſpoſer le ventre à la purgation : il ſe donne avec ſuccès dans toutes les Maladies aiguës, comme dans les Fiévres ardentes & bilieuſes, dans toutes les Inflammations, & dans les Hémorragies ; & même, ſi la poitrine du Malade eſt bien conſtituée, & qu'il ne touſſe pas, on fera bien d'y ajouter par pinte un gros de Nitre purifié : il rafraîchira davantage, & fera couler les urines. Que s'il ſe donne dans une Maladie aiguë, il faudra l'accompa-

Altérant & en Purgatif. L'Apozême Altérant eſt celui dont nous venons de parler ; & le Purgatif eſt celui auquel on ajoute des ingrédiens purgatifs.

(a) *On entend par* Colature, *la ſéparation d'une liqueur d'avec quelques impuretés ou matiéres groſſieres ; ce qui ſe fait communément à travers d'un linge ou d'un tamis.*

gner de Lavemens émolliens, de la Tisanne commune, & des Poudres tempérantes décrites ci-dessous dans leur lieu. (a)

Quant aux Saignées nécessaires dans les Maladies aiguës, & dans la plupart de celles pour lesquelles nous proposons des Remédes dans ce Livre, nous n'en parlons pas expressément, & nous les supposons toujours faites autant qu'il en est besoin.

Apozême contre la Pleurésie & la Péripneumonie.

Prenez des feuilles
de Bourrache,
de Bugloſe,
de Chicorée sauvage, de chacune une poignée.

Lavez ces herbes, & coupez-les un peu.

Faites-les bouillir ensuite dans trois chopines d'eau que vous réduirez à une pinte.

Passez la liqueur par un linge avec une legére expression, ajoutez-y du syrop
de Violette,
ou de Guimauve, une once, ou une once & demie.

La dose est d'un grand verre tiéde, de trois heures en trois heures.

Remarque. La Pleurésie est une maladie

(a) *Voyez les Chapitres des Tisannes*, pag. 34. *des Lavemens & des Poudres.*

des plus dangereuſes en Médecine. Elle ſe fait connoître d'une maniére à ne s'y pas méprendre : dans cette maladie on ne reſpire que difficilement ; la Fievre eſt continuë ; le pouls eſt toujours fréquent, dur & tendu, quelquefois inégal & médiocrement grand ; le viſage eſt enflammé, la toux eſt fréquente & ſeche, ſur-tout les premiers jours : les crachats ſont mêlés de ſang ; ils prennent enſuite une couleur jaune, ou de rouille : (ces derniers ſont de mauvais augure.) Mais ce qui caractériſe le plus cette maladie, c'eſt une douleur de côté aiguë & pongitive, ſemblable en quelque ſorte au ſentiment que l'on éprouveroit, ſi l'on vous enfonçoit peu-à-peu une épine dans le côté ; ce qui fait que le Malade n'oſe reſpirer pleinement, de peur d'augmenter ſa douleur. Cette douleur ſe communique ſouvent au coû, aux clavicules, ou bien aux hypocondres. Ajoutez à cela les anxiétés, les inquiétudes, les inſomnies ; vous aurez à peu près la deſcription de la Pleuréſie.

La méthode de traiter cette maladie qui nous a paru la plus naturelle, eſt de ſaigner promptement & abondamment le Malade, ſuivant ſes forces. On le fait ordinairement du bras opoſé au côté douloureux ; mais après quelques ſaignées de ce bras, on peut en tenter du côté de la douleur ; ce qui quelquefois l'emporte comme par enchantement. On ſaigne auſſi du pied après quelques ſaignées du bras, lorſque de fortes indications l'exigent. On donne pendant tout le cours de la maladie notre

Tiſane pectorale adouciſſante (*a*) ; on y joint un des deux Apozêmes ci-deſſus, avec le Lohoch contre la Pleuréſie, & des Lavemens émolliens : on continue de même juſqu'à ce que la fiévre, la douleur de côté & les autres accidens ſoient ceſſés ; après quoi l'on purge la premiére fois avec la potion huileuſe laxative contre la Pleuréſie décrite ci-deſſous.

Quant aux Remédes extérieurs, on aplique dès le commencement un des deux Cataplaſmes décrits plus bas au Chapitre des Cataplaſmes ; ou bien on prend un Pigeon vivant, que l'on fend par le dos ſuivant ſa longueur : on le met enſuite tout chaud ſur le côté douloureux, le maintenant avec une compreſſe & une ſerviette ; & on l'y laiſſe dix-huit ou vingt heures, juſqu'à ce que la mauvaiſe odeur oblige de l'ôter.

A l'égard de la Péripneumonie ou Fluxion de poitrine avec inflammation, on la connoît à la toux du Malade, & à la difficulté qu'il a de reſpirer. Il ſent une peſanteur ou douleur ſourde & gravative dans la poitrine : il a le viſage rouge, les yeux ardens & enfoncés ; la langue eſt ſéche & épaiſſe : ſa couleur eſt d'abord d'un rouge jaunâtre ; mais elle devient noire dans l'accroiſſement de la maladie, & enfin elle ſe fend, & s'attache aux doigts quand on la touche. Les crachats ſont

(a) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 42. *des Lohochs*, *des Lavemens*, *des Potions purgatives & des Cataplaſmes.*

jaunes, ou sanglans ; la fiévre se manifeste aiguë & continuë ; le pouls est ondulent, moû, grand & prompt, & souvent intermittent à cause de la gêne du sang dans le Poumon. On ressent aussi quelque douleur au milieu des épaules, avec un grand dégoût, & un desir pressant de boire de l'eau froide & de respirer un air frais : le Malade se couche sur le dos pour respirer plus facilement ; enfin, à la douleur de côté près, ce sont les mêmes signes dans la Péripneumonie que dans la Pleurésie, si ce n'est que dans celle-là ils sont plus modérés & plus pernicieux en même-tems. En effet, dans la Péripneumonie le danger est plus grand que la douleur n'est sensible ; & la maladie prend souvent une tournure funeste, sans être annoncée par des symptômes effrayans. Quant au traitement, il est le même que celui que nous venons de donner pour la Pleurésie, ces deux maladies, comme nous venons de le dire, ayant un grand raport l'une avec l'autre, & presentant les mêmes indications. On a seulement attention de moins saigner dans la Péripneumonie que dans la Pleurésie, afin de laisser au poumon assez de ressort pour se débarrasser des crachats abondans qui doivent suivre, lorsque la maladie veut se terminer heureusement.

Apozême Anti-scorbutique, ou contre le Scorbut.

Prenez des Racines de Raifort sauvage,

ou à leur défaut, de celles d'Aunée, ratiſſées & coupées par tranches, une once ;
de la racine de Pirethre concaſſée, un demi-gros.

Faites bouillir ces Racines dans trois chopines d'eau commune, que vous réduirez à une pinte.

Prenez enſuite des feuilles de *Cochlearia*, *de Bécabunga*, de Treffle d'eau, de Creſſon de fontaine, de chacune une demi poignée, ou une poignée de chaque eſpéce, ſi l'on n'en met que de deux.

Pilez-les enſemble dans un mortier de marbre, ou de bois, & jettez les enſuite dans la Décoction ci-deſſus, en la retirant du feu, & la couvrant bien juſqu'à ce qu'elle ſoit preſque refroidie.

Coulez le tout avec une legére expreſſion, & ajoutez à la colature du Sirop d'Abſynthe, une once.

La doſe eſt de quatre verres par jour, un peu dégourdis.

Remarque. On connoît le Scorbut à la pâleur & à la bouffiſſure du viſage : les gencives ſont rouges, ſanguinolentes & ulcérées ; ſi on les preſſe tant ſoit peu avec le doigt, il en ſort de la ſanie, & elles ſont ſi lâches qu'elles quittent les dents qu'on peut ôter aſſez aiſément de leurs alvéoles. On obſerve ſur la peau, principalement aux jambes, aux cuiſſes, aux bras & à la poitrine, des taches rouges, ou plutôt livides & noires. Il ſe for-

me des ulcéres dans la bouche & au nez: les Malades reſpirent difficilement ; ils reſſentent des laſſitudes & des douleurs vagues par tout le corps : leurs urines ſont fédites, & leur haleine eſt d'une puanteur inſuportable. Ce ſont-là les principaux ſymptômes du Scorbut, qui varient ſuivant les différens Sujets, & ſuivant que la maladie eſt plus ou moins avancée. Il n'eſt pas même néceſſaire d'avoir tout à la fois ceux que nous venons de décrire ; il ſuffit d'en avoir quelques-uns, pour ne pas balancer à prendre des meſures pour guérir cette maladie.

L'Apozême que nous venons de décrire, convient lorſque le Scorbut n'eſt pas encore fort avancé ; ce que l'on reconnoît, lorſque le Malade eſt pâle, ſans chaleur & ſans ſoif, avec des urines de couleur pâle ou naturelle, des taches ſur la peau peu enflammées, ou médiocrement livides ; que les gencives rendent peu de ſang, qu'elles ſont molles ſans être putrides ni fougueuſes, & que l'haleine n'eſt pas extrêmement puante. Cet Apozême peut ſe donner après l'avoir fait précéder d'un Vomitif: on le continue pendant du tems, ſe purgeant deux fois le mois avec notre Opiate martiale fondante & purgative(*a*);on a joint à ſon uſage le Gargariſme & le Liniment anti-ſcorbutiques décrits ci-deſſus, aux titres des Gargariſmes & des Linimens. Le premier de ces Remédes

(*a*) *Voyez les Chapitres des Opiates, des Gargariſmes, & des Linimens.*

s'emploie, lorſque les gencives ſont gonflées, gorgées & legérement ulcérées, il les déterge fort bien ; & le ſecond, lorſqu'il ne s'agit plus que de les reſſerrer & de les raffermir.

Mais ſi le Scorbut eſt accompagné d'une grande puanteur dans la bouche ou dans l'haleine, ſi les gencives ſont putrides & fougueuſes, les urines troubles, bourbeuſes & fétides, & les taches de la peau noires, ou très-livides : alors cet Apozême ne convient pas, parce qu'il eſt chaud, & qu'il précipiteroit la fonte du ſang qui, dans cet état, ne tend que trop à ſa diſſolution. On doit donc dans ce dernier cas traiter le Scorbut avec les Sucs d'Orange & de Limon, les plantes acidules ou aigrelettes, telles que la Dent de Lion, l'Ozeille, la Laitue, le Pourpier, &c. que l'on peut même mêler avec celles qui entrent dans l'Apozême ci-deſſus : car on a obſervé que ces dernieres plantes, par leur qualité ſavonneuſe & rafraichiſſante, tempérent les premieres qui ſont plus échauffantes, & que leur mêlange produit un bon effet dans la cure du Scorbut. Il faut de plus faire attention, que comme cette maladie a ordinairement pour cauſe une nourriture groſſiere & ſalée, avec un air froid & humide ; on doit faire obſerver un bon régime de vivre aux Malades, & les faire habiter dans des lieux chauds, ſecs & bien airés.

Apozême Pectoral-Adouciſſant.

Prenez de l'Orge mondé, une demi-once,
des feuilles de Bourrache,
de Capillaire,
de Tuſſilage,
de Pulmonaire tachée:
de chacune une demi-poignée, ou une poignée de chaque eſpéce, ſi l'on n'en met que de deux.

Faites bouillir le tout dans deux pintes d'eau commune, que vous réduirez à trois chopines.

Ajoutez enſuite
de la Racine de Guimauve lavée, deux gros;
des Fleurs de Tuſſilage,
de Mauve,
de chacune une pincée.

Retirez la cruche du feu, laiſſant le tout infuſer pendant un quart-d'heure.

Paſſez la liqueur ſans expreſſion, & édulcorez la colature avec une once & demie de Syrop de Violette, de Guimauve, ou de Capillaire.

La doſe eſt d'un verre tiéde, de deux heures en deux heures.

Remarque. Cet Apozême doit être employé dans la ſéchereſſe de poitrine, dans la toux opiniâtre, & dans toutes les occaſions, où une pituite âcre & tenue ſe jette ſur les Poumons; il adoucit cette pituite, la rend plus coulante, & en fa-

cilite l'expectoration. On trouvera ci-deſſous une Tiſane pectorale, une Décoction pectorale, & un bouillon de moû de Veau, qui peuvent ſervir dans les mêmes occaſions, & qu'on pourra employer ſucceſſivement (*a*).

Apozéme Solutif ou Laxatif.

Prenez des racines
de Chicorée ſauvage,
de Patience ſauvage,
de Polypode de Chêne ratiſſées & coupées par tranches, de chacune une demi-once ;
des feuilles d'Aigremoine,
de Chicorée ſauvage,
de chacune une demi-poignée ;

Faites bouillir le tout dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à une pinte.

Retirez la cruche du feu, & faites-y infuſer chaudement pendant quatre heures
du Séné mondé, une once ;
du Sel de Glaubert, une demi-once ;
de la ſemence d'Anis, un demi-gros.

Paſſez la liqueur par un linge avec une legére expreſſion, & ajoutez à la colature du Syrop de fleur de Pêcher, deux onces.

Partagez le tout en ſix verres à prendre tiédes en deux jours, trois dans chaque matinée, de deux heures en deux heures, & un bouillon leger entre chaque verre ; que s'il purge abondamment, on ſe con-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 34. *des Décoctions*, pag. 19. *& des Bouillons.*

tentera de deux verres, & on le prendra en trois jours.

On peut, ſi l'on veut, réduire toutes les doſes à la moitié, & en faire une eſpece de Tiſane Royale-laxative pour ſe purger en un ſeul matin, en trois verres.

Remarque. Cet Apozême eſt utile pour enlever les mauvais levains qui ſéjournent dans l'Eſtomac, ou dans la maſſe des humeurs. Il convient auſſi aux conſtitutions où le ſang eſt trop épais : car comme il eſt un peu apéritif, il léve les obſtructions qui ſont les ſuites de l'épaiſſiſſement, & purge le ſang des impuretés dont il eſt chargé. On s'en ſert avec utilité en guiſe de purgatif dans les maladies chroniques, qui dépendent de l'obſtruction des Viſcéres ; il convient encore dans les Fievres malignes, lorſque la Fievre n'eſt pas conſidérable, & que les premieres voies ſont farcies d'impuretés qu'il faut évacuer.

Si l'on s'en ſert en guiſe de purgatif contre les obſtructions des Viſcéres, il faudra y joindre l'uſage des Bouillons apéritifs décrits ci-deſſous à l'Article des Bouillons Médecinaux (*a*).

Apozême apéritif & purgatif contre l'Hydropiſie.

Prenez des racines
de Patience ſauvage,
de Chardon-Roland,

(*a*) *Voyez le Chapitre des Bouillons.*

d'Arrête-Bœuf, de chacune une demi-once ;
de celles d'*Enula Campana*, deux gros.

Coupez le tout par morceaux, après l'avoir ratiſſé, & faites-le bouillir dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à une pinte.

Ajoutez la derniere demi-heure
des feuilles d'Aigremoine,
de Chicorée ſauvage,
de Cerfeuil, de chacune une poignée.

Paſſez enſuite la liqueur par un linge avec une legére expreſſion, & diſſolvez-y
de l'*Arcanum duplicatum*, deux gros ;
de la poudre de Jalap, un gros ;
du ſyrop de Nerprun, une once & demie.

La doſe eſt d'un verre tiéde trois fois le jour, deux le matin, & un dans l'aprés-dîner, en ſuſpendant le dernier, ſi l'évacuation eſt ſuffiſante, & en prenant un leger potage par deſſus chaque priſe.

Remarque. Le mot d'Hydropiſie ſignifie un amas d'eaux dans quelque cavité du corps que ce ſoit. Les plus communes eſpeces de cette maladie, qui ſont toutes extrêmement dangereuſes, ſont l'Hydropiſie de poitrine, celle du bas-ventre apelée Aſcite, & l'univerſelle nommée Anaſarque, ou Leucophlegmatie. Dans l'Hydropiſie de poitrine, les Malades reſſentent des inquiétudes & des anxiétés de poitrine : ils reſpirent difficilement ; & cette difficulté, qui varie ſelon les diffé-

rentes ſituations du corps, augmente tous les jours, ſi la maladie fait du progrès. Le viſage eſt pâle, & d'une couleur plombée & livide ; les Malades ſont obligés de ſe lever, & de ſe tenir ſur leur ſéant pour reſpirer plus facilement : les pieds ſont enflés, le pouls eſt petit, fréquent & inégal, & la fiévre ſe met de la partie.

Pour traiter l'Hydropiſie de poitrine, ſuivant la méthode de ce Livre, il faut commencer par l'uſage de l'Apozême ci-deſſus, en y joignant pour boiſſon ordinaire la Tiſane apéritive décrite plus bas. (*a*) Après avoir continué cette Tiſane pendant quelque jours, on preſcrit les deux Bols purgatifs anti-aſthmatiques propres à prévenir l'Hydropiſie de poitrine, qui ſont au Chapitre des Bols ; & ſi la maladie ne commence pas à céder à ces Remédes, on paſſe à la Potion diurétique contre l'Hydropiſie faite avec le ſuc dépuré de Cerfeuil, purgeant ſuivant le beſoin, ſoit avec les mêmes Bols, ſoit avec la Potion hydragogue contre l'Hydropiſie, ſoit enfin avec les Pilules hydragogues : tous Remédes que l'on trouve chacun ſous leur Chapitre.

On connoît l'Hydropiſie de bas-ventre à l'enflure des jambes, des cuiſſes, & à la tumeur du ventre. Lorſque le Malade ſe tourne ſur le côté, il ſent comme des eaux agitées qui s'y portent avec

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 34. *des Bols*, *des Potions altérantes*, *des Potions purgatives*, *& des Pilules*.

fluctuation ; & ſi en le faiſant coucher ſur le dos, on frape un côté du ventre avec le plat de la main, la colonne d'eau ſe fait ſentir à l'autre main placée au côté opoſé. Si l'on aplique le doigt ſur les parties gonflées, l'impreſſion y reſte, & dure quelque-tems. Quelquefois les eaux ſont toutes contenues dans la capacité du ventre; & quelquefois il en paſſe dans les bourſes : elles pénétrent même juſques dans la poitrine ; ce qui rend la maladie bien plus dangereuſe. Les urines ſont groſſieres, d'un rouge brun, & coulent en petite quantité. Une ſoif conſiderable & continuelle accompagne toujours cette maladie. La corruption des eaux qui croupiſſent dans le bas-ventre, excite une fiévre continue, qui eſt plus aparente le ſoir : le pouls eſt petit, fréquent & un peu dur ; enfin, tout le corps s'exténue & ſe fond, pour ainſi dire, à meſure que le ventre groſſit davantage.

Il faut commencer le traitement de cette eſpéce d'Hydropiſie par la Tiſane apéritive (*a*), qui ſervira de boiſſon ordinaire pendant le cours de la maladie. On purgera quelques jours après avec l'Apozême purgatif ci-deſſus, ou bien avec la Décoction purgative contre l'Hydropiſie aſcite, que l'on trouvera plus bas ; on fera enſuite uſage des Bouillons apéritifs, qui ſeront

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 34. *des Apozêmes*, pag. 10. *des Décoctions*, pag. 19. *des Bouillons*, *des Vins médicamenteux*, *des Bols & des Opiates.*

ſuivis de l'Opiate apéritive & purgative contre l'Hydropiſie. On inſiſtera ſur ceux de ces Remédes qui auront le mieux fait ; & ſi la maladie commence à céder, on terminera le traitement par le Vin apéritif & purgatif contre l'Hydropiſie, que l'on trouvera en ſon lieu. Lorſque les eaux ſeront évacuées, & qu'il ne s'agira plus que de fortifier le Malade, notre Bol ſtomachique, continué pendant quelque tems, lui ſera beaucoup de bien, ayant attention de le purger de tems à autre avec notre Opiate martiale fondante & purgative, parce que cette Hydropiſie eſt ordinairement la ſuite d'anciennes obſtructions des viſcéres du bas-ventre.

Quant à l'Hydropiſie anaſarque ou univerſelle, qu'on apelle auſſi Bouffiſſure, lorſqu'elle n'eſt point jointe à l'Aſcite, elle ſe connoît à une enflure univerſelle & molle, qui gagne tout le corps, & occupe principalement les pieds, les jambes & les cuiſſes. Cette bouffiſſure forme aux Reins une eſpéce de bourlet ; le ventre eſt ſouple & mollet, mais plus gros que dans l'état naturel. Si l'on apuye ſur la peau avec le doigt, il s'y fait une enfonçure qui conſerve l'impreſſion du doigt, & ne ſe rétablit que long-tems après. La reſpiration eſt grande, & plus prompte que de coutume, particulierement après le repas : outre cela une fiévre lente continue rend le pouls ondulent, petit, fréquent & inégal ; enfin, les déjections ſont crues, ſouvent mêlées de ſang, & les urines ſont claires & aqueuſes.

Pour guérir cette maladie, il faut preſcrire d'abord la Tiſane apéritive (*a*) pour boiſſon ordinaire. On purge quelques jours après, ſoit avec la Potion hydragogue, ſoit avec les Pilules hydragogues ; on met enſuite le Malade à l'uſage des Bouillons apéritifs ; & s'il eſt ſans chaleur, & qu'il y ait peu ou point de fiévre, on lui donne la Décoction contre la Leucophlegmatie décrite ci-deſſous, ou les Tiſanes ſudorifiques. Quant au traitement extérieur, les Fomentations aromatiques décrites ci-deſſous, ſont tout ce qu'on peut employer de mieux.

La Saignée & les Lavemens ſont contraires aux trois eſpéces d'Hydropiſie que nous venons de décrire ; & il en faut éviter l'uſage, autant qu'il ſe pourra.

Nota. Quoique nous rapellions dans le traitement des Hydropiſies ci-deſſus tous les Remédes contre ces maladies répandus dans cet Ouvrage, il n'eſt pas moins néceſſaire de lire avec attention les Remarques qui accompagnent ces Remédes ; elles ſont faites pour en fixer l'uſage, & pour jetter du jour ſur la conduite que l'on doit tenir pendant tout le cours de ces maladies.

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 42. *des Bouillons, des Décoctions*, pag. 19. *des Potions purgatives, des Pilules & des Fomentations.*

Apozême Fébrifuge-Laxatif.

Prenez des feuilles
de Bourrache.
de Bugloſe,
de Chicorée ſauvage, lavées & coupées, de chacune une poignée;
du Quinquina groſſierement pulvériſé, une once;
des Follicules de Séné, trois gros;
du Sel de Glaubert, deux gros;

Faites bouillir le tout dans trois chopines d'eau commune, que vous réduirez à une pinte.

Paſſez enſuite la liqueur avec expreſſion, & ajoutez-y
du Syrop de fleurs de Pêcher, ou de celui de Chicorée, compoſé de Rhubarbe, une once & demie.

La doſe eſt d'un verre tiéde de quatre heures en quatre heures dans l'intermiſſion des accès, ou de trois heures en trois heures, ſi l'intermiſſion eſt moindre.

Remarque. Cet Apozême convient dans les Fiévres intermittantes, parce que le Purgatif qui y eſt mêlé, s'unit au Quinquina, pour chaſſer la Fiévre, qui ſouvent ne dépend que des mauvais levains des premieres voies. Il faut toujours le donner hors de l'accès: & ſi c'eſt dans une fiévre avec redoublement, il faut pour le donner avec ſûreté, que les redoublemens reviennent à la même heure, qu'il ait précédé une rémiſſion bien

ſenſible & durable, & que la chaleur de la peau ſoit modérée. Il faut de plus que les urines ſoient rouges, & qu'elles dépoſent un ſédiment briqueté ; ce qui eſt le caractére d'une fiévre intermittante. Sans la réunion de ces ſignes, ou du moins de la plus grande partie, & en le donnant indiſcretement & trop-tôt dans les fiévres continues, comme font de mauvais Praticiens, on augmente la chaleur & l'érétiſme, & on porte la maladie à un dégré d'inflammation, qui la rend ſouvent funeſte.

Si ce n'eſt point une fiévre à redoublemens que l'on ait à traiter, mais ſeulement une ſimple intermittante, on trouvera ci-deſſous des Opiates (a) Fébrifuges, dont il ſera plus commode de faire uſage, pour éviter le dégoût de prendre pluſieurs verres par jour de cet Apozême.

(a) *Voyez le Chapitre des Opiates.*

§. II. DES DECOCTIONS*.

Décoction blanche, aſtingente.

PRenez de la Raclure de Corne de Cerf, une once ;
de la Mie de pain blanc fraiſée**, deux onces ;

**La Décoction eſt ordinairement plus ſimple, ou moins chargée que l'Apozême, quoique dans la Pratique on n'en faſſe guéres de différence.*

***C'eſt-à-dire, émiée dans les mains.*

de la Racine de grande Conſoude lavée, une demi-once.

Faites bouillir le tout dans trois pintes d'eau, que vous réduirez à la moitié.

Paſſez enſuite la liqueur ſans expreſſion, & ajoûtez à la colature du Sirop de Coings, une once & demie.

Le tout pour boiſſon ordinaire legérement dégourdie.

Remarque. Cette Décoction convient dans tous les dévoiemens que l'on veut modérer ; elle arrête doucement les évacuations, adoucit & calme les coliques qui ſouvent les accompagnent. Que ſi les tranchées ſont violentes, on y joindra l'uſage du Lavement anodin décrit ci-deſſous *(a)* ; & lorſqu'elles ſeront paſſées, & qu'il ſera néceſſaire de purger, on ſe ſervira de notre Potion *(b)* purgative-aſtringente, en donnant le ſoir qu'on l'aura priſe un gros de *Diaſcordium* dans un petit gobelet de vin, ou en bol, enveloppé de pain à chanter.

Décoction Pectorale contre la Toux, l'Oppreſſion de Poitrine, & la Phtiſie commençante.

Prenez huit gros Limaçons ordinaires de vigne ou de jardin ; écraſez-les un peu, & jettez-les dans trois eaux chaudes différentes pour leur faire jetter leur gour-

(a) Voyez le Chapitre des Lavemens.
(b) Voyez le Chapitre des Potions Purgatives.

me & les bien dégorger : faites les bouillir enſuite dans une pinte d'eau juſqu'à la conſomption des deux tiers ; paſſez le tout avec expreſſion ; coupez enſuite cette eau avec pareille quantité de lait de vache, pour partager en deux doſes, à prendre tiédes, une le matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir.

Remarque. La Phtiſie pulmonaire, qui eſt celle dont il s'agit ici, eſt une conſomption & un amaigriſſement de tout le corps, joints à une toux ordinairement ſuivie d'une excrétion de crachats purulens, & à une fiévre lente continue & étique, qui redouble la nuit & après les repas. Le Malade a le viſage pâle, l'haleine courte, les doigts allongés, les ongles pâles & racornis, & les pieds enflés. Ses crachats ſentent très-mauvais, ſur tout lorſqu'on les jette ſur du braſier ; & s'il crache dans un vaiſſeau plein d'eau, ils tombent au fond, & en agitant cette eau elle devient trouble & nébuleuſe. Les Sujets diſpoſés à la Phtiſie ſont maigres, & d'une taille déliée & effilée ; ils ont la poitrine étroite, le col long : ils en ſont encore plus atteints, s'ils ont les épaules décharnées, & s'ils ſont ſujets aux rhumes & aux crachemens de ſang. Cette maladie eſt ordinairement cauſée par une ulcére formé dans la ſubſtance même du Poumon, qui en ronge peu-à-peu les parties ſolides, & conſume toutes les parties balſamiques du ſang. La Phtiſie commençante céde à peine aux

Remédes ; & il eſt impoſſible de guérir celle qui eſt invétérée. La Décoction ci-deſſus eſt un des meilleurs Remédes qu'on puiſſe employer dans ſon commencement : comme elle eſt très-adouciſſante, elle répand dans le ſang une onctuoſité, qui en corrige la ſalure & l'acrimonie ; & par-là elle convient, non-ſeulement à la Phtiſie, mais encore aux autres cas indiqués dans cet Article. On doit en faire uſage pendant deux ou trois mois pour qu'elle produiſe un effet durable ; & même on peut la continuer plus long-temps, à moins qu'elle ne vînt à trop charger l'eſtomac, auquel cas on l'interromproit quelque-tems, pour y revenir enſuite s'il en étoit beſoin. Il y a encore ci-deſſous des Bouillons de Moû de veau, (*a*) qui ſont excellens dans les mêmes maladies : nous conſeillons de faire uſage alternativement de ces deux Remédes ; & en joignant notre Tiſane pectorale (*b*), nos Opiates contre la Phtiſie, & l'uſage du lait, on aura tout ce que l'on peut employer de mieux contre les affections de poitrine, qui viennent de la ſalure & de l'acrimonie du ſang.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Bouillons.*
(*b*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 34 *& des Opiates.*

Décoction contre les Mois immodérés, ou Pertes.

Prenez les écorces de trois Oranges ai-

gres, qui ne soient pas tout-à-fait mûres; coupez-les par petits morceaux, & faites-les bouillir dans quatre pintes d'eau à la réduction de la moitié.

Passez la Décoction par un linge, dont vous donnerez deux verres tiédes à jeun, à une heure de distance l'un de l'autre.

Notez qu'on peut éteindre un fer rouge dans cette Décoction, pour la rendre plus astringente.

Remarque. Les mois, où les Régles sont immodérées, lorsqu'elles coulent trop long-tems, ou en trop grande quantité, de maniére que la Malade en est épuisée, & est dans un extrême abbatement. Dans cet état tout le corps s'affoiblit, la couleur s'éteint, l'apétit se perd, la digestion se fait mal; il s'excite des ressentimens de fiévre: les pieds deviennent œdémateux & enflés; & si l'incommodité dure du tems, il survient une Leucophlegmatie universelle. On peut commencer le traitement par une legére saignée du bras, pourvu que le sujet ne soit pas trop foible, & que les pieds ne soient pas enflés; mais il ne faut pas purger que l'écoulement du sang ne soit très-diminué, parce qu'un Purgatif, quoique des plus doux, pourroit causer une hémorrhagie. On donnera pour boisson ordinaire la Tisane astringente contre le crachement de sang (*a*); & si elle ne suffit pas, on y joindra les Bouillons

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tisanes*, pag. 54. *des Bouillons, & des Pilules.*

contre la même maladie : on paſſera enſuite, s'il en eſt beſoin, à la Décoction ci-deſſus : & au cas que la maladie réſiſte à tous ces Remédes, on fera uſage des Pilules contre les Pertes, que l'on trouvera ſous leur titre.

Nota. Quoique nous ayons toujours vû de bons effets de la Décoction ci deſſus contre les Régles trop abondantes, cependant il s'eſt trouvé des perſonnes dont la poitrine étoit extrêmement délicate, qui ſe plaignoient qu'elle y cauſoit des tiraillemens. Il faut dans ce cas la faire plus legére, c'eſt-à-dire, l'étendre dans une plus grande quantité d'eau, y ajouter un peu de ſucre, n'y point éteindre de fer rouge, & prendre un potage une heure après le ſecond verre : avec ces précautions la poitrine n'en ſera point fatiguée.

Décoction contre la Leucophelmatie, ou Bouffiſure univerſelle.

Prenez des feuilles de Romarin, une poignée,

Faites les bouillir dans trois ſeptiers de vin rouge, à la réduction de deux verres que le Malade prendra tiédes le matin à jeun à deux heures de diſtance l'un de l'autre, reſtant dans le lit, & ſi tenant bien couvert.

Remarque. Cette Décoction eſt ſudorifique, & exprime par la voie des ſueurs la lymphe accumulée dans les vaiſſeaux lym-

lymphatiques qui cauſe la Bouffiſſure. Si le Malade, pendant l'effet du reméde, ſe plaint d'une eſpéce de langueur, ou de foibleſſe, on lui donnera de tems en tems une cuillerée de vin ou de bouillon. On pourra le réitérer après quelques jours de repos, ſi la Bouffiſſure n'eſt pas diſſipée; mais il faudra faire attention ſi le Malade a de la fiévre, & ne le donner que dans le déclin, ou l'intermiſſion des accès, & faire précéder le traitement par l'uſage des Tiſanes & Bouillons apéritifs décrits ci-deſſous (*a*).

Décoction purgative contre l'Hydropiſie Aſcite, ou de Bas-Ventre.

Prenez de l'écorce intérieure de Sureau, qui eſt verte, une poignée.

Faites-la bouillir dans une chopine d'eau, & autant de lait de Vache.

Réduiſez le tout à moitié.

Paſſez enſuite par un linge avec expreſſion, & partagez en trois doſes, à donner tiedes d'heure en heure le matin à jeun, en ſuprimant la troiſieme, ſi les deux premieres ont vuidé ſuffiſamment.

Remarque. Ce Reméde agit puiſſamment par le vomiſſement & par les ſelles. Si après l'avoir pris la premiere fois, on n'eſt pas aſſez purgé, ni déſenflé, on pourra le réitérer au bout de quelques jours. Plu-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 43. *& des Bouillons.*

sieurs Malades ont été guéris parfaitement après quelques prises de cette Décoction, qui quelquefois continue son effet deux ou trois jours de suite. Ainsi il faut prendre garde si les Malades sont affoiblis, ou même épuisés par la longueur de la Maladie; & en ce cas ne leur donner que la moitié de la dose qu'on pourra réitérer plus souvent, comme de deux jours l'un, suivant son effet.

Il sera nécessaire d'avoir fait précéder la Tisane apéritive ou les Bouillons apéritifs décrits ci-dessus (*a*), & de se servir de la Décoction ci-dessus en guise de Purgatif, quand il en sera besoin.

Décoction contre les Fleurs blanches & des Hémorrhagies de la Matrice.

Prenez du lait de Vache nouvellement trait, une chopine,
des sommités fleuries d'Ortie blanche, une poignée,
de la Canelle concassée, un scrupule;
Faites bouillir le tout legérement à la consomption d'un bouillon.

Coulez pour une dose, à prendre le matin à jeun pendant neuf jours.

Remarque. Les Fleurs blanches sont un écoulement d'une humeur séreuse, blanchâtre, jaune, ou verdâtre, qui découle des parties naturelles du sexe, tantôt con-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tisanes*, pag. 38. *& des Bouillons.*

tinuellement, tantôt périodiquement, & quelquefois irrégulierement. Ce flux eſt quelquefois âcre & mordicant, ſans odeur, ou avec une très-grande fêteur. Les perſonnes qui en ſont attaquées deviennent pâles & ſans couleur ; elles perdent l'apetit, & amaigriſſent ſenſiblement par le défaut de ſuc nourriſſier. Cet état les rend triſtes & mélancoliques ; les yeux deviennent gros & enflés, & la reſpiration difficile. Dans les commencemens de la maladie, les Mois paroiſſent à l'ordinaire, mais dans la ſuite ils ne viennent plus, & il ſurvient alors une petite fiévre irréguliere accompagnée de friſſonnemens, de dégoûts, de douleurs à l'eſtomac, aux lombes & aux aines, & quelquefois de vomiſſemens ; avec une opreſſion de poitrine, & des vertiges.

Cette maladie, quoique très-commune, & ſur laquelle la Médecine a beaucoup travaillé, eſt néanmoins très-difficile à guérir, & à moins qu'on ne la traite avec méthode, elle devient rebelle à toutes ſortes de Remédes. La plûpart des femmes ou des filles n'y font dans les commencemens aucune attention ; & faute de ſe plaindre, & de ſe faire traiter, elles tombent dans un état de langueur qui les conduit quelquefois juſqu'au tombeau. Elles ne doivent donc pas négliger de ſe guérir, lorſqu'elles s'aperçoivent qu'elles en ſont attaquées : voici la méthode qui nous a paru la plus ſûre pour cela.

On commence par les Remédes généraux, c'eſt-à-dire, la ſaignée & la purga-

tion, encore peut-on se passer de la premiere, si la Malade est foible. On prend ensuite pendant neuf jours la Décoction contre les Fleurs blanches décrites ci-dessus ; on réitére la purgation, & l'on en vient à notre Poudre contre la même maladie (*a*), dont l'usage se continue aussi pendant neuf jours, & se termine par se purger. On continue ensuite pendant un mois l'infusion de Véronique mâle ou de Romarin que l'on a prise avec la Poudre ; & si l'écoulement des Fleurs blanches n'a pas totalement cessé, on recommence dans le même ordre les Remédes ci-dessus, après quelque intervale de repos, pour achever la guérison. Mais à quoi doivent principalement faire attention les personnes attaquées de Fleurs blanches, c'est d'observer en tout tems un régime de vie exact, ne mangeant rien qui puisse occasionner de mauvaises digestions : sans cela la cure en est impossible, cette maladie étant quelquefois causée, & toujours entretenue par les mauvais levains de l'Estomac.

Décoction contre les douleurs après l'Accouchement, & la diminution ou supression des Vuidanges.

Prenez des feuilles
d'Armoise,
de Camomille Romaine, de chacune une poignée ;

(*a*) *Voyez le Chapitre des Poudres.*

des Pois rouges, ou Haricots, une once ;

Faites bouillir le tout dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à une pinte.

Coulez la Décoction, & donnez-là tiéde verre à verre, d'heure en heure, en ajoutant quelques goutes d'eau de Canelle, s'il y a de la foibleſſe.

Il faut en même-tems renfermer le marc des herbes entre deux linges, & l'apliquer le plus chaudement qu'il ſe pourra au deſſous de la région ombilicale.

Remarque. Il ſe fait d'ordinaire après l'accouchement un écoulement ſanguin qui dure pluſieurs jours, & qui changeant peu à peu de couleur, ſe termine en une lympe purement laiteuſe. Cet écoulement s'apelle Vuidanges, ou Lochie ; & il eſt d'une grande conſéquence qu'il ne ſe ſuprime point, & qu'il ne diminue que peu-à-peu : car une ſupreſſion ſubite empêchant la Matrice de ſe dégorger des grumeaux de ſang qui s'y ſont formés, la Malade eſt attaquée tout-d'un-coup de coliques & de tranchées violentes dans ce viſcére. La douleur qu'elle reſſent eſt très-vive, & par élancemens : le ventre devient tendu & élevé, & elle reſſent à l'eſtomac & au diaphragme une opreſſion qui l'empêche de reſpirer librement. La fiévre qui ſe met de la partie, eſt aiguë, avec un pouls petit, dur & précipité : les redoublemens ſont fréquens, inégaux & irréguliers ; & enfin la Malade eſt travaillée d'une grande douleur de tête particuliérement ſur le devant,

vers la racine des yeux ou le fond de l'orbite. Tous ces symptômes fâcheux sont bientôt suivis d'une inflammation mortelle de bas-ventre ; si l'on n'y remédie promptement ; mais il faut bien se garder de prendre ici le change, & de vouloir rapeler les Vuidanges par des Remédes vifs & stimulans, tels que l'Aloës & la Myrrhe ; ce qui n'arrive que trop souvent dans la pratique : il faut donc faire attention aux causes de cette supression, qui dépend souvent de la tension douloureuse des parties naturelles, causée par les tiraillemens & les meurtrissures à la suite d'un accouchement laborieux. Au reste, quelle que soit la cause de cette supression, si les douleurs sont vives, & que la fiévre soit considérable, il faut saigner du bras, & même plusieurs fois s'il est nécessaire, pour prévenir l'inflammation. On donnera pour boisson notre Tisane commune, en y ajoutant un peu de graine de Lin, & un demi-gros de Nitre purifié par pinte : on y joindra un usage fréquent du Lavement anodyn & adoucissant ; & l'on fera prendre à la Malade, deux ou trois fois le jour, la Potion pour apaiser les douleurs après l'accouchement. Voilà pour l'intérieur : quant à l'extérieur, il faudra se servir de la Fomentation émoliente décrite ci-dessous (*a*), que l'on continuera jusqu'à-ce que les dou-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Apozêmes*, pag. 1. *des Tisanes*, pag. 34. *des Lavemens*, *des Potions altérantes*, *des Fomentations & des Poudres tempérantes.*

leurs aient ceſſé. Mais ſi les Vuidanges ſont ſeulement diminuées, ſans être ſupprimées, & que leur retardement ne ſoit accompagné d'aucun accident, alors pour procurer un écoulement plus abondant, on peut mettre d'abord en uſage la Crême de Tartre, ce qui réuſſit ſouvent. Ce ſel eſt un apéritif très-tempéré, propre à aider doucement l'évacuation des Vuidanges; on en prend un gros & demi ou deux gros, que l'on diviſe en trois doſes, & qu'on donne à la Malade à des diſtances égales dans la journée, dans un petit peu de Tiſane ou de Bouillon, & ſi cela ne ſuffit pas, on en vient à la Décoction ci-deſſus, dont on entremêlera l'uſage avec nos Poudres tempérantes, & l'Apozême tempérant.

---

§. III. DES INFUSIONS. *

Infuſion contre la Coqueluche des Enfans.

PRenez de l'eau bouillante, une pinte.
Ajoutez-y du Miel de Narbonne, une once,
Ecumez-le ſur le feu une ou deux fois, & retirez le vaiſſeau.

* L'Infuſion *eſt un médicament interne liquide, compoſé d'une liqueur chargée de quelques parties de racines, de feuilles, de fleurs, &c. ce qui ſe fait ſans ébulition, mais ſeulement par la macération.*

Faites-y infuſer enſuite du Serpolet, une poignée.

Coulez après une demi-heure d'infuſion, pour ſervir de boiſſon pendant quelques jours.

Remarque. La Coqueluche eſt une maladie très-commune parmi les enfans : on la connoît par leur toux violente, dont les accès ſont ſi longs, qu'ils deviennent violets, & prêts à être ſuffoqués. Les Syrops adouciſſans, & l'Huile d'amandes douces dont on ſe ſert ordinairement, leur font plus de mal que de bien. La maladie venant de l'eſtomac & non pas de la poitrine, on doit leur tenir le ventre libre par des Lavemens émoliens, & leur faire uſer pendant quelques tems de l'Infuſion ci-deſſus, dont on fera précéder l'uſage par la purgation, s'ils ſont ſans fiévre. Que ſi après quelques jours on remarque qu'ils ont encore de la peine à jetter les humeurs gluantes qui cauſent leur mal, on leur fera prendre le matin à jeun ſix grains d'iris de Florence en poudre nouvellement faite, dans une ou deux cuillerées d'eau de Chardon benit, ou une doſe de Sirop Royal émétique proportionnée à leur âge ; on évacuera par ce moyen les flegmes gluans de l'eſtomac qui cauſent la maladie ; & ſi la poitrine a été beaucoup fatiguée par la toux, on finira le traitement en leur faiſant prendre du lait coupé avec l'eau d'Orge pendant quelques jours

Infusion Céphalique contre les Etourdissemens & menaces d'Apoplexies.

Prenez un pot de terre neuf verniſſé, qui contienne un peu plus de deux pintes : empliſſez-le juſqu'aux trois quarts d'Abſynthe jeune & bien mûre, achevant de le remplir de feuilles de petite ſauge, & de graine de Geniévre dans ſa maturité ; verſez enſuite deſſus, ſans preſſer les herbes, deux pintes de bonne eau de-vie. Luttez le pot exactement avec de la pâte, le laiſſant infuſer à l'ombre pendant ſix ſemaines ou deux mois ; paſſez enſuite la liqueur par un linge avec un peu d'expreſſion, & gardez-la pour l'uſage dans une bouteille bien bouchée.

On mettra une cuillerée à caffé de cette liqueur dans le fond d'un verre, achevant de le remplir d'eau commune que l'on verſera de haut, pour que le tout ſe mêle bien, & on prendra ce Reméde pendant quinze jours, le matin à jeun, déjeûnant une heure après ; il faudra enſuite en diſcontinuer l'uſage pendant quelque-tems, pour le reprendre de la même façon.

Remarque. Cette Infuſion fortifie le cerveau, & rétablit les digeſtions, dont le dérangement & la crudité cauſent ſouvent les étourdiſſemens, & diſpoſent à l'Apoplexie. Nous en avons vû de très-bons effets dans ces maladies, aprés avoir fait précéder les Remédes généraux, c'eſt-à-dire, la Saignée & la purgation ; ſi le Ma-

lade ad éja eſſuyé quelque attaque d'Apoplexie, au lieu de la mêler dans de l'eau, il en faut prendre le matin une cuillerée à bouche toute pure.

Quant au purgatif dont les perſonnes menacées d'Apoplexie doivent ſe ſervir, nous leur conſeillons de donner la préférence à notre Opiate Martiale, fondante & purgative, décrite ci-deſſous (*a*). C'eſt un excellent Fondant des glaires de l'eſtomac, & qui convient parfaitement à leur état.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Opiates.*

CHAPITRE II.

TISANES, HYDROMELS, & Emulſions.

§. I. DES TISANES.*

Tiſane commune.

PRENEZ des racines de Chient-dent épluchées & concaſſées, une demi-poignée, ou de l'Orge mondée, deux onces. Faites-les bouillir dans deux pintes d'eau commune, que vous réduirez à trois chopines.

* La Tiſane *eſt une eſpece de Boiſſon legére, compoſée de Racines, de Feuilles & de Fleurs, auſquels on ajoute quelquefois des Sels.*

Ajoûtez ſur la fin

de la Réglisse effilée, deux gros.

La colature pour boiſſon ordinaire, légérement dégourdie.

Remarque. Cette Tiſane rafraîchit modérement ; elle eſt un peu apéritive, & fait couler les urines. On peut s'en ſervir pour boiſſon ordinaire dans toutes les maladies aiguës ; & même ſi le Malade ne touſſe point, on fera bien d'y ajouter par pinte un gros de Nitre purifié ; elle rafraîchira davantage.

On faiſoit autrefois dans les maladies aiguës, bien plus d'uſage que la Tiſane qu'on ne fait à preſent : elle ſervoit preſque d'unique aliment tant que la maladie ſe ſoutenoit dans ſa force ; & l'on ne connoiſſoit point alors les Bouillons à la viande, qui ſe ſont introduits dans la pratique de la Médecine par le préjugé des Malades qui craignent une diéte ſevére, & par la tolérance des Médecins. Il eſt étonnant que dans le ſiécle où nous vivons, on ait tellement annéanti les Régles des Anciens ſur le régime de vivre convenable dans les grandes maladies, que l'on y donne des bouillons chargés de ſucs de viandes plus que l'on n'en conſommeroit en ſanté, & cela au moins de quatre heures en quatre heures, ſans diſtinction de tems & de tempéramens, & juſques dans les redoublemens les plus orageux. Ces bouillons bien loin de nourrir, ne ſe digérent point à cauſe de l'ardeur de la fiévre, & même ſe corrompent très-promptement dans l'eſto-

mac ; de-là viennent les raports vidoreux les vomiſſemens, les diarrhées, & d'autres ſymptômes qui marquent l'abondance des matiéres putrides accumulées dans les premiéres voies, & qui, paſſant dans le ſang, augmentent & prolongent la maladie. On pourroit cependant éviter un déſordre ſi funeſte, en ſe raprochant de la méthode des Anciens ; c'eſt-à-dire, en faiſant boire beaucoup plus de Tiſanne, ou des Décoctions d'herbes convenables, & en rendant les bouillons ſi legers, (puiſqu'il ſeroit inutile de les défendre,) qu'ils ne puiſſent pas augmenter l'incendie dans un corps déja embraſé par l'ardeur de la fiévre.

Tiſane rafraîchiſſante avec le Citron.

Prenez un Citron de moyenne groſſeur. Coupez-le par tranches minces, & verſez deſſus une pinte d'eau commune, en ajoutant aſſez de ſucre pour corriger une partie de l'acidité.

Tranſvaſez le tout trois ou quatre fois d'un vaiſſeau dans un autre pour le bien mêler, & ſervez-vous de cette Tiſane pour boiſſon ordinaire.

Remarque. Cette Tiſane eſt utile dans les fiévres ardentes & malignes, pour apaiſer la ſoif, & réprimer le bouillonnement de la bile & du ſang : elle diſſipe les langueurs, & elle arrête les vomiſſemens qui ſont excités par une bile noire & réſineuſe ; & comme elle réprime beaucoup l'acrimonie des humeurs, elle convient dans

bien des cas où l'inflammation eſt à craindre. Mais il faut obſerver de ne la pas donner indifféremment dans toutes les fiévres inflammatoires, comme on fait quelquefois, & ſans aſſez de précaution : car par ſon acidité elle eſt contraire dans pluſieurs maladies, comme, 1°. dans la Pleuréſie, la Péripneumonie, le Crachement du ſang, la Phthiſie, & dans les autres maſadies du Poumon ; 2°. dans l'inflammation de l'eſtomac & des inteſtins, dans la Diſſenterie, le Piſſement de ſang, & les Ulcéres des Reins & de la Veſſie : car ſi le Poumon eſt attaqué, elle excite la toux ; & ſi le ſiége de l'inflammation eſt dans l'eſtomac ou les inteſtins, elle y cauſe des tranchées, & y produit des Aphthes ou petits Ulcéres qui forment des Diarrhées, & des Lienteries dangereuſes. Il faut donc s'en abſtenir dans toutes ces maladies, & ne la preſcrire que dans les fiévres malignes, ou dans les inflammations qui dépendent d'une bile éxaltée & miſe en mouvement ; alors elle fera du bien. Nous devons encore avertir ici, qu'il faut éviter de donner alternativement dans les fiévres aiguës de la limonade, & des émulſions, comme on fait quelquefois, parce que l'acide du Limon coagule promptement la ſubſtance laiteuſe de l'émulſion, & la fait aigrir & corrompre dans l'eſtomac ; ce qui produit un très-mauvais effet : il faut donc lorſqu'on veut ſe ſervir de ces ſortes de boiſſons, les donner à différens jours, afin qu'il n'en arrive aucun inconvénient.

Tiſane tempérante & apéritive, autrement dite Tiſane de Santé.

Prenez de la meilleure Avoine, nettoyée & lavée, deux onces;
de la racine de Chicorée ſauvage, récente & ratiſſée, une once & demie.

Faites bouillir le tout pendant une demi-heure dans trois chopines d'eau de riviére.

Ajoutez-y ſur la fin
du Cryſtal Minéral, deux gros,
du Miel blanc, ou de Narbonne, deux onces.

Laiſſez encore bouillir le Miel pour l'écumer une ou deux fois; paſſez enſuite le tout par un linge, & mettez le dans une cruche, où vous le laiſſerez refroidir.

Cette Tiſane ſe prend pendant quinze jours à la doſe de deux verres tiédes le matin, & autant l'après-dînée pour les perſonnes fortes & robuſtes, & d'un verre le matin, & autant l'après-dînée, pour les perſonnes délicates & infirmes.

Remarque. Cette Tiſane adoucit l'acrimonie des humeurs, & en tempére le bouillonnement: elle chaſſe les vents, diviſe les matiéres viſqueuſes qui ſe trouvent dans les bronches du Poumon, & dans les autres parties du corps; & comme elle dégage les Reins, elle pouſſe les impuretés du ſang par les urines, ce qui

eſt l'évacuation qui dérange le moins la nature.

Tiſane pectorale-adouciſſante.

Prenez de la racine de Guimauve lavée, une demi-once ;
de la graine de Lin renfermée dans un nouet,
des fleurs de Tuſſilage,
de Mauve,
de chacune une pincée ;
de la Régliſſe, deux gros,

Verſez ſur le tout une pinte d'eau bouillante, & après une demi-heure d'inſuſion, paſſez la liqueur pour boiſſon ordinaire, legérement dégourdie.

Remarque. Cette Tiſane eſt utile principalement pour deux choſes ; 1°. Pour les maladies du Poumon, l'enrouement, la toux, le catarre, l'aſthme, la phtiſie, & la pleuréſie : pour épaiſſir la pituite trop claire, l'adoucir lorſqu'elle eſt ſalée & âcre ; pour lubréfier & adoucir la Trachée-artére qui eſt séche & rude, & pour aider l'expectoration.

2°. En qualité d'adouciſſante, elle convient dans les maladies des Reins & de la Veſſie, qui dépendent de l'acrimonie de l'urine, du calcul & des graviers, elle envelope par ces parties mucilagineuſes les ſels de l'urine, en rendant en quelque maniére la mucoſité qui a été enlevée à la Veſſie, & en facilitant la deſcente & la ſortie des graviers : ainſi on doit s'en ſer-

vir préférablement à toute autre dans l'ardeur d'urine. La seule attention qu'il faut avoir, c'est de ne faire bouillir aucun des ingrédiens qui y entrent, parce qu'elle deviendroit trop mucilagineuse & trop gluante, & par-là dégoûteroit le Malade, & lui chargeroit l'estomac.

On aura soin aussi de ne mettre que deux gros de racine de Guimauve, si elle est séche.

Tisane diurétique - adoucissante contre la Colique Néphrétique.

Prenez des racines de Chien-dent épluchées & concassées, une demi-poignée,
des fruits d'Alkekenge, une demi-douzaine.

Faites bouillir le tout dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à une pinte ; après quoi faites infuser dans la liqueur toute chaude de la racine
de Guimauve lavée,
de la graine de Lin,
de la Réglisse effilée,
de chacune deux gros.

La colature pour boisson ordinaire, tiéde.

Remarque. La Colique Néphrétique se connoît par une douleur fixe que le Malade ressent dans le Rein, comme d'une aiguille qu'on y auroit enfoncée. Cette douleur est aiguë, & revient par élancemens ; elle est quelquefois si violente, qu'elle cause des défaillances & des sueurs

qui dissipent entiérement les forces : elle se prolonge le long des hanches jusqu'aux aines ; & elle est accompagnée de naussées, de douleurs d'estomac, & de vomissemens de bile. Le ventre est entiérement suprimé, & rempli de vents qui reviennent continuellement par la bouche : on a de même des envies fréquentes d'uriner, quoiqu'on ne le fasse qu'avec douleur à cause de l'acrimonie de l'urine. Cette urine est d'abord claire & sans sédiment, ensuite plus rouge, enfin épaisse, & pleine de matiéres glaireuses. Les extrêmités sont froides : la jambe du côté malade est engourdie ; & à peine peut-on se soutenir & marcher : il survient une fiévre continue & irréguliére dans ses redoublemens, qui est tantôt plus forte, & tantôt plus legére. Cet état est très-fâcheux, & a besoin de tous les secours de la Médecine. On s'apperçoit que le mal veut se dissiper, par la cessation des douleurs que l'on ressentoit auparavant, & par l'abondance & la grossiéreté de l'urine, qui laisse dans l'urinal un sédiment de bonne qualité ; ce qui est une marque de guérison.

On doit commencer le traitement par la saignée du bras, qui sera répétée promptement & plusieurs fois, si l'inflammation est considérable. On y joindra l'usage de notre Tisane pectorale adouciſſante (*a*)

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tisanes, pag.* 34. *des Lavemens, des Potions & des Juleps.*

pour boiſſon ordinaire, qui ſera accompagnée de la Potion huileuſe contre la Colique Néphrétique, de notre Julep ſomnifére, & du Lavement anodyn répété pluſieurs fois le jour; on ajoutera même une demi-once de Syrop Diacode à la Potion huileuſe, ſi les douleurs ſont très-vives. De plus, on ne doit pas oublier le bain ou demi-bain, dans lequel on mettra le malade deux ou trois fois le jour, y laiſſant chaque fois tant qu'il s'y trouvera bien. Lorſque par ce traitement continué ſuivant le beſoin, on aura calmé la douleur, & que les urines commenceront à ſe charger, & à couler avec plus d'abondance, alors on donnera la Tiſane ci-deſſus, qui agira plus puiſſamment que celle qu'on a employée dans l'accès, & qui convient mieux, lorſque les Reins commencent à ſe dégager. On y joindra le Lavement contre la Colique Néphrétique (*a*), qui concourera au même effet; & pour empêcher la récidive, le Malade ſe mettra à l'uſage d'une des deux Opiates contre la Néphrétique, décrites ci-deſſous (*b*), en commençant par la ſeconde, qui ſuffit ordinairement.

Tiſane de Patience.

Prenez de la racine de Patience ſauvage, mondée & coupée par morceaux, une once & demie.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Lavemens.*
(*b*) *Voyez le Chapitre des Opiates.*

Faites-la bouillir dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à une pinte.

Faites-y infuser enſuite de la Régliſſe effilée, deux gros.

Coulez, & ajoutez deux gros de Sel de Glaubert.

La doſe eſt de trois ou quatre verres tiédes par jour.

Remarque. Cette Tiſane lâche le ventre, fait couler la bile, & leve les obſtructions ſans affoiblir le ton des parties : car on découvre dans la Patience ſauvage, de même que dans la Rhubarbe, une vertu un peu aſtringente, ou la vertu de fortifier le reſſort des fibres qui eſt trop relâché ; c'eſt pourquoi elle convient dans la Jauniſſe, & pour emporter les obſtructions du Foie & de la Rate. On s'en ſert auſſi avec ſuccès contre la galle, les dartres & les autres maladies de la peau ; mais il faut la continuer au moins quinze jours ou trois ſemaines, ſi l'on veut en reſſentir un bon effet.

Tiſane apéritive.

Prenez des racines de Chien-dent épluchées, & concaſſées, une demi-poignée ;
de celles d'Arrête-bœuf,
de Chardon-Roland,
de chacune une demi-once.

Faites bouillir le tout dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à une peinte.

Ajoutez-y ſur la fin de la Régliſſe effilée, deux gros.

Coulez, & faites fondre dans la colature de l'*Arcanum duplicatum*, un gros.

Le tout pour boiſſon ordinaire légérement dégourdie.

Remarque. Cette Tiſane diviſe les humeurs épaiſſes & gluantes dont les Viſcéres ſont quelquefois engorgés, & enléve les obſtructions. Elle ſert encore avantageuſement pour prévenir la Néphrétique, & la ſupreſſion d'urine, parce qu'elle réſout & fait couler le mucilage épais qui ſéjourne dans les Reins, & dans la Veſſie; ainſi on doit l'employer dans les embarras du Foie, du Mézentére, contre les graviers, & dans l'Hydropiſie.

On doit la prendre pendant quinze jours, & ſe purger le cinquiéme jour, & en la finiſſant, avec l'Opiate fondante purgative d'écrite ci-deſſous (*a*).

Tiſane aſtringente contre l'Hémophthiſie, ou *le crachement de Sang*, *& les Hémorragies.*

Prenez des racines de grande Conſoude ratiſſées, & coupées par tranches, une once;

du Ris lavé, deux gros.

Faites bouillir le tout dans deux pintes d'eau réduites à trois chopines, & ſur la fin ajoutez-y de la Régliſſe effilée, deux gros.

La colature tiéde pour boiſſon.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Opiates.*

Remarque. L'Hémophthiſie eſt une expectoration du ſang de la Trachée-artére, ou des Poumons. Cette maladie ſe connoit à la ſimple vue : car le ſang vient certainement du Poumon, s'il eſt rejetté par intervales en touſſant fortement, ſans douleur, écumeux, délayé & d'un beau rouge : celui qui s'échape de la Trachée-artére eſt auſſi quelquefois écumeux ; mais il eſt en moindre quantité, il produit toujours quelque douleur, & monte dans la bouche après une toux legére par une forte expiration. On pourroit confondre l'Hémophthiſie avec le ſang qui vient quelquefois du cerveau, que l'on crache avec la ſalive, ou que l'on rend en ſe mouchant parmi la muſcoſité du nez ; mais cet épanchement de ſang cauſe pour l'ordinaire un chatouillement au palais, & eſt précédé d'une douleur ou d'une peſanteur de tête, qui s'apaiſe après l'éruption. La délicateſſe du tiſſu du Poumon, jointe à la ſalure & à l'acrimonie du ſang qui en corrode les vaiſſeaux, ſont les cauſes les plus ordinaires de l'Hémophthiſie. Cette maladie eſt fort dangereuſe ; & lorſqu'on n'y remédie pas de bonne heure, il ſe forme un ulcére dans le Poumon, dont la Phthiſie, la fiévre étique, la langueur & la mort ſont les ſuites funeſtes.

Il faut commencer le traitement par la ſaignée du bras, qui ſera répétée, ſi le crachement de ſang eſt conſidérable. On donnera pour boiſſon ordinaire la Tiſane ci-deſſus, dont la viſcoſité eſt pro-

pre à envelopper les âcretés du ſang ; on y joindra les Bouillons & la Potion contre l'Hémophthiſie décrits ci-deſſous (*a*), ſans oublier de tenir le ventre libre par des Lavemens ſimples ou émolliens. Ces Rémédes ſuffiront pour l'ordinaire ; mais ſi le crachement de ſang ne céde pas, & ſi la toux eſt violente, alors il faudra ajouter au traitement ci-deſſus le Lohoch & le Bol contre l'Hémophthyſie. Voyez ces Articles.

Nota. On aura attention de ne pas faire bouillir long-tems cette Tiſane : car elle deviendroit trop gluante, & par-là deſagréable au goût, & peſante ſur l'Eſtomac.

On obſervera encore, que ſi l'Hémorragie que l'on a à traiter eſt cauſée par l'ouverture de quelque vaiſſeau qui ſe dégorge dans les premiéres voies, il faudra ôter le Ris, & mettre à ſa place une demi-poignée de Millefeuille, & autant d'Ortie-griéche. On a reconnu dans ces deux plantes une vertu ſinguliére pour guérir cette eſpéce d'Hémorragie.

Tiſane Vulnéraire.

Prenez des Vulnéraires de Suiſſe, trois pincées ;
Verſez deſſus une pinte d'eau bouil-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Bouillons, des Lavemens, des Potions, des Lohochs, & des Bols.*

lante, & laiſſez infuſer pendant une demi-heure, dans un vaiſſeau couvert.

Edulcorez enſuite la colature avec du
Syrop de grande Conſoude,
ou de Roſes ſéches, une once.

La doſe eſt d'un verre tiéde de trois heures en trois heures.

Remarque. Cette Tiſane eſt propre à diſſoudre le ſang extravaſé dans la tête, dans la poitrine, & par-tout ailleurs, par des chûtes, des coups, & des efforts extraordinaires ; dans les plaies, les abſcès, les ulcéres & les fiſtules récentes & invétérées, tant internes qu'externes, & dans toutes les maladies de la Peau.

L'attention qu'il faut avoir, eſt que le Malade ſoit ſans fiévre, ou du moins ſans fiévre conſidérable, parce qu'étant chaude, elle augmenteroit le mouvement du ſang. On s'en ſert encore très-efficacement dans les Bouffiſſures, & les Hydropiſies naiſſantes, en ce qu'elle provoque abondamment les urines : enfin, elle contribue beaucoup à procurer du ſoulagement dans la Paraliſie, les Rhumatiſmes, la Goutte, la Gravelle, dans le Flux de Sang, & dans les cours de ventre invétérés.

Si l'on s'en ſert pour une chûte, qui eſt le cas où on l'emploie le plus ordinairement, on y joindra l'uſage d'une des deux Potions contre les chûtes décrites ci-deſſous (*a*).

(*a*) *Voyez le Chapitre des Potions altérantes.*

Tisane Sudorifique.

Prenez des bois de Buis,
de Génévrier, de chacun une once & demie :
de la rapure de bois de Gayac, six gros ;
du Saſſafras, trois gros ;
de l'Anis, un gros.

Concaſſez les bois par petits morceaux, & verſez ſur le tout quatre pintes d'eau bouillante, le laiſſant infuſer trente heures ſur les cendres chaudes dans un vaiſſeau luté exactement avec de la pâte.

Paſſez enſuite la liqueur refroidie, & gardez-là en un lieu frais dans des bouteilles bien bouchées.

La doſe eſt de deux à trois verres tiédes par jour, à prendre un le matin une heure avant que de ſe lever, l'autre ſur les cinq heures du ſoir, & le troiſiéme en ſe couchant.

Remarque. Cette Tiſane eſt bonne contre les Rhumatiſmes, la Sciatique, les maux de tête qui viennent d'abondance de ſéroſités, & pour deſſécher, atténuer le Sang, & chaſſer par la tranſpiration les humeurs nuiſibles du corps. Ainſi elle convient à toutes les perſonnes pituiteuſes, & qui abondent en eaux ; à celles qui ſont ſujettes aux Diarrhées ſéreuſes, & aux vomiſſemens habituels ; enfin à tous ceux qui ſont menacés d'Apoplexie, ou de Paralyſie ſéreuſe. On s'en ſert encore avantageuſement

geuſement contre la Galle, les Dartres, les Humeurs froides, & toutes les maladies de la peau qui reconnoiſſent pour cauſe une lymphe âcre & viſqueuſe. Pluſieurs Praticiens dans ces derniers cas ſe ſervent d'eau de Chaux au lieu d'eau commune, parce qu'elle eſt deſſicative, & y font infuſer à froid pendant quatre jours les bois ſudorifiques ; après quoi ils s'en ſervent comme nous la preſcrivons ici.

Tiſane ſudorifique & laxative.

Ajoutez à la Tiſane ſudorifique ci-deſſus, après vingt-quatre heures d'infuſion,

du Séné mondé, une once ;
de la poudre de Jalap, un gros & demi ;
du Sel de Glauber, une demi-once ;

Et après avoir luté de nouveau le vaiſſeau, laiſſez infuſer le tout chaudement pendant douze heures.

Paſſez enſuite la liqueur refroidie, & gardez-la en un lieu frais, dans des bouteilles bien bouchées.

La doſe eſt de deux verres tiédes dans la matinée, un avant de ſe lever, comme dans la précédente, & le ſecond, trois heures après ; que ſi l'on n'eſt pas fatigué par trop d'évacuation, on peut en prendre un troiſiéme ſur les cinq heures du ſoir.

Remarque. On joint dans la Tiſane ci-

deſſus les Purgatifs aux ſudorifiques, afin d'évacuer en même-tems les impuretés des premieres voies par les ſelles, & celles du ſang par la tranſpiration ; ce qui produit toujours un bon effet dans les tempéramens pituiteux & relâchés, dont les digeſtions ſe font mal ordinairement, tant par la foibleſſe de l'Eſtomac, que par la ſurabondance de ſéroſités qui en énerve les levains. Mais il en eſt des Sudorifiques comme de beaucoup d'autres Remedes, qui conviennent en certaines circonſtances, & deviennent nuiſibles en d'autres : on doit donc en interdire l'uſage aux perſonnes qui ſont d'un tempérament trop ſec, chaux & bilieux ; à celles qui ont la poitrine foible, ou qui ſont amaigries & exténuées de maladies, ou de quelques excès de débauche ; à celles qui ſuent ordinairement de foibleſſe, principalement la nuit, ou qui ont le ventre naturellement conſtipé : il faut encore ſe garder de faire prendre les Sudorifiques aux femmes enceintes, & lorſque le tems des régles aproche, pendant leur durée, & ne les donner que deux jours après qu'elles ont ceſſé.

Cette exception doit encore avoir lieu, dans les Hémorragies, dans les Inflammations du bas-ventre, dans celles de la poitrine qui ne dépendent pas de la Pleuréſie (où on les place quelquefois avec ſuccès) & dans l'ardeur de la fievre dont on doit toujours attendre le déclin. On ne doit point non plus les ordonner dans les Phthiſies, dans la fiévre étique & ha-

bituelle, dans les douleurs accompagnées d'abſcès, d'ulcéres & de tumeurs carcinomateuſes, enfin dans toutes les maladies cauſées par un ſang bilieux, & dépourvû de ſéroſités.

Tiſane contre l'Apoplexie & la Paralyſie, ou autres affections des Nerfs.

Prenez de la racine de Raifort ſauvage ratiſſée & coupée par morceaux, deux onces; de la ſemence de Moutarde contuſe, une once & demie.

Verſez ſur le tout trois chopines d'eau bouillante, & laiſſez-le infuſer pendant vingt-quatre heures ſur les cendres chaudes, dans un vaiſſeau couvert & luté avec de la pâte.

Coulez enſuite la liqueur.

La doſe eſt de deux verres tiédes par jour, un le matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir.

Remarque. L'apoplexie ſe connoît aiſément. Le Malade eſt ſans ſentiment & ſans parole : il a les yeux fermés ; tous les efforts qu'on fait pour le réveiller ſont inutiles : ſa reſpiration eſt difficile ; & il ſemble que ſa poitrine ne puiſſe ſe dilater, ni ſurmonter la force inviſible qui l'oprime. On diſtingue deux ſortes d'Apoplexie, la Sanguine & la Séreuſe. La premiere eſt la plus dangereuſe : celui qui en eſt attaqué a le viſage rouge & enflammé ; ſon pouls eſt plus fort & plus dur

qu'à l'ordinaire ; ſes vaiſſeaux ſont gonflés & tendus ; & les extrêmités du corps ont une chaleur marquée. Il faut beaucoup ſaigner, tant du bras que du pied, dans cet Apoplexie ; & la guériſon, ſi elle a lieu, conſiſte preſque dans ce Remède. On accompagne la ſaignée de Lavemens purgatifs (*a*) ; & après avoir promptement & ſuffiſamment déſempli les vaiſſeaux, on fait vômir avec une de nos deux Potions émétiques ; & ſi le ſentiment n'eſt pas revenu, on aplique un large emplâtre véſicatoire entre les épaules, ou aux cuiſſes. On purge le lendemain de l'Emétique avec notre Potion purgative moyenne ; après quoi ſi le Malade eſt aſſez heureux pour en revenir, on lui fait faire uſage de notre Opiate fondante, martiale & purgative, & de notre Infuſion céphalique contre les menaces d'Apoplexie, ayant ſoin de le faire ſaigner de tems en tems, ſur-tout lorſque les vertiges, les éblouiſſemens, les peſanteurs de tête & de tout le corps le menaceront d'une nouvelle attaque.

Les perſonnes qui ont de la diſpoſition à cette maladie, auront encore attention de ne ſe point coucher l'eſtomac plein, & de ne point dormir la tête baſſe.

L'Apoplexie Séreuſe ôte également le ſentiment & la parole ; mais dans celle-ci le viſage eſt pâle ; les lévres ſont livides ;

(*a*) *Voyez les Chapitres des Infuſions*, pag. 31. *des Lavemens, des Potions purgatives, des Emplâtres, & des Opiates.*

le pouls eſt foible, lent & affaiſſé ; & la ſuperficie du corps, ainſi que les extrêmités, eſt ſans chaleur. Ces ſignes contraires à ceux de l'Apoplexie Sanguine, doivent les faire aiſément diſtinguer l'une de l'autre ; & il eſt d'une grande conſéquence de ne s'y pas tromper, puiſque le traitement en doit être différent, & que ce qui ſert à l'une nuit à l'autre. La Saignée, par exemple, eſt contraire à cette derniere Apoplexie ; & il faut l'éviter ſoigneuſement. On doit employer d'abord dans l'attaque le Lavement purgatif majeur (a), & la Poudre ſternutatoire ; on y joint l'aplication des Ventouſes ſcarifiées, ou d'un large Emplâtre véſicatoire entre les épaules. Il faut faire vômir enſuite avec l'Eau Minérale émétique, & purger bien-tôt après avec notre Potion purgative moyenne. Lorſqu'au moyen de ces évacuations le Malade eſt convaleſcent, on lui fait prendre les Eaux Thermales, comme celles de Bourbon, de Vichy, &c. ou à leur défaut, on le purge réguliérement tous les mois avec notre Opiate Martiale, fondante & purgative ; & dans l'intervalle il fait uſage de la Tiſane ci-deſſus, & de notre Infuſion Céphalique contre les menaces d'Apoplexie.

(a) *Voyez les Chapitres des Infuſions*, pag. 31. *des Lavemens, des Potions purgatives, des Poudres, des Emplâtres, & des Opiates.*

Tiſane dans la Rougeole & la petite-Vérole.

Prenez des racines de Scorſonére, mondées & coupées par morceaux, une once.

Faites-les bouillir dans trois chopines d'eau, réduites à une pinte.

Faites-y enſuite infuſer de la Régliſſe, deux gros.

La colature tiede pour boiſſon.

Remarque. On apelle Rougeole, une quantité de taches rouges, ou plutôt de petites tumeurs éryſipélateuſes, plates, étendues & contigues, reſſemblantes à des morſures de puces; elles ne ſupurent jamais, & ſortent par-tout le corps. Cette maladie eſt ordinairement accompagnée de toux & d'un peu de fiévre juſqu'à la fin de l'éruption. La petite-Vérole conſiſte en de petites tumeurs phlegmonneuſes, rouges dans leur contour, cauſant de la douleur & de la demangeaiſon, & croiſſant peu-à-peu juſqu'à ce qu'elles viennent à ſupuration. La fiévre eſt plus vive que dans la Rougeole.

Le traitement eſt le même pour ces deux maladies; il faut ſaigner d'abord & purger avant la ſortie des boutons & ne le point faire dès qu'ils paroiſſent, à moins d'une abſolue néceſſité. On donne de la Tiſane commune (*a*) juſqu'à ce que les boutons commencent à ſortir; on paſſe enſuite à celle ci-deſſus, donnant par

(a) *Voyez le Chapitre des Tiſanes*, pag. 34.

intervalles un peu de Confection d'Hyacinthe, ſans trop échauffer, mais pour entretenir ſeulement l'éruption. Si cependant le pouls eſt foible, que le Malade tombe quelquefois en foibleſſe, ayant le viſage pâle, & preſque point de chaleur aux extrêmités, on doit avoir recours à des Cordiaux plus actifs, tels que la Potion cordiale (*a*) décrite dans ce Livre. Au reſte, ce traitement ſupoſe que ces maladies n'ont aucune malignité, & qu'il ne faut qu'aider la Nature; mais ſi elles étoient accompagnées d'accidens, comme tranſport au cerveau, délire, convulſions, &c. alors il faudroit avoir recours à un Medecin expérimenté, qui varieroit le traitement ſuivant l'éxigence des cas.

Tiſane contre les Vers.

Prenez du Mercure crû enfermé dans un nouet, quatre onces;
des Racines de Fougére mâle,
de Raifort ſauvage, mondées & coupées par tranches, de chacune une once.

Faites bouillir le tout dans deux pintes d'eau, que vous réduirez à trois chopines.

La doſe eſt de quatre verres tiédes dans la journée.

Remarque. Il s'engendre ſouvent des Vers dans l'eſtomac & dans les inteſtins. On connoît cette maladie aux raports que l'on

(a) *Voyez le Chapitre des Potions altérantes.*

a d'un goût aigre-doux, à la pâleur du visage, à la demangeaison des narines ; & sur-tout, si ce sont des Enfans, lorsqu'ils ont le ventre tendu, qu'ils se plaignent de coliques, que leurs selles ont la couleur d'argile, & que leur sommeil est interrompu subitement par des cris & des tressaillemens. Quelquefois les Malades en rendent, soit par la bouche, soit par les selles ; & alors la maladie n'est plus douteuse. Les Vers incommodent plus la nuit que le jour : ils remontent en haut, lorsqu'on est à jeun ; & par leurs morsures ils picotent alors les intestins, travaillent les hypocondres & l'estomac, & causent les défaillances ou l'étouffement, le tremblement, le syncope, les convulsions, & même l'épilepsie. Les Enfans sont plus sujets que d'autres à cette maladie qui en fait mourir beaucoup, parce qu'ils sont plus remplis de crudités, & qu'on les laisse user inconsidérément d'alimens de mauvais suc, comme de fromage, de fruits crus, de pâtisserie, &c. qui sont toutes matieres propres à faire éclorre des Vers dans les Intestins.

Pour détruire les Vers, suivant la méthode qui nous a paru la plus sûre, il faut prendre pendant un mois ou six semaines la Tisane vermifuge ci-dessus : on y joindra pendant le même-tems, deux fois la semaine, le matin à jeun, le Bol contre les Vers, décrit ci-dessous (*a*), se pur-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Bols, des Pilules, des Tablettes, & des Cataplasmes.*

geant tous les dix jours avec une dose convenable de nos Pilules ou de nos Tablettes vermifuges. On pourra encore ajouter à ce traitement le Cataplasme contre les Vers, dont nous avons vu souvent de bons effets.

Notez que le Mercure peut toujours resservir.

Tisanes contre les Humeurs froides, ou Ecrouelles.

Prenez des sommités d'ortie blanche, une poignée.

Faites-les infuser à froid dans une pinte d'Eau commune.

La colature pour boisson pendant un mois.

Remarque. Les Ecrouelles sont des tumeurs lymphatiques qui affectent principalement les glandes du col, des aisselles, & les autres glandes proche les articulations des os ainsi elles paroissent souvent au coude, à la main, aux doigts, aux genoux, aux bras & aux jambes; quelquefois même elles se font jour par-tout le corps: il n'est pas rare non plus qu'elles attaquent les os, comme les côtes & le Sternum; & même les parties internes n'en sont pas exemtes. Ces tumeurs sont très-petites au commencement, & de la même couleur que la peau; elles deviennent un peu dures, & imitent les Schirres: elles grossissent peu-à-peu, deviennent molles, & causent une douleur legere & profonde,

ſur-tout lorſqu'on les touche & qu'on les preſſe ; enſuite la tumeur s'enflamme & vient à ſupuration Quelquefois elles font de la douleur, & s'amolliſſent, ſans qu'il paroiſſe aucune rougeur, la tumeur ſupurant en-dedans ; & elles carient les os de deſſous, avant que l'on ait aucun ſigne certain qu'elles ſupurent. Quand la tumeur ſupure, il en ſort une matiére purulente, viſqueuſe, pâle, blanchâtre ou jaune, ſans mauvaiſe odeur : quelquefois il n'y a qu'une tumeur ; d'autre fois il y en a pluſieurs en différentes parties. Dans le tems qu'elles ſupurent, le Malade eſt ſaiſi d'une fiévre lente, & perd ſes forces: il a le viſage pâle ; & ſi la ſupuration eſt abondante & dure du tems, il tombe dans le maraſme, ou l'amaigriſſement total.

Cette maladie provient d'une cauſe particuliere, qu'on nomme Virus écrouelleux, ou ſcrophuleux. La lymphe épaiſſie par ce Virus s'amaſſe peu-à peu dans les glandes ; elle y contracte de l'acrimonie par ſon ſéjour, & forme une tumeur, d'abord indolente, mais qui s'augmentant à la ſuite du tems, devient rouge, douloureuſe, & ſupure.

Pour guérir cette maladie, dont le traiteme n eſt fort long, & dure des années entiéres, il faut uſer de la Tiſane ci-deſſus pendant toute la cure. On donne en outre deux ou trois fois la ſemaine, ſuivant les forces du malade, le Bol contre les Ecrouelles décrit ci-deſſous (*a*) : on le

(a) *Voyez les Chapitres des Bols, des Opiates & des Onguents.*

purge deux fois le mois avec une doſe convenable de notre Opiate martiale, fondante & purgative ; & l'on aplique extérieurement l'Onguent contre les Ecrouelles, décrit dans ſon lieu. Nous pouvons aſſurer avoir guéri pluſieurs Sujets par cette méthode.

§. II. DES HYDROMELS.*

Hydromel ſimple.

PRenez de l'eau commune, une pinte.
Faites-la bouillir ; & ajoûtez-y du Miel blanc, une once & demie.
Ecumez le tout deux fois, puis paſſez-le par un linge.
La colature pour boiſſon ordinaire.

Remarque. Cet Hydromel eſt bon contre la toux des Vieillards, lorſque les crachats viennent avec difficulté. On le preſcrit auſſi dans les ulcéres internes du Poumon & du bas-ventre, pour en déterger la pourriture.

(*) L'Hydromel *eſt une eſpece de boiſſon compoſée d'eau & de miel bouillis enſemble, ſuivant une certaine proportion. On le diviſe en ſimple & en compoſé. Le ſimple eſt celui que nous venons de dire, où il n'entre que l'eau & le miel. Le compoſé eſt, quand outre l'eau & le miel, on y fait entrer quelqu'autre ingrédient.*

Hydromel composé.

Prenez des racines d'Aunée coupées par morceaux, une demi-once.

Faites les bouillir dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à une pinte.

Ajoûtez-y sur la fin
des feuilles d'Hyssope,
de Lierre terrestre,
de chacune une pincée;
du Miel blanc, une once & demie.

Faites bouillir le tout quelques momens pour écumer le Miel une ou deux fois, & retirez le vaisseau du feu.

La colature tiede pour boisson.

Remarque. Cet Hydromel convient contre la difficulté de respirer dans l'Asthme humide, parce qu'il divise & atténue les humeurs épaisses & gluantes qui sont fortement attachées aux Poumons, & qu'il en procure l'expectoration; il est encore utile dans les embarras des Reins ou de la Vessie, en faisant couler les glaires & les graviers qui causent quelquefois des embarras dans ces parties, & y donnent naissance à des Coliques Néphrétiques, & à des supressions d'urine. On y doit joindre dans le premier cas nos Pilules anti-Asthmatiques, pour se purger pendant son usage; & dans le second, on se servira en même-tems d'une des Opiates contre la Néphrétique, décrites dans leur lieu (*a*).

(*a*) *Voyez les Chapitres des Pilules & des Opiates.*

Hydromel Balſamique contre la Phthiſie,

Prenez des fleurs & ſommités bien nettes & récentes de Bétoine,
de Millepertuis,
de Bouillon blanc,
de Véronique mâle,
de chacune une demi-pincée, ou une pincée, ſi l'on n'en prend que de deux eſpeces.

Mettez le tout infuſer dans une pinte d'eau chaude l'eſpace d'une demi-heure, dans un vaiſſeau bien fermé.

Ajoûtez-y enſuite
du Miel de Narbonne, ou du Miel blanc, une once & demie.

La colature tiéde pour boiſſon.

Remarque. On ſe ſert avec ſuccès de cet Hydromel, lorſque les crachats ſont purulens: car il aide doucement l'expectoration, réſiſte à la pourriture en détergeant l'ulcére du Poumon, & facilite ſa réunion.

On doit employer pendant ſon uſage l'Opiate fondante contre les Tubercules du Poumon, décrite ci-deſſous (*a*).

(*a*) *Voyez le Chapitre des Opiates.*

§. III. DES EMULSIONS *.

Emulsion commune.

PRenez des quatre Semences froides majeures, une demi-once ; des Amandes douces pelées dans l'eau chaude, une demi-douzaine.

Pilez le tout dans un mortier de pierre ou de marbre, en versant dessus peu-à-peu une pinte de Décoction d'Orge mondé.

Passez ensuite par un linge, & édulcorez la colature
avec du syrop de Violette,
ou de Guimauve,
ou de Nénuphar, une once.

La liqueur tiéde pour boisson.

Remarque. Cette Emulsion est très-propre pour adoucir l'acrimonie du sang, & pour en apaiser la chaleur, au moyen des parties huileuses que l'on tire des Amandes & des Semences, lesquelles parties passant dans le sang, enveloppent les Sels qui y sont contenus, & en tempérent l'acrimonie : c'est pourquoi elle convient

* L'Emulsion *est une boisson laiteuse, composée de l'expression de certains fruits & de graines pilées ensemble dans un mortier de marbre, en versant dessus quelque eau ou liqueur, & en y ajoûtant quelque syrop convenable.*

dans toutes les chaleurs du ſang, dans les fiévres ardentes, les trop grandes veilles, l'ardeur d'urine, l'inflammation des reins ou de la veſſie, dans toutes ſortes de douleurs ; dans les diarrhées provenant d'irritation, les dyſſenteries & les hémorragies. Mais comme il faut qu'elle paſſe dans l'Eſtomac avant que d'entrer dans le ſang, elle eſt ſujette à s'y aigrir, y rencontrant des ſucs indigeſtes qui la corrompent. C'eſt pour cela que les bons Praticiens font toujours précéder les Purgatifs aux Emulſions, & en attendant, donnent des Juleps, qui ne ſouffrent pas la même altération.

Emulſion contre la Phthiſie.

Prenez des quatre Semences froides majeures, un gros & demi,
deux Amandes douces pélées dans l'eau chaude.

Pilez le tout dans un mortier de marbre, en verſant doucement deſſus un grand verre d'infuſion d'une pincée de Véronique mâle, & d'une demi-pincée de Lierre terreſtre, ou de fleurs de Tuſſilage.

Coulez enſuite la liqueur, & l'édulcorez avec une demi-once de Syrop de Violette, ou de Guimauve, pour une doſe à prendre le matin à jeun, qu'on peut répéter le ſoir en ſe couchant.

Remarque. Cette Emulſion ſe donne utilement aux Phthiſiques, au défaut de lait,

ou lorſqu'il ne paſſe pas bien ; & elle leur en tient lieu : car elle émouſſe & enveloppe les pointes âcres de la ſérosité du ſang, elle en empêche la diſſolution, & n'eſt pas ſujette aux mêmes dangers, parce qu'elle ne s'aigrit pas ſi facilement, n'ayant pas tant de parties ſulfureuſes que le Lait, qui puiſſent s'enflammer par le bouillonnement des humeurs.

Emulſion Narcotique.

Prenez quatre Amandes douces pelées dans l'Eau chaude,
des quatre Semences froides majeures, deux gros;
des ſemences de Pavot,
un gros & demi.

Pilez le tout dans un mortier de marbre, en verſant deſſus peu-à-peu un grand verre d'eau commune.

Coulez la liqueur, & ajoûtez-y enſuite du Syrop Diacode, depuis demi-once juſqu'à ſix gros, ou du *Laudanum* liquide de Sydenham, de douze à quinze gouttes.

Pour une doſe à prendre à l'heure du ſommeil.

Notez que ſi les Emulſions préparées avec l'eau froide chargent trop l'Eſtomac, on ſe ſervira d'eau bouillante ; & le Malade les prendra un peu tiédes.

On peut auſſi dans la même vûe y ajoûter un ſcrupule d'Yeux d'Ecreviſſes préparés.

Remarque. On preſcrit cette Emulſion

dans tous les cas où il faut procurer du repos aux Malades pendant la nuit, sur-tout lorsque leurs insomnies sont accompagnées d'agitations & d'inquiétudes, ou de violentes douleurs, qui ne leurs donnent point de relâche.

Emulsion Purgative agréable.

Prenez quatre Amandes douces pelées dans l'eau chaude, & un gros des quatre Semences froides majeures.

Pilez le tout dans un mortier de marbre, en versant dessus peu-à-peu un grand verre d'eau chaude, dans laquelle vous aurez fait fondre deux onces de Manne.

Passez ensuite par un linge, & ajoûtez de la Poudre de Comte, un scrupule;
de l'Eau de fleurs d'Orange,
une cuillerée, ou deux gros.

Le tout pour une dose à prendre le matin à jeun, & un bouillon deux heures après.

Remarque. Cette Emulsion convient aux Malades qui ont une répugnance invincible pour les Médecines ordinaires, ou qui sont sujets à les rejetter: elle purge doucement, & sans tranchées. On peut augmenter, ou diminuer de quelques grains la dose de la Poudre de Comte, suivant la force & l'âge du Sujet.

CHAPITRE III.

BOUILLONS ET VINS Médicamenteux.

§. I.

DES BOUILLONS MEDICAMENTEUX.

Bouillon ou *Eau de Veau.*

PRENEZ de la Rouelle de Veau, une demi-livre, ou la moitié d'un Poulet.

Faites-la bouillir dans trois pintes d'eau, que vous réduirez à la moitié.

Paſſez enſuite par un linge.

La colature pour boiſſon ordinaire.

Remarque. Cette eau de Veau eſt employée utilement en deux occaſions.

1°. Dans les maladies aigues, où on la preſcrit pour boiſſon ordinaire, en guiſe de Tiſane relâchante & rafraîchiſſante.

2°. Quand un Malade qui a beſoin d'être purgé, ſe trouve échauffé & reſſerré en

* *Le Bouillon médicamenteux ne différe de l'Apozême & de la Décoction, que par la viande que l'on y ajoute, & parce que l'on n'y met point de Syrop, comme dans les Apozêmes & les Décoctions. On le rend auſſi Purgatif, ſuivant les indications.*

même-tems, alors on le prépare à la Purgation par quelques pintes de cette eau, qu'il prend pendant trois ou quatre jours; après quoi on le purge avec facilité, & ſans inconvénient pour la ſuite.

Bouillon rafraîchiſſant.

Prenez de la Rouelle de Veau,
une demi-livre.
Faites-la cuire dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à deux bouillons.
Ajoutez la derniere heure
des feuilles de Pourpier,
de Bourrache,
de Poirée,
de chacune une demi-poignée; & une Laitue coupée en quatre.
Paſſez enſuite le tout par un linge avec une legére expreſſion, & partagez-le en deux doſes à prendre dans la journée, l'une le matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir.

Remarque. Ce bouillon humecte & rafraîchit; il donne une fluidité convenable au ſang & à toutes les humeurs; il adoucit l'âcreté qui s'y trouve, & en calme le bouillonnement: auſſi eſt-il très-propre dans toutes les indiſpoſitions qui viennent de chaleur & de ſéchereſſe; mais il ne doit pas ſe continuer long-tems, de peur qu'il ne relâche les fibres de l'Eſtomac, ce qui affoibliroit la digeſtion: ainſi lorſqu'on ſe trouve rafraichi après dix ou douze jours de ſon uſage, il faut le ceſ-

fer, pour y revenir dans un autre tems.

Bouillon pectoral adouciſſant.

Prenez un Moû de Veau ;
de petits Navets, une douzaine ;
des feuilles de Chou rouge,
de Pulmonaire tachée,
de chacune deux poignées ;
ou à leur défaut, des feuilles
de Bourrache,
de Bugloſe,
& de Chicorée blanche friſée,
de chacune une poignée.

Faites bouillir le tout dans trois pintes d'eau, que vous réduirez à quatre bouillons.

Coulez la liqueur, & partagez-la en quatre doſes à prendre en deux jours, une la matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir, en continuant pendant quinze jours.

Remarque. Ce Bouillon adoucit beaucoup l'acrimonie des humeurs de la poitrine, apaiſe très-bien la toux, & déterge les ulcéres qui commencent : ainſi on le preſcrit dans la Phthiſie, & dans tous les cas où la poitrine ſe trouve fatiguée des ſéroſités âcres qui s'y dépoſent. On aura attention de ne point couper le Moû de Veau par morceaux, comme on fait ordinairement, & de laiſſer tomber en dehors du pot la Trachée-Artére, qu'on apelle vulgairement le Cornet, afin que dans la cuiſſon, la matiére épaiſſe & gluante qui

remplit le poumon, puiſſe ſe dégorger par ce canal ; ſans cette précaution le Bouillon eſt épais, nébuleux & tout-à-fait déſagréable, au lieu que de cette maniére il eſt clair & ſans mauvais goût.

Bouillon tempérant & apéritif.

Prenez des racines d'Oſeille,
de Fraiſier,
de Piſſenlit,
de Chicorée ſauvage,
lavées, ratiſſées & coupées par morceaux,
de chacune une demi-once.

Faites-les bouillir avec une demi-livre de Rouelle de Veau dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à deux bouillons.

Ajoutez-la derniere demi-heure
des feuilles de Bourrache,
de Bugloſe,
de Chicorée ſauvage,
& d'Aigremoine,
de chacune une demi-poignée.

Paſſez enſuite par un linge avec une legére expreſſion, & partagez en deux bouillons à prendre pendant un mois, un le matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir.

On fera fondre dans chaque bouillon un gros de Sel de Glauber.

Remarque. Les effets de ce Bouillon ſont de tempérer les humeurs, de purifier le ſang, de lever les obſtructions des viſcéres, & d'ouvrir doucement le ventre : ainſi on

s'en ſert avantageuſement dans la Cachexie, dans la Mélancolie, dans la Jauniſſe, les chaleurs d'Entrailles, les Conſtipations, & dans toutes les affections Hypocondriaques accompagnées de chaleur ; il détruit peu-à-peu l'épaiſſiſſement des liqueurs qui cauſe & entretient preſque toutes les infirmités habituelles, & nous ne pouvons trop conſeiller aux perſonnes d'un tempérament ſec, bilieux & échauffé, qui ſe trouveront attaquées de quelques-unes des indiſpoſitions ſuſdites, d'en faire un long uſage. Elles doivent le prendre aux deux ſaiſons de l'année, du Printems & de l'Automne, ayant ſoin de ſe purger quelques jours après l'avoir commencé, & en le finiſſant.

Bouillon apéritif & laxatif.

Prenez des racines
de Chicorée ſauvage,
Patience ſauvage,
Aunée,
& Polypode de Chêne, ratiſſées & concaſſées, de chacune une demi-once.

Faites-les bouillir avec demi-livre de Collet de Mouton dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à deux bouillons.

Ajoutez la derniere demi-heure
des feuilles d'Aigremoine,
de Chicorée ſauvage,
de Bourrache,
de chacune une demi-poignée.

Coulez le tout avec une legére expreſſion, & partagez en deux doſes, à pren-

dre, une le matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir, faiſant fondre dans chacune un gros de Sel de Glauber, & ajoutant en outre à celle du ſoir vingt grains de Tartre Martial ſolube. On continuera ces Bouillons pendant quinze jours, & on aura ſoin de ſe purger avec notre Opiate fondante & purgative quelques jours après les avoir commencés, & en les finiſſant (*a*).

Remarque. Ce bouillon compoſé de Plantes ſtomachiques, apéritives & laxatives, convient aux perſonnes Phlegmatiques, Cacochymes & Pituiteuſes, dont les digeſtions ſe font mal par les glaires & une pituite abondante dans l'Eſtomac, à celles qui ſont attaquées de vertiges, de maux de tête, d'engourdiſſemens, de Rhumatiſmes vagues, d'enflures naiſſantes, de Coliques, & d'Aſthme humide; toutes maladies qui ſont cauſées ou entretenues par le vice des digeſtions: ce bouillon non-ſeulement détruit l'épaiſſiſſement du ſang, mais encore par ſa vertu laxative il ramene peu-à-peu par la voie des inteſtins les impuretés qui y ſont mêlées; & comme il fortifie l'eſtomac & rétablit ſes fonctions, il fait ceſſer la cauſe de toutes ces maladies. Auſſi en voyons-nous tous les jours de très-bons effets, lorſqu'en le prefcrivant on a attention au tempérament du Malade, & qu'on ne le donne qu'aux perſonnes pituiteuſes &

(a) *Voyez le Chapitre des Opiates.*

noyées de ſéroſités ? car quoique donné pour les mêmes fins, il convient moins que le précédent aux gens ſecs, bilieux & échauffés. Au reſte il faut éviter de prendre ici le change ; & l'on doit bien faire attention à ce que l'on entend par corps humides & pituiteux : car ceux qui ſont maigres & ſecs, ſont très-ſouvent remplis de ſéroſités ; & ne voyons-nous pas tous les jours que les perſonnes bilieuſes & mélancoliques, en qui les viſcéres ſont remplis d'une bille noire & réſineuſe, crachent beaucoup, & donnent d'autres marques d'une ſéroſité trop abondante ? Cependant il ne faut pas les mettre au nombre des tempéramens humides : bien au contraire, leurs fibres ſont roides, ſéches & brulantes ; & qui leur donneroit des Remédes hydragogues, ou des aperitifs qui ne ſeroient pas tempérés, leur feroit beaucoup de mal ; mais il faut regarder comme humides, les corps qui ſont remplis de ſucs mous, glaireux, & qui abondent en crudités. Ces perſonnes ont ordinairement la peau blanche & unie, & la diſpoſition extérieure du corps molle, flaſque, relâchée & tendante à la bouffiſſure : c'eſt de ces derniers que nous entendons toujours parler, lorſque nous propoſons des Remédes pour les tempéramens pituiteux ; & il faut en faire la différence avec ſoin pour ne pas s'y tromper.

Bouillon contre l'Hémophthyſie ou le Crachement de Sang.

Prenez la moitié d'un Moû de Veau ;
une cuillerée de Ris,
& de la racine de grande Conſoude ratiſſée,
une once ;
des feuilles d'Ortie griéche,
de Plantin,
de chacune une poignée.

Faites bouillir le tout dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à deux bouillons, pour prendre un le matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir.

Remarque. Voyez ci-deſſus (*a*) ce que nous avons dit à l'Article de la Tiſane contre l'Hémophthiſie, ou le Crachement de ſang. Ce Bouillon a les mêmes uſages, & ſe donne conjointement avec elle, & avec les autres Remédes qui y ſont preſcrits.

Bouillon contre les Maladies de la Peau, comme Puſtules, Galle, Dartres, Demangeaiſons, &c.

Prenez des racines
de Patience ſauvage,
& de grande Bardane,
lavées & coupées par tranches,
de chacune une once.

(*a*) *Page* 44.

Faites-les bouillir avec une demi-livre de Rouelle de Veau dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à deux bouillons.

Ajoutez la derniére demi-heure
du Cerfeuil,
& des ſommités de Houblon,
de chacune une poignée ;
de la Fumeterre,
du Creſſon de Fontaine,
de chacun une demi-poignée.

Paſſez enſuite le tout par un linge avec une legére expreſſion, & partagez-le en deux bouillons, à prendre un le matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir, faiſant fondre dans chacun un gros de Sel de Glauber.

Remarque. Ce Bouillon eſt un des plus aſſurés Remédes contre les maladies de la Peau ; il rend le ſang plus fluide, & il le purifie en détournant ſes impuretés par la voie des urines : il eſt encore très-utile dans les obſtructions des viſcéres, & ſurtout contre les engorgemens du Foie & de la Rate. Il ſera bon d'en faire précéder l'uſage par une ſaignée du bras, puis le prendre pendant quatre jours, & ſe purger le cinquiéme avec notre Opiate fondante, martiale & purgative, enſuite le continuer pendant huit autres jours, & finir par la même purgation (*a*).

(*a*) *Voyez le Chapitre des Opiates.*

§. II.

DES VINS ME'DICAMENTEUX.

Vin Enulé-Stomachique.

PRenez des racines récentes d'Aunée, ratiſſées & coupées par tranches, deux onces.

Mettez-les macérer à froid pendant quinze jours dans une pinte de bon Vin rouge, le vaiſſeau étant bien fermé.

La doſe eſt d'une ou deux cuillerées après le repas, en continuant pendant quelque-tems.

Remarque. L'uſage de ce Vin aide à la digeſtion, en raffermiſſant le ton de l'Eſtomac; mais il ſupoſe que ce viſcére a été nétoyé par des purgations ſuffiſantes, qu'il eſt ſeulement foible, & qu'il ne s'agit que de le fortifier. Son effet eſt d'en rectifier & d'en ranimer les levains, d'en diſſiper les vents, les gonflemens & les aigreurs. Que s'il ne produit pas cet avantage, il ne faudra pas y inſiſter longtems: car ce ſera une marque que le défaut de digeſtion ne vient pas de la pareſſe & du relâchement de l'Eſtomac, mais au contraire de ſa trop grande chaleur & de la tenſion convulſive de ſes membranes, auquel cas ce Vin feroit plus de mal que de bien. On voit donc combien il eſt de conſéquence de s'aſſurer de la nature des

indigeſtions que l'on a à traiter, puiſque ce qui convient aux unes nuit aux autres. Un moyen qui nous a paru des plus ſûrs pour cela, eſt de faire attention à l'état des urines du Malade. Si elles ſont claires, aqueuſes & ſans couleur, ou même blanches, un peu troubles, avec un ſédiment blanc, abondant, & qu'avec cela le Malade n'ait ni fiévre, ni ſoif, ni chaleur, ce ſera une marque que l'Eſtomac péche par relâchement, & par le défaut d'activité de ſes levains, ce qu'on apelle communément un Eſtomac froid & pareſſeux; & alors le Vin ci deſſus conviendra. Mais ſi au contraire les urines ſont troubles, rougeâtres, & qu'elles diminuent de quantité: qu'avec cela le Malade ſente des gonflemens d'Eſtomac accompagnés de chaleur & d'élévation dans le pouls, il ne faudra pas s'en ſervir, parce que tous les ſtomachiques âcres & aromatiques, tels que ce Vin, ne conviennent pas à cette eſpéce d'indigeſtion; & il faudra la traiter par nos Bouillons tempérans & apéritifs, entremêlés de quelques douces purgations, & par les Eaux minérales ferrugineuſes.

Vin d'Abſinthe.

Prenez des feuilles d'Abſinthe mondées & ſéchées à l'ombre, une poignée.

Verſez deſſus une pinte de bon vin blanc, les laiſſant macérer à froid pendant vingt-quatre heures dans un vaiſſeau bien fermé.

Paſſez enſuite le Vin, & gardez-le pour uſage.

La dose est d'un verre le matin à jeun pendant une quinzaine de jours.

Remarque. L'usage de ce Vin est propre, comme le précédent, pour rétablir les Estomacs en langueur & débilités ; il excite l'apetit, soit en resserrant & rendant plus fortes les fibres de l'Estomac qui sont relâchées, soit même en dissolvant la mucosité glaireuse qui est attachée à ses parois. Il léve les Obstructions des viscéres, qui dépendent ou du relâchement des fibres, ou de l'épaississement des humeurs. C'est ainsi qu'il est utile dans la Jauniſſe, dans l'Hydropysie, les Cachexies & les fiévres. Il fait mourir les vers, soit par sa grande amertume qui leur est contraire, soit en résolvant les humeurs mucilagineuses dans lesquelles leurs œufs sont placés, & où ils viennent à éclore. Mais il faut faire attention, & nous ne pouvons trop le répéter, qu'il y a des maladies dont les effets paroissent semblables, & qui dépendant de causes contraires, demandent des Remédes opposés. Ainsi le défaut de digestion, comme il a été remarqué dans l'Article précédent, peut venir de la trop grande tension & rigidité des fibres de l'Estomac, de sa trop grande chaleur, comme de son relâchement. Si l'on se sert de Vin d'Absinte dans le cas de chaleur & de tension, on augmente le mal au lieu de le diminuer ; & l'ardeur de l'Estomac devenue plus vive, fait impression sur les autres viscéres, dont les fibres se bandent peu-à-peu & se roidissent, ce qui produit insensiblement

la conſomption. Voilà ce qui fait que les grands mangeurs qui uſent tous les jours de Teintures ſtomachiques, & de Liqueurs ſpiritueuſes, pour réveiller leur apétit, ou pour faire la digeſtion des alimens dont ils ſe ſont farcis, dépériſſent peu-à-peu, & meurent avant le tems. On doit donc uſer de ce Vin comme de tous les Remédes amers, âcres & aromatiques, avec une grande précaution; & il ne convient qu'aux tempéramens relâchés & pituiteux, étant contraire à ceux qui ſont ſecs, bilieux, & dont les viſcéres ſont échauffés.

Vin Diurétique contre l'Hydropiſie.

Prenez un Oignon de Scille, dont vous ôterez la peau avec un couteau de bois, d'argent, ou d'yvoire, & non d'acier; enfermez-le enſuite dans de la pâte, & le laiſſez au four neuf ou dix heures; retirez-le du four, & en ôtez la croûte; mettez-le enſuite dans une cruche ou coquemar tenant trois pintes, dont l'entrée ſoit fort large: verſez deſſus deux pintes de bon vin blanc; fermez la cruche avec un tour de pâte; laiſſez infuſer pendant douze heures ſur la cendre chaude; retirez enſuite votre Oignon, que vous exprimerez fortement dans un linge par-deſſus le Vin, que vous conſerverez dans des bouteilles bien bouchées pour l'uſage. Il faut prendre de ce Vin quatre fois le jour; ſçavoir, deux cuillerées à bouche le matin à jeun, & trois heures après deux au-

tres cuillerées, trois heures après une seule cuillerée, & enfin une derniére cuillerée après le même intervalle, & entre chaque prise un bouillon. On peut manger le soir du potage, pourvû qu'il soit sec, c'est-à-dire, qu'il y ait peu de bouillon. Si par hazard on avoit mangé dans la journée, il faudroit mettre entre le repas & le Reméde une instance de trois heures.

Comme les Oignons de Scille sont de différentes grosseurs, on doit peser celui dont on veut se servir, & mettre une pinte de vin par livre de son poids.

Remarque. Ce Vin pousse puissamment les urines, ce qui le rend très-propre à guérir les différentes espéces d'Hydropisies; & comme il incise & atténue la pituite visqueuse qui engorge quelquefois le Poumon, il est également utile pour prévenir les attaques d'Asthme humide. Nous n'avons guéres vu de Remédes, dont les Malades fussent soulagés plus promptement que de celui-ci : car ordinairement après quelques prises l'enflure tombe, & l'oppression diminue considérablement. La dose que nous marquons, est pour une Hydropisie formée; ainsi lorsque la maladie n'est pas encore à ce dégré, on peut la diminuer, & ne prendre que trois ou quatre cuillerées par jour, au lieu de six qui sont marquées. Lorsqu'il sera nécessaire de purger le Malade, on se servira, soit du Vin apéritif & purgatif qui suit, soit de l'Opiate martiale, fondante & purgative contre les Obstruc-

tions, que l'on trouvera en ſon lieu (*a*).

Vin apéritif & purgatif contre l'Hydropiſie.

Prenez des racines
d'Iris du pays, ou Flambe,
d'Aunée, ratiſſées & coupées par tranches, de chacune une once;
de celles de Charbon-Roland,
d'Arrête-bœuf,
de chacune une demi-once;
du Séné mondé, ſix gros,
de la Poudre de Jalap, deux gros,
de la Canelle, un gros.

Verſez deſſus trois chopines de bon vin blanc, & faites macérer le tout à froid pendant huit jours dans un vaiſſeau fermé.

La doſe eſt de deux verres le matin à jeun, à une heure de diſtance l'un de l'autre, & un potage une heure après le ſecond verre.

Remarque. Ce Vin évacue abondamment les eaux par les ſelles, & fortie en même-tems le ton des viſcéres affoiblis dans l'Hydropiſie; ce qui le rend très-convenable dans cette maladie: on doit le continuer pendant du tems, ſuivant les forces du Malade & l'abondance des évacuations. C'eſt principalement avec les Pauvres qu'il en faut faire uſage, parce qu'ils donnent toujours la préférence aux Remédes préparés avec le vin.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Opiates.*

Vin apéritif & laxatif contre les Obſtructions.

Prenez du Séné mondé, une demi-livre,
des racines de Polipode de Chêne,
de Garence,
de chacune deux onces;
des feuilles de Scolopendre,
quatre poignées,
de petite Abſinthe, deux poignées;
de l'écorce ou pelure de Citron,
une once.

Enfermez le tout dans un ſachet de toile claire, que vous mettrez dans un baril qui puiſſe contenir dix ou douze peintes: rempliſſez ce baril au tems des Vendanges de Moût (*a*) de Vin blanc, que vous laiſſerez bouillir; bouchez-le enſuite, en laiſſant infuſer le vin pendant deux mois; tirez le vin après ce tems, & gardez-le au frais dans des bouteilles bien bouchées.

La doſe eſt d'un verre froid le matin à jeun, continuez pendant quelque-tems; & s'il purge trop, on n'en prendra que de deux jours l'un.

Remarque. On entend pas le mot d'Obſtruction, un embarras dans les vaiſſeaux de quelque viſcére cauſé par un épaiſſiſſement d'humeurs qui empêche les liqueurs d'y couler. Cette maladie attaque principalement les viſcéres du bas-ventre, comme

(*a*) *Le Moût de Vin eſt le ſuc exprimé des raiſins mûrs, tel qu'il ſort de deſſous le preſſoir.*

le Foie, le Pancreas, la Rate & le Méſentére. On connoît les Obſtructions aux laſſitudes ſpontanées, & à la diminution de forces qu'éprouvent les Malades. Ces perſonnes ont le viſage pâle & bouffi, ſur-tout en ſe levant, & quelquefois les pieds enflés le ſoir. Dans cet état l'apétit ſe perd : il s'engendre des crudités dans les premiéres voies ; & les digeſtions ſont très-imparfaites : le pouls eſt lent & foible, les urines ſont décolorées : on rend ſouvent des glaires mêlées avec les ſelles : enfin, on a de la difficulté à reſpirer, & l'on eſt ſujet aux palpitations de cœur. Il faut peu ſaigner dans les Obſtructions ; mais il faut beaucoup délayer & détremper le ſang : il faut de plus fondre les humeurs épaiſſies, & évacuer les impuretés du ſang par les ſelles & par les urines.

On peut donc commencer le traitement de cette maladie par une Saignée du bras, ſi le Malade n'eſt pas trop foible : on le purgera le lendemain avec une de nos Potions purgatives (*a*) convenable à ſes forces & à ſon tempérament. Il uſera enſuite de la Tiſane apéritive pour boiſſon ordinaire, ou bien d'un des deux Bouillons apéritifs d'écrits ci-deſſus : on le purgera au milieu & à la fin de ces Bouillons avec deux gros de l'Opiate martiale, fondante & purgative ; il reprendra enſuite, après

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 43. *des Bouillons*, pag 69. *des Potions purgatives, & des Opiates.*

quelque intervalle de repos, les mêmes Bouillons, ou la Tisane, se purgeant à la fin, soit avec l'Opiate martiale & purgative, soit avec le Vin purgatif ci-dessus, qui a une grande vertu pour évacuer les humeurs gluantes & visqueuses qui forment les Obstructions. Mais il faut éxaminer avant de le prescrire, si le Malade est d'un tempéramment sec, bilieux & échauffé, & s'il a la poitrine mauvaise : auquel cas il faudra insister sur l'usage du Bouillon tempérant & apéritif que nous indiquons, & ne donner ce Vin-ci que lorsque le Malade aura été bien humecté, parce que ces sortes de tempéramens sont par eux-mêmes ennemis des Purgatifs, & qu'il faut bien du ménagement pour qu'ils ne leurs causent aucune irritation. Ainsi lorsqu'on s'apercevra que ce Vin échauffe, on le suspendra pour passer aux Bouillons, & l'on y reviendra ensuite à l'alternative, continuant ainsi jusqu'à la guérison.

Si l'on est à portée d'avoir facilement des Eaux minérales naturelles, le Malade en fera usage à la fin du traitement ; ou à leur défaut, il se servira de notre Eau minérale artificielle.

Vin pour procurer les Régles.

Prenez des feuilles
de Romarin,
de Pouliot,
de chacune deux poignées ;
de celles de Sabine, une demi-poignée

du Saffran du Gâtinois,
du Borax,
de chacun deux gros ;
de la Limaille de fer crue,
une once.

Mettez le tout macérer à froid pendant huit jours dans ſix pintes de bon vin rouge.

Paſſez enſuite le Vin, que vous garderez pour l'uſage.

La doſe eſt d'un grand verre froid le matin à jeun pendant neuf jours, ce que l'on recommencera après quelque intervalle, s'il n'a pas fait ſon effet la premiére fois.

Remarque. Les Régles, ou Flux menſtruel, ſont un écoulement ſanguin, qui commence aux filles vers l'âge de quatorze ans, & finit pour l'ordinaire vers celui de quarante-cinq à cinquante, aux unes plutôt, aux autres plus tard. Cette évacuation eſt ſi néceſſaire à leur ſanté, qu'elles tombent dans de griéves maladies lorſqu'elle leur manque : il eſt donc néceſſaire de la leur procurer, ſi elle eſt en défaut, ou de la rétablir, lorſqu'elle eſt ſuprimée ; mais il y a des attentions à prendre pour cela relativement aux différens tempéramens des Sujets ; & à l'ordre que l'on doit obſerver dans l'adminiſtration des Remédes. Nous allons donner notre méthode, après avoir fait une énumération ſuccinte des principaux ſymptômes qni accompagnent les Pâles-couleurs.

Lorſqu'une fille qui a atteint l'âge de puberté, eſt affectée de la Jauniſſe, elle devient bouffie & indolente : ſon corps s'apeſantit ; ſa tête eſt douloureuſe, de même que le col, les aiſſelles & les lombes ; elle eſt opreſſée de la poitrine, incapable du plus leger exercice, & ſujette à des goûts dépravés. Ses urines dans cet état deviennent épaiſſes, troubles, rouges, & quelquefois noirâtres ; elle reſſent des friſſonnemens, & même un peu de fiévre, accompagnée de dégoûts & de fréquentes envies de vômir. Il faut alors que la Médecine vienne au ſecours de la Nature, pour procurer l'évacuation ſi néceſſaire à la ſanté. On commencera donc le traitement par ſaigner la Malade du bras, ſi elle n'eſt pas trop foible ; & on la purgera le ſurlendemain avec une de nos Potions purgatives *(a)* convenable à ſes forces & à ſon tempérament. On la mettra enſuite pendant quinze jours ou trois ſemaines à l'uſage du Vin d'Abſinthe, dont elle prendra un verre le matin à jeun, le coupant avec un peu d'eau, ſi elle trouve qu'il l'échauffe ; ou bien elle peut, au lieu de Vin d'Abſinthe, prendre pendant le même-tems le matin à jeun deux taſſes d'une legére infuſion de Saffran dans de l'eau bouillante en guiſe de Thé, c'eſt-à-dire, huit ou dix grains de fleurs de Saffran dans deux taſſes d'eau bouillante, y ajoutant un peu de ſucre. Ces

(a) Voyez les Chapitres des Vins médicamenteux, pag 75. *& des Potions purgatives.*

Remédes, quoique legers, ſuffiſent ſouvent dans les jeunes perſonnes, lorſque la Nature eſt aſſez bien diſpoſée, & qu'il ne faut qu'un leger aiguillon pour la déterminer à agir ; mais s'ils ne réuſſiſſent pas, on paſſera à l'uſage des Tablettes martiales apéritives contre les Pâles-couleurs (*a*), ou à notre ſeconde Eau minérale artificielle. Il eſt rare que ces derniers Remédes ne produiſent pas l'effet deſiré ; que ſi cependant ils ſont encore inſuffiſans, après quelque intervale de repos, on ſaignera la Malade du pied ; & après l'avoir rafraîchie, on la mettra à l'uſage du Vin ci-deſſus, qu'elle continuera pendant du tems, à moins qu'il ne l'échauffe trop ; auquel cas on l'interromproit pour revenir à nos Bouillons rafraîchiſſans, & enſuite à ce Vin à l'alternative, continuant ainſi juſqu'à parfaite guériſon.

Vin contre la Colique Néphrétique, la Gravelle & les Glaires de la Veſſie.

Prenez un baril de telle grandeur qu'il vous plaira.

Mettez-y autant de Bayes de Geniévre bien mûres, que ſi vous vouliez faire un Rapé.

Achevez de le remplir de bon vin blanc, & laiſſez infuſer le tout juſqu'à ce que le vin ſoit clair.

(*a*) *Voyez les Chapitres des Bouillons*, pag. 67. & 69. *& des Tablettes.*

On en prend alors un ou deux verres le matin à jeun, à une demi-heure l'un de l'autre, ou bien en déjeûnant.

Au défaut de ce Vin ainſi préparé, on peut prendre une bonne pincée de graine de Geniévre que l'on concaſſera, & que l'on fera infuſer pendant la nuit dans un verre de vin blanc; on coulera l'infuſion le lendemain pour une doſe, à prendre le matin à jeun.

Remarque. Ce Vin excite l'urine, & fait ſortir les graviers & les glaires qui ſont quelquefois collés à l'intérieur des Reins & de la Veſſie; ce qui le rend très-utile contre la Colique Néphrétique. Cependant il n'en faut point faire uſage, qu'on n'ait bien obſervé auparavant le tempérament du Malade, & la conſtitution des Viſcéres, & qu'on ne ſçache qu'ils ſont exempts de toute chaleur, & d'inflammation: car dans ce dernier cas, il augmente la douleur de Reins, l'ardeur d'urine, & peut jetter dans la Cachexie, & dans l'Hydropiſie; mais il convient parfaitement aux temperamens pituiteux, & il eſt aiſé, lorſque la choſe eſt incertaine, d'en faire l'eſſai, & de s'en abſtenir, s'il incommode: on doit même par précaution le couper les premiers jours avec moitié d'eau, & en examiner l'effet.

On ſe ſert encore avantageuſement de ce Vin, quand l'Eſtomac eſt froid & pareſſeux: car il digére la pituite qui s'y épaiſſit, diſſipe les vents qui en naiſſent,

apaiſe les Coliques, & aide à la digeſtion ; mais nous le répétons encore, il ne convient que dans les maladies cauſées par la pituite & par les glaires, & lorſque l'on découvre de l'atonie & de la foibleſſe dans les fibres : ſans quoi il augmente le bouillonnement du ſang, & cauſe une ardeur dans les parties ſolides, qui peut y attirer l'inflammation.

Vin contre les Hernies des Enfans.

Prenez des Racines de Sceau de Salomon, lavées & coupées par morceaux, ſix gros.

Faites-les infuſer pendant vingt-quatre heures dans un demi-ſeptier de vin blanc.

Coulez enſuite l'infuſion, pour faire prendre en deux ou trois petits verres dans le courant de la journée, en continuant pendant trois ſemaines ou un mois.

Il faut de plus piler les Racines qui ont ſervi à l'infuſion, & les apliquer chaque jour en Cataplaſme ſur la Hernie réduite, ſoutenant le tout de quelques tours de bande.

Remarque. Ce Reméde eſt un des plus ſimples, & en même-tems des plus certains que l'on ait trouvé juſqu'ici contre les Hernies des Enfans : les Adultes s'en ſervent auſſi quelquefois avec ſuccès ; mais il faut en ce cas le continuer au moins deux mois, pour qu'il produiſe un effet durable, & augmenter la doſe de la Ra-

cine juſqu'à une once. Si l'Enfant à qui on le donne n'eſt point dans l'uſage du vin, on pourra couper l'infuſion avec moitié d'eau.

Il y a encore deux plantes qu'on peut ſubſtituer au Sceau de Salomon, & qui ont la même vertu ; ſçavoir, la Turquette & la Croiſette : ces deux plantes ſe prennent en décoction, à la quantité d'une petite poignée ſur une peinte d'eau, que l'on réduit à moitié, & à laquelle on ajoute un peu de ſucre ; on aplique de même la plante pilée en Cataplaſme, en continuant pendant du tems.

Nous avions vû auſſi, que dans quelques endroits on ſe ſervoit pour cette incommodité de la graine de Thalitron : on en met plein un dé à coudre dans la bouillie des Enfans, ce qui réuſſit fort bien ; mais il faut continuer ce Reméde pendant du tems.

Vin Anti-ſcorbutique, ou *contre le Scorbut.*

Prenez des Racines de Raifort ſauvage, douze onces ;
de Bardane, cinq onces ;
des feuilles de Creſſon de fontaine,
de *Cochlearia*,
de *Becabunga*,
de Fumeterre,
de chacune deux bonnes poignées.

Le tout étant nétoyé, lavé, coupé & égouté, mettez-le dans une cucurbite de cuivre étamé.

Ajoutez-y

du Sel Ammoniac en poudre, trois onces ;
de la graine de Moutarde broyée auparavant dans un mortier de marbre, six onces.

Verſez ſur le tout douze pintes de bon Vin rouge ordinaire. Couvrez bien la cucurbite avec du linge & un parchemin mouillé : placez-la au bain-marie, ou à un bain de cendres très-doux ; & laiſſez infuſer pendant douze heures, ayant ſoin de remuer le vaiſſeau de tems en tems. Laiſſez-le enſuite refroidir ſans le déboucher, & paſſez le tout à froid avec une legére expreſſion : conſervez le Vin à la cave pour l'uſage dans des bouteilles bien bouchées. Il peut ſe conſerver au moins trois mois.

La doſe eſt d'un petit verre, ou de trois onces, deux fois le jour, & même trois fois ; le matin à jeun, une heure avant que de quitter le lit ; cinq ou ſix heures après le dîner ; le ſoir en ſe couchant. On prend ordinairement ce Reméde ſix ſemaines de ſuite ; & pendant ſon uſage, on ne manquera pas de ſe purger tous les quinze jours avec notre Opiate martiale, fondante & purgative décrite ci-deſſous.

Remarque. Ce Vin, dont on a éprouvé la bonté une infinité de fois, ſe donne dans les mêmes cas où nous avons conſeillé ci-deſſus l'uſage de l'Apozême Antiſcorbutique. Il faut conſulter cet endroit, & en lire la Remarque avec attention.

Mais comme ce Vin eſt plus actif que l'Apozême, on ne doit y avoir recours qu'après avoir fait précéder celui-ci, & même revenir à l'Apozême, ſi l'on s'aperçoit qu'il échauffe trop : on guérit ſouvent plus vîte en allant plus lentement, & l'adminiſtration prudente des Remédes accélére toujours la guériſon réelle. En effet combien de maux ne voit-on pas arriver d'une Purgation précipitée, ou de Remédes actifs donnés ſans préparation ? Hâte-toi lentement, dit un Sage ; maxime importante, qu'un Médecin inſtruit des voies de la Nature ne perd jamais de vûe.

CHAPITRE IV.

LAVEMENS & SUPOSITOIRES.

I. DES LAVEMENS.

Lavement commun, ou *émollient*.

PRenez du Son lavé,
des feuilles de Mauve,
de chacun une poignée.

Faites bouillir le tout dans une ſuffiſante quantité d'eau, à la réduction d'une chopine.

Ajoutez à la colature
de l'Huile d'Olive, deux cuillerées ;
ou du Miel violat, deux onces.
Pour un Lavement.

Lavement émollient & rafraîchiſſant.

Prenez de la Décoction émolliente ci-deſſus, une chopine.
Ajoutez-y
du Criſtal Minéral, un gros.
Pour un Lavement.

Remarque. Les deux Lavemens ci-deſſus peuvent ſervir dans toutes les maladies aigues, où l'on met en uſage ces Remédes : car s'il ne s'agit que de rafraîchir, & de tempérer le bas-ventre, l'Eau commune ſeule peut ſuffire.

Il faut obſerver que pour retenir facilement un Lavement, il faut ſe tenir couché ſur le côté droit tandis qu'on l'a dans le ventre, & ſe remettre ſur le côté gauche quand on ſe diſpoſe à le rendre.

Lavement laxatif.

Prenez de la Décoction émolliente, une chopine.
Diſſolvez-y du Lénitif, une once ;
ou du Miel Mercurial, deux onces.
Pour un Lavement.

Remarque Ce Lavement eſt très-propre à évacuer doucement les humeurs bilieuſes, & les matiéres durcies qui farciſſent ſouvent les inteſtins ; il les amollit, & les rend plus coulantes : ainſi l'on fera bien d'en donner un de cette eſpéce

au commencement des maladies aigues, & de paſſer enſuite aux Lavemens communs & rafraichiſſans : car tant qu'il y a de la chaleur & de l'éréthiſme, ces derniers nous ont toujours paru mieux faire que les autres.

Lavement dans les grandes Conſtipations.

Prenez de l'Huile d'Olive, un verre.
Pour un Lavement.

Lavement purgatif commun.

Prenez du Séné, deux gros.
Faites-les bouillir dans trois ſeptiers d'eau, que vous réduirez à une chopine.
Coulez la liqueur, & diſſolvez-y du Lénitif, une once.
Pour un Lavement.

Remarque. Ce Lavement évacue plus puiſſamment les humeurs corrompues des premiéres voies, que ceux qui ſont ſimplement émolliens ou laxatifs ; ainſi on doit le préférer dans le cas où le Malade étant abſolument ſans fiévre, ou ſoupçonne un amas de matiéres bilieuſes & putrides dans les inteſtins.

Lavement purgatif majeur contre l'Apoplexie & autres Affections ſoporeuſes.

Prenez du Séné, trois gros.
Faites-les bouillir dans trois ſeptiers d'eau, que vous réduirez à un peu moins d'une chopine.

Coulez la liqueur, & ajoutez-y
de l'Electuaire *Diaphœnic*,
une once ;
du Vin émétique trouble,
trois onces ;
Pour un Lavement.

Remarque. Dans la plûpart des Apoplexies, Léthargies, & autres affections soporeuses, il est toujours bon de débuter par ce Lavement, parce que ces maladies étant presque toujours compliquées avec d'anciennes indigestions, ou un amas actuel de matiéres corrompues dans l'estomac & les intestins, il arriveroit que si l'on commençoit par la Saignée, le vuide des vaisseaux se rempliroit par ces humeurs putrides & glaireuses, qui rendroient ensuite la maladie insurmontable, en engorgeant le cerveau de plus en plus ; ainsi il est nécessaire de nétoyer d'abord les premiéres voies, avant que de songer à tout autre Reméde intérieur : on doit même, si l'Apoplexie est séreuse, passer de suite à l'Emétique, sans en venir à la Saignée, qui ne peut faire que du mal, en augmentant le relâchement des parties.

Il est vrai que quelquefois l'Apoplexie est sanguine, & qu'il faut commencer par la Saignée ; mais cette Apoplexie est rare dans les personnes âgées, qui sont sur-tout exposées à ces attaques ; & l'on en trouvera plus haut la différence d'avec la séreuse, dans notre Remarque sur l'Apoplexie, pag. 51.

Lavement fébrifuge.

Prenez de bon Quinquina pulvériſé,
ſix gros, ou une once.
Faites-le infuſer pendant trois heures dans une chopine d'eau bouillante.
Paſſez enſuite le tout par un linge, & en rempliſſez une Seringue, laiſſant de la place pour y ajouter,
du Syrop Diacode, une demi-once.
Pour un Lavement.

Remarque. Dans la cure des Fiévres intermittentes par le Quinquina, il eſt à propos de ſçavoir, que s'il eſt impoſſible de le faire prendre par la bouche, de quelque maniere qu'il ſoit préparé, on peut avoir recours au Lavement ci-deſſus. Le Quinquina pris de cette façon ne cauſe aucune irritation, même dans la groſſeſſe. Il doit être donné ſur la fin de l'accès : on le réitérera une ou deux fois dans l'intermiſſion, ſi elle eſt grande ; & le malade en continuera ainſi l'uſage juſqu'à ce qu'il ſoit abſolument ſans fiévre, obſervant de le garder le plus long-tems qu'il pourra.

Pour les Enfans à la mamelle & juſqu'à l'âge de quatre ans, la doſe de Quinquina ne ſera que d'un gros ; depuis l'âge de quatre ans juſqu'à dix, elle ſera de deux gros ; depuis dix juſqu'à vingt, de trois gros ; & depuis vingt juſqu'à ſoixante, de demi once juſqu'à ſix gros, ou une once, même pour les femmes groſſes. De tous les accidens qui peuvent accompagner la

fiévre, il n'y a que les hémorroïdes & les tenſions douloureuſes du bas-ventre, qui puiſſent exclure l'uſage de ce Lavement.

Lavement anodyn, ou *adouciſſant.*

Prenez des feuilles de Bouillon blanc, une poignée ;
de la graine de Lin, deux pincées.

Verſez deſſus une chopine d'eau bouillante, & laiſſez repoſer le tout juſqu'à ce que l'infuſion ſoit tiéde.

Paſſez enſuite, & ajoutez un jaune d'œuf bien délayé dans un peu d'eau chaude.

Pour un Lavement, à donner en deux fois.

Ou bien

Prenez du Bouillon de Tripes, une chopine.

Pour un Lavement, à donner en deux fois.

Remarque. Ces deux Lavemens conviennent dans les Coliques douloureuſes du bas-ventre, dans l'inflammation des inteſtins, le Teneſme & la Dyſſenterie ; ſi même les tranchées ſont extrêmement vives ; on fera bien de faire bouillir une tête de Pavot blanc, concaſſée dans un peu d'eau, & d'y en ajouter la colature. On obſervera encore que les Lavemens qu'on donne dans ces maladies, ne doivent jamais être que la moitié d'un Lavement ordinaire : ainſi ils ne doivent remplir que la moitié de la Seringue ; s'ils étoient entiers, le

le Malade ne pourroit les garder, & il eſt eſſentiel que le Lavement reſte au moins un demi-quart-d'heure, & plus long-tems, s'il eſt poſſible : la même raiſon engage à avoir attention qu'ils ſoient ſimplement tiedes, & plus froids que chauds.

Quand les Malades ſouffrent trop de douleur par l'introduction du canon de la Seringue, on peut le paſſer dans un petit morceau de boyau de poulet, ou le couvrir d'une couche de beurre de l'épaiſſeur de quelques lignes, ce qui le rend plus gliſſant, & plus doux au paſſage : on doit encore, lorſqu'ils ne peuvent retenir les Lavemens, entourer le canon d'étoupe ; en retirant le canon, on pouſſe l'étoupe vers le Fondement avec la main, & on tient ainſi le Fondement fermé le plus long-tems qu'il eſt poſſible.

Lavement carminatif contre la Colique venteuſe.

Prenez des ſommités de Camomille, de Méliot, de chacune une poignée ; de l'Anis, une pincée.

Faites bouillir le tout dans trois ſeptiers de Bouillon de Tripes, que vous réduirez à une chopine.

Coulez pour un Lavement.

Remarque. Ce Lavement eſt propre pour diſcuter, & faire ſortir les vents, qui en diſtendant les inteſtins, cauſent la mala-

die ; il faut seulement faire attention de ne le pas donner tout à la fois, si la Colique est violente, de crainte que le volume de la liqueur, en augmentant le gonflement, n'augmente en même-tems la tension douloureuse du bas-ventre.

Lavement contre la Colique Néphrétique.

Prenez du Bouillon de Tripes, une chopine.
Ajoutez-y de la Térébenthine dissoute exactement dans un jaune d'œuf, une once ;
du Cristal Minéral, un gros.
Pour un Lavement.

Remarque. Ce Lavement est propre pour ouvrir les conduits de l'urine, & guérir les Coliques Néphrétiques & Venteuses ; & comme il est laxatif, il détourne par la voie des intestins une partie des humeurs grossieres, que les autres Diurétiques feroient passer par les Reins. Il est encore propre dans les anciennes dyssenteries & les ulcérations des intestins ; mais il faut faire attention de ne le donner qu'après avoir fait précéder la Saignée & les Boissons adoucissantes, telles que notre Tisane adoucissante, décrite ci-dessus (*a*) : de plus, il faut que la Térébenthine soit exactement divisée par le jaune d'œuf ; autrement, il pourroit arriver que ses parties résineuses s'attachant aux intestins, y attireroient l'inflammation.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Tisanes*, pag. 40.

Lavement contre les Coliques violentes & opiniâtres.

Prenez de bon Vin rouge,
de l'Huile de Noix,
de chacun ſix onces.

Faites chauffer le vin, & ajoutez enſuite l'huile, pour un Lavement, que l'on peut répéter ſuivant le beſoin.

Remarque. Il ſe preſente quelquefois dans la Pratique des Coliques opiniâtres, dont les indications ſont ſi compliquées, qu'elles en rendent la guériſon extrêmement difficile. Ces Coliques ſont ordinairement le produit de pluſieurs vices, qui affectent en même-tems le canal inteſtinal ; ce ſont le plus ſouvent des vents engendrés par des crudités viſqueuſes, ou des matiéres âcres & putrides, qui ſe joignent au Spaſme, ou au relâchement des inteſtins. Si vous employez les Lavemens anodyns, ils n'attaqueront que les matiéres âcres & le Spaſme, & augmenteront le relâchement & les vents, ce qui fait ſubſiſter la maladie : ſi au contraire vous faites uſage des Lavemens carminatifs, comme ces Remedes ſont chauds, ils favoriſeront le Spaſme, & augmenteront la douleur ; & c'eſt ce qui rend les Carminatifs équivoques, & ſi ſouvent infideles dans les maladies venteuſes. On eſt donc fort embarraſſé à trouver des médicamens, qui puiſſent concilier les différentes indications, & ſou-

lager efficacement le Malade. Entre ceux que nous avons éprouvés dans ces cas épineux, le Lavement ci-dessus nous a paru un des plus utiles : comme il est en partie anodin, & en partie tonique, il satisfait en même-tems à toutes les indications. Aussi nous a-t'il presque toujours réussi dans des Coliques qui avoient résisté aux Remedes ordinaires ; & nous conseillons d'y avoir recours, lorsque les Lavemens anodins ou carminatifs auront été sans effet.

§. II. DES SUPOSITOIRES *.

Supositoire simple, ou *commun.*

PRenez un morceau de côte de Bette, ou Poirée.

Taillez-le en supositoire, que vous froterez d'Huile ou de Miel, avant que de l'introduire. *Ou bien*,

Prenez du Savon blanc taillé en Supositoire, une once ; ou à la place de Savon, une once de Miel cuit en consistance solide.

Ajoutez-y du Sel commun,
un demi-gros.

Pour un Supositoire.

(*) *Le* Supositoire *est un Remede de consistance solide, de forme ronde & un peu longue, que l'on introduit dans le Fondement.*

Supositoire composé & purgatif.

Prenez de la Poudre de Jalap, un scrupule ;
du Sel commun, douze grains.
Mêlez le tout avec un peu de Miel, que vous ferez cuire en consistance requise.

Notez qu'on peut rendre ces Supositoires plus ou moins actifs, en y ajoutant d'autres Purgatifs, ou bien en augmentant la dose des Poudres purgatives.

Remarque. Quand on donne des Lavemens aux Enfans à la mammelle, on ne doit se servir que de lait ou d'eau d'orge, avec demi-once de miel rosat par Lavement ; & lorsqu'ils sont plus âgés, on peut leur donner des Lavemens émolliens avec des feuilles de Mauve & la Casse. Mais comme souvent ils sont constipés, pendant du tems, il seroit ennuyeux & difficile de leur donner si souvent des Lavemens ; de sorte que pour les relacher, on doit avoir recours de tems en tems à un des petits Supositoires décrits ci-dessus, dont l'effet est d'irriter legerement le sphincter de l'Anus, & par-là d'obliger l'intestin à se débarrasser des excrémens qui le chargent.

Supositoire contre les Ascarides ou petits Vers blancs, qui sont souvent logés dans le Fondement des Enfans.

Prenez du Lard, macéré dans l'eau

froide pour diminuer ſa ſalure.

Taillez-le en Supoſitoire, & introduiſez-le dans le Fondement.

CHAPITRE V.

POTIONS ALTÉRANTES, ou *CORRECTIVES*. *.

Potion cordiale.

PRenez des Eaux diſtillées
de Méliſſe ſimple,
& de Chardon-benit,
de chacune deux onces;
des Confections d'Hyacinthe &
d'Akermes,
de chacune un demi-gros;
ou de la Confection d'Hyacinthe,
un gros;
de l'Eau de Fleurs d'Orange,
deux gros;
du Syrop d'Oeillet,
de Limon,
de chacun une demi-once.

* *La* Potion *n'eſt autre choſe qu'un Medicament liquide fait avec les eaux diſtillées, auſquelles on ajoute des Poudres, des Confections, des Sucs, des Huiles, des Sels & des Syrops qui la rendent trouble. Elle eſt altérante ou corrective, quand on ne la donne que pour changer, altérer ou corriger les mauvaiſes qualités des humeurs; & elle eſt purgative, lorſqu'on y diſſout divers Purgatifs.*

Mêlez le tout, pour donner d'heure en heure à la cuillier.

Notez qu'on peut y ajouter vingt gouttes de *Lilium* de Paracelse, si la foiblesse est grande.

Remarque. Cette Potion convient dans les grandes foiblesses, qui arrivent, tant dans les maladies aigues, que dans les maladies chroniques, aussi-bien que dans la Syncope, dans un Accouchement long & laborieux, dans les Fiévres malignes, dans la Rougeole & la petite Vérole, lorsqu'elles ne lévent pas bien, ou que l'éruption par la foiblesse du cœur ne se soutient pas; enfin dans les langueurs & dans toutes sortes de défaillances. Il faut seulement faire attention d'en user plus modérément dans les maladies aigues, parce que comme cette Potion échauffe, en remédiant à l'accident, on augmenteroit la maladie, qui ne veut rien d'échauffant.

Potion contre l'Hémophthysie, ou *le Crachement de Sang.*

Prenez du Suc dépuré d'Ortie, trois onces;
du Syrop de grande Coulsoude, une demi-once.

Mêlez le tout, pour une potion à répéter trois fois le jour.

Remarque. Cette Potion se donne avec la Tisane & le Bouillon décrits ci-dessus

(*a*) contre le Crachement de Sang ; elle fait partie du traitement de cette maladie, & ces trois Remédes ſuffiſent le plus ſouvent : que ſi le Crachement de Sang ne ceſſe point, & s'il eſt accompagné d'une toux violente, on y ajoutera le Lohoch & le Bol décrit ci-deſſous (*b*) contre l'Hémophthyſie ; on peut conſulter ces Articles.

Potion contre la Pleuréſie.

Prenez de l'Ortie-griéche la plus fraîche, deux ou trois poignées.

Pilez-la legérement, & la faites bouillir avec deux onces de bonne Huile d'Olive & un verre de Vin, à la réduction d'un bon gobelet.

Paſſez le tout avec expreſſion, & faites-en prendre le jus au Malade, que vous tiendrez bien couvert pour ménager la ſueur, ayant ſoin d'apliquer le marc en cataplaſme ſur le côté douloureux, le plus chaudement qu'il ſera poſſible.

Remarque. La Pleuréſie emporte un grand nombre de ceux qu'elle attaque, quelque méthode que l'on employe pour la traiter : on a beau ſaigner promptement & copieuſement, & émétiſer dès les premiers jours, lorſqu'il y a indication, ce

(*a*) *Voyez le Chapitre des Tiſanes*, pag. 44. *& des Bouillons*, pag. 73.

(*b*) *Voyez les Chapitres des Lohochs & des Bols.*

qui eſt la méthode la plus commune, le Malade n'en périt pas moins. Si l'on ſe tourne du côté des Sudorifiques, outre que cette voie paroît contredire l'indication de l'inflammation qui accompagne la maladie, c'eſt qu'il ne paroît pas qu'elle ſoit ſuivie des meilleurs ſuccès : on eſt donc bien embarraſſé ; & il ſeroit à ſouhaiter que l'on eût quelque puiſſant réſolutif apliqué extérieurement, pour atténuer & diſſoudre le ſang coënneux engagé dans la Pleuréſie, & l'obliger à reprendre les routes de la circulation : ce ſeroit la méthode la plus ſûre & la moins coûteuſe à la Nature ; mais où eſt-il ce Topique ſi deſiré ? Nous en avons eſſayé beaucoup, qui ont tous été ſouvent infideles ; cependant entre le grand nombre de Remedes que nous avons éprouvés, il nous a paru que la Potion ci-deſſus, accompagnée de ſon Cataplaſme, étoit un des meilleurs que l'on pût employer. Le tems favorable pour en faire uſage eſt après deux ſaignées, & entre le ſecond & le troiſieme jour. Il y a encore à l'Article des Cataplaſmes deux Remedes de cette eſpece, qui nous ont aſſez ſouvent réuſſi.

On doit accompagner cette Potion de l'Apozême contre la Pleuréſie, décrit ci-deſſus (*a*), & des autres Remedes qui ſont indiqués dans la Remarque.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Apozêmes*, pag. 3.

Potion huileuſe contre la Néphrétique.

Prenez de l'Eau de Pariétaire,
quatre onces;
de l'Huile d'Amandes douces tirée
ſans feu, deux onces;
du Syrop de Guimauve,
de Capillaire,
de chacun une once.

Ajoutez-y le Suc exprimé d'un Citron.

Mêlez le tout enſemble, & partagez-le en deux doſes, à prendre à deux heures de diſtance l'une de l'autre.

Remarque. Cette Potion ſe donne dans l'accès des douleurs de la Colique Néphrétique, & ſe répéte de tems en tems, juſqu'à ce qu'elles ſoient paſſées: on doit l'accompagner des Saignées néceſſaires, du demi-Bain, & des Tiſanes & Lavemens adouciſſans, décrits ci-deſſus contre cette maladie (*a*). Il y auroit en effet de l'imprudence, quoique cela arrive quelquefois, d'employer dans ces premiers tems les Remedes apelés Diurétiques chauds, qui augmentant le mouvement des liqueurs vers les Reins, entrainent ſouvent avec les urines une ſi grande quantité de graviers, qu'ils déchirent les conduits par où ils paſſent, & cauſent des douleurs atroces, & des piſſemens de ſang. Ainſi l'on ne doit venir à l'uſage de ces Re-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 44. *& des Lavemens*, pag. 98.

medes, que lorſque l'accès eſt tout-à-fait paſſé. Encore en faut-il uſer modérément, & examiner leur effet, pour les quitter ſi l'on n'en reçoit pas de ſoulagement.

Potion contre le Vomiſſement.

Prenez de l'Eau de Menthe, deux onces;
du Syrop de Limon, une once;
du Sel d'Abſinthe, un ſcrupule.
Mêlez le tout, pour une doſe que l'on peut répéter deux ou trois fois le jour, ſuivant le beſoin.

Remarque. Lorſqu'on rejette par le vomiſſement une abondance de matiéres corrompues, il faut bien ſe garder de l'arrêter, à moins qu'il ne dure trop long-tems. On doit l'aider au contraire, en buvant largement d'une Eau de Veau, ou de Poulet, ou d'une forte infuſion de Thé, ou de Chardon-benit; après quoi l'on purge, pour fortifier enſuite l'Eſtomac. Mais s'il dure trop long-tems, ou que les efforts ne ſoient ſuivis d'aucune ou de peu de matiere, alors il faut l'arrêter par cette Potion. Que ſi on ne l'a pas ſous la main, on ſe contentera d'exprimer un peu de jus de Citron dans chaque Bouillon, & de mettre un peu d'écorce de Citron dans la Tiſane.

Potion Diaphorétique-anodine.

Prenez des Eaux distillées
de Fleurs de Sureau,
de Chardon-benit,
de chacune deux onces ;
de la Confection d'Hyacinthe,
de la Thériaque,
de chacune un demi-gros ;
de l'Antimoine Diaphorétique,
un scrupule ;
du Syrop de Pavot rouge,
Diacode,
de chacune une demi-once.

Mêlez le tout, pour prendre à la cuillerée d'heure en heure.

Remarque. Cette Potion convient dans toutes les maladies aiguës ou les sueurs se déclarent, & où l'on voudroit les pousser doucement pour l'avantage du Malade. Elle peut se prendre à toute heure du jour & de la nuit, lorsque le besoin l'exige. Aussi-tôt que le Malade en aura commencé l'usage, on le couvrira soigneusement, sans cependant l'accabler. Il se tiendra tranquille, & on lui donnera de tems en tems du bouillon, ou de la gelée pour le soutenir ; on entretiendra doucement la sueur par cette Potion entremêlée de gobelets de Tisane bien chaude, jusqu'à ce qu'elle commence à devenir gluante & froide. Pour lors on changera le Malade de linge, on l'essuyera, & on lui fera prendre un bouillon.

Potion Anodine-astringente.

Prenez des Eaux distillées
de Plantain,
de Renouée,
de chacune deux onces;
du Bol d'Arménie,
de la Terre sigillée,
de la Thériaque,
du *Diascordium*,
de chacune un demi gros:
du Syrop de Coing, une once.

Mêlez le tout, pour une Potion à prendre par cuillerées d'heure en heure.

Remarque. Cette Potion est merveilleuse dans tous les dévoiemens qui durent après avoir purgé suffisamment, & qui ne viennent plus que du relâchement des fibres des Intestins. On s'en sert encore dans les Superpurgations, c'est-à-dire, lorsque l'on a donné une médecine trop forte, & que les évacuations continuent les jours suivants. Quelques cuillerées de cette Potion les arrêtent.

Potion vulnéraire contre les Chûtes & les Contusions.

Prenez de l'eau distillée de pavot rouge,
quatre onces,
du Vinaigre de Vin, six gros,
des Yeux d'Ecrevisses préparés,
deux scrupules,
du Syrop de Roses séches,
une once.

Mêlez le tout, pour deux doſes à prendre, une le matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir.

Ou bien,

Prenez des Tiges vertes coupées de l'eſpéce de Morelle apellée *Douce-amére*, quatre onces,
de la Cochenille, un ſcrupule,
du Vin blanc, deux livres.

Infuſez le tout pendant la nuit ſur les cendres chaudes, & ajoutez à la colature du Syrop de Lierre terreſtre, quatre onces;
de la Thériaque, une demi-once.

La doſe eſt de quatre onces tiédes trois fois le jour.

Remarque. Quand on a fait quelque chûte conſidérable, ou qu'on a reçu des coups violens, il ne faut jamais manquer de ſe faire ſaigner, pour éviter les ſuites de la commotion, & pour faire rentrer dans les vaiſſeaux le ſang qui peut être extravaſé; il faut auſſi boire d'abord un ou deux verres d'eau bien fraîche: on ſe mettra enſuite à l'uſage de notre Tiſane vulnéraire (*a*): on y joindra une des deux Potions ci-deſſus éprouvées en pareil cas; & s'il y a des contuſions extérieures, ou qu'on reſſente des douleurs internes dans quelque partie, on ſe ſervira du Liniment ou de la Fomentation (*b*) que nous propoſons ci-deſſous contre ces accidens.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Tiſanes*, pag. 34.
(*b*) *Voyez le Chapitre des Linimens & des Fomentations.*

Potion Anti-hyſtérique, ou contre les Vapeurs.

Prenez des Eaux d'Armoiſe,
de Mélice ſimple,
de chacune deux onces;
de la poudre de *Caſtoreum*,
douze grains;
du *Laudanum* liquide de Sydenham,
vingt gouttes;
du Syrop d'Armoiſe,
ou de Fleurs d'Orange,
une demi-once.
Mêlez le tout, pour prendre à la cuillier.

Remarque. Il eſt impoſſible de renfermer dans les bornes étroites que nous nous ſommes preſcrites, la deſcription de la Paſſion Hyſtérique, apelée autrement *Vapeurs* Nous nous arrêterons aux principaux ſymptômes, qui varient encore beaucoup ſuivant les différens tempéramens, ou les différentes maniéres de vivre des perſonnes qui en ſont attaquées. Les premiers ſymptômes ſont des naufées, qui ſont rarement ſuivies de vomiſſement, avec des mouvemens de vents & des météoriſmes dans le ventre. La Malade ſent comme une boule qui y roule, & qui à la fin ſemble ſe fixer en quelque endroit. La reſpiration devient difficile, fréquente & courte; elle s'affoiblit de plus en plus: il ſemble que la poitrine ſoit opreſſée, & la Malade preſque ſuffoquée par un étranglement qui la ſaiſit tout-à-coup, & qui

dérange plusieurs fonctions différentes ; il survient même une legére défaillance, qui ne charge pas beauconp le pouls. Si l'accès augmente, la Malade tombe souvent dans un profond assoupissement, durant lequel elle pâlit, perd la parole, le sentiment & le mouvement ; on la croiroit tombée du Haut-mal, ou surprise d'Apoplexie : sa respiration est très-foible, rare, & si obscure, qu'on croit aisément qu'il ne s'en fait plus ; le pouls s'affoiblit de même, & semble éteint : si-tôt que le Paroxysme cesse, on entend murmurer les intestins, les yeux s'ouvrent, & les joues reprennent une couleur plus vive ; le sentiment, le mouvement & la presence d'esprit reviennent : la Malade recouvre alors son premier état, & se souvient parfaitement de tous les accidens de sa maladie, qui différe de l'Epilepsie, en ce que dans celle-ci on ne roule point les yeux comme dans le Haut-mal, qu'on n'a point d'écume à la bouche, & que la convulsion est beaucoup plus legére. Ces accès de Vapeurs ont des retours fréquens dans quelques personnes, & peuvent même devenir funestes, si l'on n'y remédie promptement. Il y a des signes pour connoître ce danger ; comme, si l'attaque dure long-tems, que la respiration soit extrêmement difficile, que le pouls soit prompt & déréglé, ou qu'il soit devenu imperceptible, & qu'alors le sentiment & le mouvement périssent. En effet, il survient une sueur froide aux extrêmités ; & la syncope annonce la mort. Le mal est moins fâcheux tandis

que la respiration est libre, sur-tout si l'on ne perd pas le sentiment ni le mouvement, quand même on remarqueroit tous les autres symptômes. Les personnes sujettes aux Vapeurs sont ordinairement maigres, tourmentées par des inquiétudes & des insomnies; elles aiment la vie sédentaire, & sont peu disposées au mouvement & à l'éxercice.

Pour traiter cette maladie, il y a des Remédes à faire durant l'accès, & après qu'il est cessé. Ceux que l'on fait pendant l'accès se réduisent à peu de chose, à moins qu'il ne soit violent & long. On frape plusieurs fois de sa main dans celle de la Malade pour la faire revenir, si elle a perdu connoissance, & on lui fait sentir pour la même fin l'odeur de chiffons, de papier, de plumes ou de savates brûlées: on lui donne notre Lavement contre la Colique venteuse (*a*), en y ajoutant une once de Catholicon ou de Diaphonic; & si l'accès continue, on fait usage de la Potion cidessus, à laquelle on ajoute deux gros d'Eau de Méliſſe spiritueuse apelée *Eau des Carmes*, & un gros de Thériaque, s'il y a de la foibleſſe. Son effet est de clamer les agitations & les convulsions, de rapeller la connoissance, & de procurer du repos.

Hors de l'accès, on saigne la Malade du bras & du pied, si elle est pléthorique, ou qu'elle souffre une supression de Régles: on la purge avec une de nos potions purgatives; & on lui fait user des Pilules

(*a*) *Voyez le Chapitre des Lavemens.*

contre les Vapeurs. On peut auſſi lui apliquer extérieurement l'Emplâtre Anti-Hyſtérique (*a*) ſur la région de la Matrice : de plus, s'il y a ſupreſſion, il faut y remédier par l'uſage de nos Tablettes martiales, & des autres Remédes répandus dans ce Livre contre cette maladie.

Potion diurétique contre l'Hydropiſie.

Prenez du ſuc dépuré de Cerfeuil, douze onces ;
du Criſtal minéral, deux ſcrupules ;
du Syrop des cinq Racines apéritives, une once & demie.

Mêlez le tout enſemble, & partagez en trois doſes, à prendre tiédes dans la journée, en continuant pendant quelque-tems.

Potion pour apaiſer les douleurs après l'Accouchement.

Prenez de l'Huile d'Amandes douces récente, une once.
Diſſolvez-y du Blanc de Baleine, un demi-gros, & y ajoutez enſuite du Syrop de Capillaire, une demi-once.

Pour une doſe qu'on répétera quatre heures après, s'il eſt néceſſaire.

(*a*) *Voyez les Chapitres des Potions purgatives*, pag. 102. *& ſuivantes ; des Pilules, des Tablettes & des Emplâtres.*

Potion contre la Supreſſion ſubite des Régles.

Prenez du Saffran,
un ſcrupule, ou un demi-gros.
Verſez deſſus un grand verre d'eau bouillante, & laiſſez infuſer ſur les cendres chaudes pendant une heure.

Coulez enſuite la liqueur par un linge avec une forte expreſſion, & ajoutez à la colature le jus exprimé d'une Orange aigre, pour une doſe à donner ſur le champ.

Remarque. Il arrive ſouvent qu'une peur, un mouvement de colére, une chûte ou quelqu'autre accident, ſuprime tout-d'un-coup les Régles; ce qui produit quelquefois dans le moment de violentes tranchées dans la Matrice, avec menace d'inflammation, & par la ſuite des Jauniſſes & des Cachexies qu'il eſt très-difficile de guérir. On peut prévenir ces états fâcheux en ſe ſervatt de la Potion ci-deſſus: il eſt rare qu'elle manque de rétablir les Régles, lorſqu'elle eſt donnée promptement; mais ſi la ſupreſſion eſt ancienne, elle devient inutile, & il faut avoir recours aux autres Remédes répandus dans cet Ouvrage contre cette maladie.

Potion pour faire ſortir une portion d'Arriere-Faix.

Prenez de l'Eau de Fleurs de Sureau,

de la Poudre de foie d'Anguille, un scrupule.
du Syrop d'Armoise, une once.

Mêlez le tout, pour une dose, qu'on peut répéter, s'il en est besoin.

Potion contre les Convulsions des Enfans.

Prenez de l'Eau de ce ises noires,
des Fleurs de Tilleul,
de chacune une once;
de la Poudre de Guttéte,
de Valériane sauvage,
de chacune quinze grains.

Mêlez le tout, pour une Potion à prendre par cuillerées de deux heures en deux heures.

Remarque. Cette Potion nous a toujours réussi, pour apaiser en peu de tems les Convulsions des Enfans; si c'est pour un Adulte, il faut la donner en deux petites doses à quelques heures de distances l'une l'autre. On s'en sert également contre l'Epilepsie, & les autres maladies du Cerveau qui attaquent le genre nerveux.

CHAPITRE IV.

POTIONS PURGATIVES.

Potion Purgative commune.

PRENEZ du Lénitif, six gros;
de la Manne, deux onces;
du Sel de Glauber, deux gros;

du Syrop de fleurs de Pêcher, une once.

Faites fondre la Manne dans un verre d'Eau chaude.

Paſſez-là enſuite, & ajoutez-y le Lénitif, le Sel & le Syrop, pour une doſe à prendre tiéde le matin à jeun.

Autre Potion Purgative commune, qui peut ſervir à une Femme groſſe.

Prenez du Lénitif fin, une demi-once;
de la Manne, deux onces;
du Sel végétal, un gros;
du Syrop de Chicorée compoſé de Rhubarbe, une once.

Faites du tout une Potion, à prendre le matin à jeun, dans un gobelet d'Eau chaude.

Remarque. Les deux Potions ci-deſſus lâchent doucement le ventre; elles en évacuent ſans effort les humeurs bilieuſes & corrompues: ainſi on doit les regarder comme un purgatif doux, qu'on peut donner en toute ſûreté aux tempéramens foibles & délicats.

Potion Purgative moyenne.

Prenez du *Diaprun* ſolutif, ſix gros.
de la Poudre Cornachine, un ſcrupule ou trente grains;
du Sel végétal, un gros;
du Syrop de Fleurs de Pêcher, une once.

Diſſolvez le tout dans un verre d'Eau bouillante, pour une doſe à prendre tiéde le matin à jeun.

Remarque. Cette Potion purge un peu plus que la précédente, & convient aux perſonnes plus fortes.

Potion Purgative-majeure.

Prenez du Séné, deux gros;
du Sel végétal, un gros.

Faites infuſer le tout pendant la nuit ſur les cendres chaudes dans un verre d'Eau bouillante.

Paſſez le lendemain la liqueur par un linge avec expreſſion, & diſſolvez dans la colature,

des Tablettes de *Citron*,
ou de *Diacarthami*,
depuis quatre juſqu'à ſix gros.

Pour une doſe, à prendre tiéde le matin à jeun.

Remarque. Cette Potion évacue puiſſamment les humeurs bilieuſes & autres contenues dans les premieres voyes; elle ne convient qu'aux Sujets robuſtes ou difficiles à émouvoir, & dans leſquels on ſoupçonne une abondance de matiéres à évacuer.

Potion Hydragogue ou *contre l'Hydropiſie.*

Prenez du Séné, deux gros;
du Sel végétal, un gros.

Faites infuſer le tout pendant la nuit dans un verre d'eau bouillante.

Paſſez le lendemain la liqueur par un linge avec expreſſion, & diſſolvez dans la colature

de la Poudre Cornachine,
de Jalap,
de chacune douze grains;
du Syrop de Nerprun, une once.

Pour une Potion, à prendre tiéde le matin à jeun.

Remarque. Cette Potion évacue puiſſamment les ſérofités; mais il faut joindre à ſon uſage celui des Apéritifs en Tiſanes & Bouillons décrits ci-deſſus (*a*), & s'en ſervir en guiſe de Purgatif lorſqu'il en ſera beſoin.

Potion Purgative - aſtringente.

Prenez un verre de Décoction de feuilles de Plantain.

Faites-y fondre de la Manne,
une once & demie.

Paſſez enſuite la liqueur par un linge, & diſſolvez-y

du *Catholicon* double,
une demi-once.

Pour une Potion, à prendre tiéde le matin à jeun.

Ou bien, ſi le dévoiement eſt mêlé de ſang.

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 38. *& des Bouillons*, pag. 70.

Prenez un verre de Décoction de feuilles de Plantain.

Faites-y fondre de la Manne,
une once.

Paſſez enſuite la liqueur par un linge, & délayez-y
du *Catholicon* double,
une demi-once ;
de la Poudre d'*Ipecacuanha*,
ſix grains.

Pour une Potion à prendre comme la précédente.

Remarque. Lorſque dans l'état ordinaire de ſanté il ſurvient un dévoiement ſans douleur, on doit bien ſe donner de garde de l'arrêter promptement, parce qu'il eſt ordinairement cauſé, ou par quelque indigeſtion, ou par une tranſpiration ſupprimée, ou enfin c'eſt la nature qui ſe décharge par cette eſpece de criſe d'une abondance d'humeurs corrompues qui l'incommodoit : dans tous ces cas le dévoiement eſt avantageux, & on doit le laiſſer continuer pendant quelques jours, juſqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même, ou que les évacuations trop abondantes cauſent de la fatigue & de la foibleſſe au Malade. Alors il faut purger avec la premiere des deux Potions ci-deſſus, & fortifier enſuite l'Eſtomac, en faiſant uſage pendant quelque-tems après le repas du Bol ſtomachique décrit ci-deſſous (*a*).

(*a*) *Voyez le Chapitre des Bols.*

Potion

Potion laxative contre l'Asthme.

Prenez un verre de l'Hydromel simple contre l'Asthme ci-dessus (*a*).

Dissolvez-y de la Manne, deux onces.

Passez la liqueur par un linge, & ajoutez-y

du Sel végétal, un gros ;
du Kermès minéral, deux grains.

Pour une Potion à prendre tiede le matin à jeun.

Remarque. On entend par le mot d'Asthme, une respiration difficile & laborieuse, qui vient d'un vice du Poumon. Dans cette maladie la poitrine est engagée, & quoique l'on soit sans fiévre, la respiration est fréquente & prompte, & si l'on s'exerce à quelque travail, elle est précipitée, de même que si l'on s'étoit mis hors d'haleine à force de courir. Outre cela on ressent dans la poitrine & aux hypocondres quelque douleur, quelquefois aussi & par intervalles aux épaules ; enfin il survient toujours de la toux. L'Asthme a ses retours. Il revient par intervalles, mais plutôt dans un air froid & humide, particulierement après des excès de vin & de bonne chere. La tranquillité du corps, la quiétude & la sérénité de l'air sont toujours favorables aux Asthmatiques. Les personnes qui ont la poitrine étroite, qui sont sujettes à la toux & aux fluxions, &

(*a*) *Voyez le Chapitre des Hydromels*, pag. 59.

sur-tout les Vieillards, ont une disposition prochaine à cette maladie.

On divise ordinairement l'Asthme en sec & en humide. Dans l'Asthme sec il y a une toux fréquente & incommode, mais on crache rarement ; dans l'Asthme humide la toux est moins forte, & l'expectoration copieuse.

Pour traiter l'Asthme sec, on doit commencer par une Saignée du bras, & donner notre Tisane pectorale adoucissante (*a*) pour boisson ordinaire. Il faut y joindre l'Apozême contre la Pleurésie, le Lohoch commun & le Julep somnifère, si le Malade est attaqué d'insomnie : on fera aussi usage de Lavemens communs ; & lorsque l'accès sera sur son déclin, on purgera le Malade avec notre Potion huileuse-laxative contre la Pleurésie, à laquelle on ajoutera une demi-once de Lénitif, & une once de Syrop de Chicorée, composé de Rhubarbe. Mais comme cette espece d'Asthme est ordinairement occasionné par des tubercules dans le Poumon, on lui fera user de tems en tems de notre Opiate fondante contre les tubercules du Poumon (*b*), & on lui fera prendre le Lait d'ânesse.

Quant à l'Asthme humide, qui est ordinairement occasionné par des matieres vis-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Apozêmes*, pag. 3. *des Tisanes*, pag. 39. *des Lavemens*, pag. 91. *& suiv. des Potions*, pag. 104. *&* 123, *des Juleps*, pag. 147. *& des Lohochs.*

(*b*) *Voyez le Chapitre des Opiates.*

queuſes & tenaces qui farciſſent le Poumon, il faut dans l'accès, s'il y a quelque danger de ſuffocation, ſaigner le Malade; autrement, il ne le faudroit pas, parce que cette eſpece d'Aſthme tend à l'Hydropiſie de Poitrine, ou à des tumeurs œdémateuſes dans le Poumon, qui défendent la Saignée. On preſcrira notre Hydromel compoſé (*a*), pour boiſſon ordinaire: on y joindra le Lohoch Anti-Aſthmatique, & l'uſage de quelques Lavemens; on aura ſoin de purger ſouvent avec la Potion ci-deſſus, ou bien avec le Bol Purgatif-Anti-Aſthmatique, ou nos Pilules Anti-Aſthmatiques; tous Remédes éprouvés contre cette maladie: enfin pour empêcher les retours d'Aſthme, ou du moins pour en éloigner les accès, (car cette maladie eſt ordinairement incurable, ſur-tout dans les Vieillards) on fera uſer de tems en tems de notre Opiate Anti-Aſthmatique.

Potion huileuſe-laxative dans la Fluxion de Poitrine & la Pleuréſie.

Prenez de la Manne, deux onces.
Faites-les fondre dans un gobelet de bouillon chaud.
Paſſez enſuite le tout par un linge, & joutez-y
de l'Huile d'Amandes douces récente, une once & demie.

(*a*) *Voyez les Chapitres des Hydromels*, pag. 9. *des Lavemens*, pag. 91. *& ſuiv. des Lohochs, des Bols, des Opiates & des Pilules*

du Blanc de Baleine diſſous auparavant dans ladite Huile,
un demi-gros,

Pour une Potion à prendre tiede le matin à jeun.

Remarque. Cette Potion purge très-doucement : elle eſt adouciſſante, & facilite l'expectoration : c'eſt la premiere dont on doit ſe ſervir ſur le déclin des Pleuréſies & des Fluxions de Poitrine.

Potion laxative-douce, ou *Eau de Caſſe ſimple.*

Prenez de la Caſſe en bâton,
ſix onces.

Concaſſez-la, & après en avoir rejetté le bois, faites-en bouillir la moëlle & les noyaux dans une chopine d'Eau commune ou de petit Lait, à la réduction de douze onces, ou deux gobelets.

Paſſez enſuite la liqueur par un linge avec expreſſion, & partagez-la en deux priſes, pour donner tiédes à deux heures de diſtance l'une de l'autre, & un bouillon leger entre les deux.

Remarque. Cette Potion eſt la plus douce de toutes celles qu'on peut employer ſur le déclin des maladies aigues, lorſque la fiévre, la ſéchereſſe de la peau, & tous les accidens commencent à tomber, & que l'indication ſe preſente de purger. On fera bien, ſi la Poitrine n'a point été attaquée dans la maladie, d'ajouter à chaque priſe

an gros de Sel végétal, ou de Glaubert, & même ſi le malade eſt robuſte, & que l'on ſoupçonne une abondance de matiéres dans les premieres voies, on pourra en outre aiguiſer le premier verre ou gobelet d'une once de Manne.

Potion pour exciter les douleurs dans un Accouchement difficile.

Prenez du Séné mondé, deux gros.
Faites-les infuſer pendant une heure dans un petit verre d'eau bouillante.
Paſſez enſuite par un linge avec expreſſion, & ajoutez-y le jus d'une Orange aigre.
Pour une Potion, à donner ſur le champ.

Remarque. Cette Potion convient dans les Accouchemens laborieux, où les douleurs ſont petites & legéres, venant de loin en loin, & de mauvaiſe eſpéce, elle les réveille, par l'irritation qu'elle cauſe aux Inteſtins, qui mettant en contraction les muſcles du bas-ventre, facilite par là l'expulſion du Fœtus : on peut y joindre, une heure ou deux après qu'on l'aura fait prendre, un Lavement un peu purgatif, afin que ces deux Remédes produiſant leur effet en même-tems, les douleurs de l'Accouchement en puiſſent être plus facilement provoquées. La ſeule attention qu'il faut avoir, c'eſt d'examiner ſi l'Accouchement laborieux ne vient pas d'extention, de gonflement & d'irritation dans les parties, plutôt que de foibleſſe

& de relâchement : car il ſeroit dangereux ici de prendre le change, & dans ce cas, la Saignée du bras & les Fomentations émollientes ſeroient les meilleurs Remédes à employer.

Nous ferons, à l'occaſion des Potions purgatives décrites ci-deſſus, quelques Remarques générales ſur l'uſage des Purgations.

REMARQUES GE'NE'RALES ſur l'uſage des Purgatifs.

Les ſignes qui indiquent la Purgation en général, ſont les dégoûts, les brouillemens, les gonflemens, & la pareſſe du bas-ventre, lorſqu'elle n'eſt pas naturelle; les maux de tête, les vertiges, les bruiſſemens d'oreilles, la langue chargée & blanche, l'amertume & le mauvais goût dans la bouche, le défaut d'apétit, les rapports aigres ou amers, les vents, les flatuoſités, les peſanteurs d'Eſtomac, les coliques, & les aſſoupiſſemens (*a*). Les Purgatifs ne ſont pas moins néceſſaires à ceux qui ſont menacés d'Apoplexie ſéreuſe, & de Léthargie, ou qui en ont déja eu quelques attaques; il eſt néceſſaire que ces perſonnes ſe purgent ſouvent, afin de prévenir les attaques de ces maladies, & ſur-tout qu'elles obſervent un bon régime de vivre, & qu'elles mangent peu le ſoir. Ces attentions leur ſeront plus profitables que tous les

(*a*) M. Helvétius, *Traité des Maladies.*

Sachets Anti-Apoplectiques, qui ne ſervent qu'à enrichir les Charlatans qui les debitent, & à amuſer le Malade ſans aucun profit réel, puiſqu'on a vû par expérience des gens tomber & mourir en peu de tems d'Apoplexies violentes avec un double Sachet pendu au col, qu'ils portoient depuis pluſieurs années.

L'attention qu'on doit avoir dans l'uſage des Purgatifs, eſt d'en proportionner la doſe à la force ou à la foibleſſe des différens Sujets. Il eſt aiſé de s'y tromper, à moins qu'on n'ait quelque expérience; & il n'arrive que trop ſouvent que l'on outre les évacuations par des Purgations trop fortes, dont les fuites ſont toujours périlleuſes. Malheureuſement pour le peuple, il eſt d'accord avec ceux qui le traitent ſi mal: car les trois quarts des gens ne ſe croyent bien purgés, qu'autant qu'ils ont eu des évacuations exhorbitantes, & plus on eſt fatigué le lendemain de ſa médecine, plus on eſt content; encore mieux ſi le dévoiement cauſé par la Purgation trop forte dure quelques jours: alors on s'imagine qu'on avoit une grande abondance de matiéres, dont on a été heureuſement délivré. Combien de maux un ſage Médecin ne voit-il pas naître de cette erreur! Et quel trouble, quel affaiſſement ne doivent pas ſuivre des évacuations immodérées, qui entraînent tout à la fois les ſucs impurs, & ceux que la Nature ſe réſerve pour ſes opérations! Pour prévenir toute erreur à ce ſujet, nous

avons dosé tous nos Remédes un peu bas ; il sera facile d'en augmenter la quantité, en purgeant une autre fois le Malade : il y a moins de danger à purger deux fois qu'à être obligé de remédier aux suites d'une Purgation excessive. Nous conseillons même de ne le faire jamais brusquement, c'est-à-dire, sans avoir préparé le sujet par quelques Lavemens ou quelques jours de boisson d'Eau de Veau, ou d'une Tisane rafraîchissante. On est sûr par cette méthode que le Purgatif ne causera aucun trouble, & qu'il agira sans violence. Que si malgré cela le Malade se trouvoit fatigué par trop d'évacuation, il faudroit lui donner le soir même, à l'heure du sommeil, un demi-gros ou un gros de *Diascordium* dans un petit verre de bon Vin rouge ; ce qui le fortifieroit, & arrêteroit les évacuations.

Il arrive quelquefois dans certaines personnes, que les Purgatifs un peu forts les fatiguent avec tant de violence, & leur causent tant de douleurs, qu'elles en tombent en défaillance. Pour prévenir cet accident, on dissoudera un demi-grain de *Laudanum* dans la Potion ; ce qui empêche les tranchées & tous les autres accidens qui peuvent survenir, sans pour cela arrêter l'action du Purgatif. Cet expédient réussit trés-bien dans les Coliques violentes, & lorsque l'Estomac & les Intestins sont susceptibles de la moindre impression. On peut aussi dans le même cas, au lieu du *Laudanum*, donner un verre de petit Lait clarifié après le Purgatif, & une demi-

heure après un autre verre, qui ſera à chaque fois de dix onces. Par ce moyen on évitera les déſordres que les Purgatifs ont accoutumé de cauſer dans les conſtitutions délicates.

Au reſte, quelques utiles que ſoient les Purgatifs en général, il y a des occaſions où leur uſage ſeroit très-dangereux.

Ainſi on doit s'abſtenir de purger ceux qui ſont attaqués d'inflammations, d'ardeurs dans les Entrailles & dans les Viſcéres du bas-ventre, de toux ſéche, & lorſque le Malade reſſent de la douleur dans le creux de l'Eſtomac en y portant la main.

Les Purgatifs ſont encore contraires dans les Fluxions naiſſantes, les inflammations du Poumon, les crachemens de Sang, les douleurs internes vives, & les pertes de Sang, de quelque cauſe qu'elles proviennent : il en eſt de même lorſque l'on reſſent des ardeurs d'urine, ou lorſque celles que l'on rend ſont rouges & en petite quantité ; lorſqu'on a une fiévre conſidérable, ou que l'on eſt dans une ſueur abondante & critique : car dans ces derniers cas on doit attendre la fin du redoublement, ou que la ſueur ſoit paſſée.

Les Femmes doivent s'abſtenir de la Purgation dans les aproches de leurs Régles, à plus forte raiſon lorſqu'elles les ont : elles doivent même attendre pour ſe purger, qu'il y ait au moins trois jours qu'elles ſoient entiérement ceſſées.

A l'égard des Femmes enceintes, il ne

leur faut donner des Purgatifs que dans une néceſſité abſoluë, & préférer, pour le faire, le milieu de leur groſſeſſe au commencement & à la fin, ſe ſervant toujours des Minoratifs les plus doux, & en petite doſe. Il y a néanmoins des cas qui demandent non-ſeulement l'uſage des Purgatifs, mais encore celui des Vomitifs, malgré les égards que l'on doit avoir par raport au Fœtus ; mais dans ces cas-là, il faut toujours demander l'avis d'un Médecin.

Le terme ordinaire de purger les Accouchées eſt entre un mois ou ſix ſemaines, qui eſt le tems où les ſuites de la couche ont coutume de ſe terminer.

On doit éviter auſſi de purger ſans néceſſité dans les grandes châleurs de l'Eté, & dans les froids Violens de l'Hyver ; il vaut mieux choiſir un tems frais & humide, dans lequel les corps ſont plus relâchés, & plus diſpoſés aux évacuations.

Nous finirons nos Remarques ſur les Purgatifs par une réflexion qui regarde particuliérement les Pauvres. On les traite dans leurs maladies par des ſaignées abondantes, comme ſi le mauvais régime de vivre dont ils uſent, & les mauvais alimens dont ils ſe nourriſſent, n'étoient pas un obſtacle à cette eſpéce d'évacuation, & s'il ne convenoit pas au contraire de les beaucoup purger pour évacuer les mauvais ſucs, qui par des ſaignées paſſent des premiéres voyes dans la maſſe du ſang, l'épaiſſiſſent, & jettent les Malades dans

des Cachexies, des Bouffiſſures, & des Hydropiſies inſurmontables. Le Médecin des Pauvres, M. *Dubé*, ſe récrie beaucoup contre cette mauvaiſe pratique, & avec juſte raiſon : car nous l'avons bien remarqué depuis par une expérience conſtante de pluſieurs années Nous exhortons donc les Perſonnes charitables de ne point perdre de vûe que les Pauvres ſe nourriſſent mal, & qu'ils ſont pour la plûpart épuiſés de travail & d'incommodités ; ce qui demande la Purgation fréquente, de bons Alimens pour les rétablir & les fortifier, & un uſage de la ſaignée très-modéré. Par ce moyen on leur évitera bien des maladies, & leurs convaleſcences en ſeront moins longues.

Potion, ou *Eau Minérale-Emétique.*

Prenez de l'Eau commune tiéde, une chopine.
Diſſolvez-y du Sel d'Epſom,
ou de Glauber,
ou Végétal,
une demi-once,
du Tartre-Emétique,
depuis quatre juſqu'à ſix grains.

Pour une Potion, à prendre tiéde en quatre verres dans la matinée, ayant ſoin de ſuprimer le dernier, ſi les trois premiers ont évacué ſuffiſamment.

Remarque. Cette potion évacue abondamment par le vomiſſement & par les

felles les matiéres corrompues retenues dans les premiéres voyes : elle eſt plus facile à prendre que celle qui ſuit, parce qu'elle n'a pas de mauvais goût, & que la couleur de l'Eau n'en eſt pas changée ; mais auſſi ſon action eſt un peu moins douce, la Caſſe, dans la ſuivante, émouſſant l'effet de l'Emétique : il la faut cependant préférer dans les cas où l'on veut placer l'Emétique, ſans que le Malade s'en aperçoive ; ou bien lorſqu'étant difficile à prendre, on craint qu'il ne veuille pas ſe prêter à avaler pluſieurs verres d'un Reméde dégoûtant & déſagréable.

Potion, ou *Eau de Caſſe, compoſée avec les Grains d'Emétique.*

Prenez de la Caſſe en bâton, ſix onces.
Concaſſez-là, & faites-là bouillir dans trois demi-ſeptiers d'eau, que vous réduirez à une chopine.
Paſſez enſuite la liqueur par un linge, & ajoutez-y,
du Tartre-Emétique,
depuis quatre juſqu'à ſix grains.
Pour une Potion à donner en quatre verres tiédes dans la matinée.

REMARQUES GE'NE'RALES ſur l'uſage de l'Emétique.

L'Emétique eſt regardé, avec raiſon, comme le premier de tous les Remédes dans un grand nombre de maladies : car

il n'évacue pas seulement les impuretés contenues dans l'Estomac & dans les Intestins ; mais encore par les secousses du vomissement qu'il procure, il exprime les liqueurs qui séjournent dans les cavités des Glandes, il les fait couler, & en rétablit la circulation. On l'emploie avec succès dans le commencement de presque toutes les maladies aigues, lorsqu'il s'agit d'évacuer abondamment les humeurs par le vomissement, comme dans les Apoplexies séreuses, & dans celles qui surviennent après avoir beaucoup mangé ; dans les Léthargies, l'Epilepsie, les Etourdissemens qui viennent des mauvaises digestions, & dans les pâles couleurs. L'Emétique produit encore de merveilleux effets dans les Fiévres malignes, dans les Fiévres intermittentes, & sur-tout dans les Quartes, dans la Petite-Vérole avant l'éruption, dans les Coliques obstinées, dans les violens accès de l'Asthme qui durent long-tems, dans les Ophthalmies opiniâtres, dans les Fluxions de poitrine, sur-tout celles d'Hyver ; en un mot, dans tous les cas où l'on a lieu de soupçonner que l'Estomac est farci de mauvais levains qui entretiennent la Fiévre. On peut donner l'Emétique sous la forme d'une des deux Potions ci-dessus, & le faire à toute heure dans les cas qui sont urgens ; mais si l'on n'est pas pressé, il vaut mieux donner le Vomitif le matin à jeun, parce qu'alors il agit avec plus de force & plus immédiatement sur les mauvais levains de

l'Estomac. On mêle dans ces deux Potions l'Emétique avec les Purgatifs, afin de vuider les sucs impurs par haut & par bas en même-tems. Cependant lorsqu'on est obligé dans les violentes Convulsions & les fortes Apoplexies de donner l'Emétique tout pur, afin qu'il produise plus promptement son effet, on doit faire prendre bientôt après une Potion purgative, pour nettoyer le canal intestinal des sucs impurs qui s'y sont amassés.

Mais si l'Emétique est capable de tous les bons effets que nous venons de dire, il peut d'un autre côté en produire de très-dangereux, lorsqu'il n'est pas employé comme il convient ; ainsi avant de le donner, il faut faire attention si le Malade se trouve dans quelques unes des circonstances suivantes pour éviter de le prescrire en pareil cas. On s'informera donc si le Malade vomit facilement : car il y en a qui ne vomissent jamais, en prenant même la plus grande dose d'Emétique ; d'autres sont d'une constitution si délicate, qu'ils ne supportent que très-difficilement le vomissement, de sorte que les forces leur manquent, & qu'ils tombent dans des anxietés & des défaillances dangereuses. Il faut encore examiner si les Malades sont Pulmoniques, ou menacés de le devenir ; s'ils sont sujets au crachement, ou au vomissement de sang ; & si c'est une Femme, si elle est sujette à des Pertes : car dans ces derniers cas, les secousses que cause le vomissement pourroient occasionner une hémorrhagie mortelle.

Il ne faut pas non-plus le donner aux perſonnes qui ont des Deſcentes, à moins qu'elles ne ſoient contenues par un bandage : on ne doit pas le faire prendre aux Femmes qui ont leurs Régles, à celles qui ſont Enceintes, & aux nouvelles Accouchées, à moins qu'elles ne ſoient attaquées de Fiévres malignes, de tranſports au cerveau, de Convulſions d'Apoplexie, ou de quelqu'autre maladie qui menace d'une mort prochaine ; dans ces extrémités, on doit le donner après les ſaignées requiſes, le mêler avec la Manne pour en adoucir l'action, & prendre toujours l'avis d'un Médecin, s'il eſt poſſible, dans ces occaſions délicates.

Il ne convient pas dans les Apoplexies cauſées par un coup reçu à la tête, ou par quelque chûte violente.

Il eſt encore très-périlleux de le faire prendre aux Malades attaqués de Fiévres continues, quand elles ſont accompagnées d'inflammations à l'Eſtomac, ou au Foye, ou aux Inteſtins ; ce qu'on reconnoît par la tention du bas-ventre, & la vive douleur que reſſent le Malade lorſqu'on y touche, & qu'on apuie un peu la main ſur ces parties. On feroit une faute groſſiére de regarder comme vraies les envies de vomir que l'on a ſouvent dans ces maladies, & qui ne dépendent que d'une Convulſion ſymptomatique des fibres de l'Eſtomac ; ainſi il faut bien ſe donner de garde de donner alors l'Emétique, qui ne pourroit qu'augmenter l'inflammation, & faire périr le malade.

Enfin l'Emétique ne convient pas dans les Obſtructions invétérées du bas-ventre, à moins que l'on n'y ſoit forcé par des accidens fort preſſans, comme ſeroit une Apoplexie, où l'on ne doit rien ménager pour l'adminiſtration des Remédes : car dans ces ſortes d'Obſtructions, les muſcles du bas-ventre & du diaphragme ſe mettant en contraction, compriment non-ſeulement l'Eſtomac, mais encore les Viſcéres obſtrués ; & il eſt à craindre qu'ils ne les froiſſent, que les ſucs vicies ne s'y engagent de plus en plus, & n'y cauſent des ſchirres & des inflammations : outre que l'Emétique eſt inutile dans ces cas-là, n'étant pas en état de lever ces ſortes d'Obſtructions, dont les Apéritifs & les Fondans ſont les véritables Remédes.

Lorſque les Malades vomiſſent, il faut qu'ils boivent abondamment de l'Eau tiéde, ou de l'Eau de Veau, ou de Poulet, pour délayer les matiéres contenues dans l'Eſtomac, pour en faciliter la ſortie, & pour diminuer les efforts que l'on fait en vomiſſant : c'eſt une mauvaiſe pratique que de donner du Bouillon gras, parce que la force de l'Emétique en eſt émouſſée, & que la diviſion des humeurs viſqueuſes, qui ſont contenues dans l'Eſtomac, ne s'en fait pas ſi bien.

Quoique par la façon dont nous avons preſcrit les deux Potions Emétiques ci-deſſus, on ſoit le maître d'en ſuprimer quelques verres, ſi les évacuations ont été ſuffiſantes ; ſi cependant il arrivoit que le vomiſſement fût trop violent ou trop long,

il faudroit donner au Malade quelques goblets d'Eau ou de Tiſane, auſquels on ajoûteroit un peu d'Eſprit de Souffre ou de Vitriol juſqu'à une agréable acidité : ce qui arrêteroit promptement l'effet de l'Emétique, & tranquilliſeroit l'Eſtomac.

Eau Minérale artificielle, pour les perſonnes d'un tempérament foible.

Prenez du Tartre Martial ſoluble,
& du Sel de Glaubert,
de chacune une once ;
de l'Eau de Riviére,
ou de Fontaine, dix livres.

Faites bouillir le tout enſemble, juſqu'à la diminution du cinquiéme de la liqueur ; retirez enſuite le vaiſſeau du feu, & laiſſez raſſeoir cette Eau pendant trois heures ; paſſez enſuite par un linge plié en trois, & mettez la liqueur en bouteilles, que vous garderez dans un lieu frais.

Remarque. Les Eaux Minérales naturelles ſont d'un très-grand ſecours dans pluſieurs maladies ; mais il arrive ſouvent que bien des perſonnes, ſoit par l'éloignement des lieux, ſoit par la dépenſe que le voyage occaſionne, ne peuvent pas en profiter : c'eſt ce qui nous a engagés à leur ſubſtituer celle que nous propoſons ci-deſſus. Elle convient dans les maladies cachectiques, comme dans la Bouffiſſure, les Pâles-couleurs, la ſupreſſion des Régles, ou dans quelqu'au-

tre maladie que ce ſoit où le ſang eſt épais, tenace ou viſqueux : on en prend ordinairement trois verres tiédes le matin à jeun, gardant un demi-quart-d'heure d'intervalle entre chaque verre, & on ſe proméne dans la chambre, ou à l'air, ſelon le tems ; on ne mange que deux heures après avoir bû les trois verres. Il faut ſe purger avant que de la commencer, & en continuer l'uſage pendant un mois, pour qu'elle produiſe un bon effet, ſe purgeant encore à la fin. Les perſonnes qui ont la poitrine délicate, qui ſont ſujettes à des toux ſéches, à cracher du ſang, ou qui ſont attaquées de Fiévre étique, doivent s'en abſtenir.

Autre Eau Minérale artificielle, pour les perſonnes plus robuſtes attaquées des Pâles-couleurs.

Prenez deux onces de Limaille d'Acier crue bien lavée.

Faites-les infuſer pendant vingt-quatre heures dans une chopine de Vin blanc ; paſſez enſuite par un linge plié en deux au-deſſus d'une cruche remplie de ſix peintes d'Eau de riviére : rejettez comme inutile ce qui ſera reſté ſur le linge, & conſervez cette Eau dans des bouteilles bouchées & placées dans un lieu frais.

La maniére de s'en ſervir eſt d'en faire ſa boiſſon ordinaire pendant quinze jours, tant aux repas que dans les intervalles ;

plus la Malade en boira, & plutôt elle ſera guérie : il faut de plus qu'elle mange de la ſoupe deux fois le jour, évitant les fruits crûs, la ſalade, la pâtiſſerie, & tout ce qui eſt de difficile digeſtion ; elle doit commencer par ſe purger, & faire pendant l'uſage de cette Eau le plus d'exercice qu'elle pourra.

Purgatifs pour les enfans.

RÉGLES GÉNÉRALES.

1°. Pour purger les enfans avec ſuccès & ſans aucun inconvénient, il faut toujours avoir égard à leur âge, & à l'état de leurs forces, & chercher en outre un Purgatif de petit volume, qu'ils puiſſent prendre facilement.

2°. L'expérience nous a apris qu'on pouvoit obtenir cet avantage, en ne s'écartant point de la méthode ſuivante, qui conſiſte à employer pour baſe de la Purgation un Purgatif qui puiſſe ſe doſer par grains, & produire ſon effet à un nombre de grains égal à peu près à celui des années de l'Enfant que l'on veut purger.

3°. La Poudre de Jalap nous a paru propre à cela. Elle purge doucement, en petit volume, & ſans dégoût ; ce qui nous la fait préférer à tout autre Purgatif. Nous ſçavons, il eſt vrai, qu'il y a un préjugé dans le Public à ce ſujet, & que bien des gens croyent que le Jalap eſt un violent Purgatif & fort échauffant : mais c'eſt une erreur, qui ne vient que de ce que l'on con-

fond la Poudre de Jalap avec ſa Réſine. Nous convenons volontiers que la Réſine de Jalap, qui ſe tire en faiſant infuſer la Poudre de Jalap dans de l'Eau-de-vie, ou de l'eſprit de vin, eſt fort échauffante, & purge quelquefois avec excès comme toutes les autres Réſines purgatives : auſſi nous ne conſeillons point indifféremment à tout le monde l'uſage de ces Ratafiats de Jalap & d'Eau-de-vie Allemande, dont bien des perſonnes ſe ſervent pour ſe purger ; il n'y a même que les tempéramens rélâchés, mous & pituiteux, qui puiſſent s'en ſervir avec avantage, & nous les regardons comme très-contraires aux gens ſecs, bilieux & mélancoliques. Mais il n'en eſt pas de même de la Poudre de Jalap priſe en ſubſtance : la partie réſineuſe qu'elle contient, y eſt corrigée & étendue dans une ſuffiſante quantité de terre & de parties ſalines, qui la diviſant, en modérent l'action ; tous les Chimiſtes ſçavent cela. On doit donc regarder cette Poudre comme un Reméde qui ſort tout préparé des mains de la Nature ; & l'uſage heureux que nous en faiſons depuis pluſieurs année en juſtifie le choix : d'ailleurs, les Enfans ſuportent mieux, proportion gardée, l'action des Purgatifs, que les grandes perſonnes, parce que le lait & les bouillies dont ils ſont nourris, en émouſſent l'acrimonie. Cependant, comme dans la premiére année de leur âge le Syrop de Chicorée compoſé de Rhubarbe nous paroît leur mieux convenir, parce qu'il purge & fortifie en même-tems, nous

ne nous ſervons de notre méthode que dans leur ſeconde année. La régle que nous ſuivons dans la premiére année, eſt de ſubſtituer au grain de Jalap un gros du Syrop ci-deſſus, & d'en égaler le nombre à celui des mois de leur naiſſance; enſorte qu'à ſix mois nous leur en donnons ſix gros, & au bout de l'an une once & demie; ce qui peut varier de quelque choſe, ſuivant que l'Enfant eſt plus ou moins fort. On étend ce Syrop dans une ou deux cuillerées d'eau ou de lait tiéde, & on le donne à deux ou trois répriſes, parce qu'autrement l'Enfant pourroit le rejetter.

4°. Après la premiére année, nous ſuivons notre méthode, en ſubſtituant au Syrop de Chicorée la Poudre de Jalap, comme baſe de la Purgation, & en y joignant autant de Crême de Tartre, qui n'eſt point comptée, mais qui ſert cependant à ſoutenir l'action du Purgatif. On incorpore le tout dans un peu de Syrop de fleurs de Pêcher, dont on forme un Bol; où bien, ſi le Bol répugne à l'Enfant, on l'étend dans quelques cuillerées d'eau, ou de lait.

5°. En un mot, nous donnons autant de grains de Poudre de Jalap & de Crême de Tartre, que l'Enfant a d'années; & cela juſqu'à l'âge de cinq ans Quand au Syrop de fleurs de Pêcher, que nous y joignons toujours, nous en augmentons ou diminuons la doſe, ſuivant que nous voulons plus ou moins purger.

6°. Quand l'Enfant paſſe cinq ans, nous augmentons un peu la doſe du Purgatif,

& au lieu d'un grain par année, nous en donnons un grain & demi ; ce que nous continuons jusqu'à l'âge de dix ou douze ans : après quoi nous nous servons de tous les Purgatifs.

7°. Les personnes qui sont dans l'usage de se servir de la Poudre Cornachine pour purger les Enfans, pourront également suivre notre méthode, en substituant partout deux grains de cette Poudre, à chaque grain de Poudre de Jalap ; c'est-à-dire en donnant deux grains de Poudre Cornachine par chaque année de l'âge de l'Enfant, & les incorporant toujours avec la même dose de Syrop de fleurs de Pêcher.

8°. Nous finirons nos Remarques sur ce qui regarde les Enfans en avertissant que notre méthode ne convient que quand il n'y a que peu ou point de fièvre, & qu'ils ont seulement besoin d'être purgés ; car en cas de maladies aigues, nous nous bornons à la Manne & à quelques Syrops purgatifs.

Les exemples suivans pourront servir de modèle.

Purgatif pour un Enfant de quatre mois.

Prenez du Syrop de Chicorée, composé de Rhubarbe, une demi-once.

Etendez-la dans deux cuillerée de lait, ou d'eau.

Purgatif pour un Enfant de huit mois, qui a des tranchées.

Prenez du Syrop de Chicorée composé, une once;
de l'Huile d'Amandes douces, une once.
Mêlez le tout, pour en prendre une cuillerée d'heure en heure.

Purgatif pour un Enfant de dix-huit mois.

Prenez de la Poudre de Jalap,
de la Crême de Tartre,
de chacune un grain & demi.
Incorporez-les avec trois ou quatre gros de Syrop de fleurs de Pêcher; puis étendez le tout dans deux cuillerées d'eau, ou de lait.

Notez que si l'Enfant qu'on veut purger a le dévoiement, nous mettons à la place du Syrop de fleurs de Pêcher celui de Chicorée composé de Rhubarbe, & que nous ôtons le Jalap, auquel on substitue quelques grains de Poudre de Rhubarbe.

Purgatif pour un Enfant de trois ans.

Prenez de la Poudre de Jalap,
de la Crême de Tartre,
de chacune trois grains;
du Syrop de fleurs de Pêcher, une demi-once.
Mêlez le tout ensemble, & étendez-

le dans deux cuillerées d'eau, ou de lait.

Purgatif pour un Enfant de ſix ans, auquel on ſoupçonne des Vers.

Prenez de la Poudre de Jalap,
de la Crême de Tartre,
de chacune neuf grains;
de la Coralline, *ou* Poudre contre les Vers, douze grains;
du Syrop de fleurs de Pêcher,
ſix gros.

Mêlez le tout, & étendez-le dans deux ou trois cuillerées de Tiſane ou de Bouillon, pour prendre en une ou deux petites doſes.

Potion purgative pour un Enfant de huit à dix ans.

Prenez de la Poudre de Jalap,
de la Crême de Tartre,
de chacune quinze grains;
du Syrop de fleurs de Pêcher,
une once.

Délayez le tout dans un peu d'eau ou de Tiſane, pour une doſe *.

* *Notez que s'il ſe trouvoit quelque Enfant qui eût de la répugnance pour les purgatifs ci-deſſus, on employeroit une des deux potions ſuivantes, ou notre Biſcuit purgatif, qui n'ont rien de dégoûtant.*

Emulſion

Emulsion purgative pour un Enfant de trois à quatre ans.

Prenez deux ou trois Amandes douces pelées dans l'eau chaude.

Pilez-les dans un mortier de marbre, en versant dessus peu-à-peu un petit verre d'Eau d'Orge.

Faites-y fondre ensuite de la Manne, une demi-once.

Passez le tout par un linge, & ajoûtez-y de la Poudre Cornachine; six grains.

Pour une dose tiéde, à prendre le matin à jeun.

Ou bien, Prenez de la Manne, une once ou une once & demie, suivant la force de l'Enfant. Faites-la fondre dans un petit Bouillon au lait. Passez le tout, pour une dose à prendre le matin à jeun *.

* *Nous avons observé depuis la première édition de cet Ouvrage, que la dose d'un grain de poudre de Jalap que nous prescrivons par chaque année de l'âge des Enfans, n'étoit pas suffisante pour les purger : cela nous a obligé de la porter à un grain & demi par année jusqu'à l'âge de dix ans; ce qui suffit, en y ajoutant une dose égale de Crême de Tartre, & du Syrop de fleurs de Pêcher depuis demi-once jusqu'à une once, suivant la force de l'Enfant.*

Ceux qui se servent de la poudre Cornachine, la porteront aussi à deux grains & demi par année jusqu'à ce même âge de dix ans; on étend le tout dans quelques cuillerées d'Eau ou de Tisane chaude, parce que les Enfans ont beaucoup de difficulté & de répugnance à avaler les Bols,

Biſcuit Purgatif.

Prenez du Sucre blanc pulvériſé, & des œufs frais, la coque compriſe,
de chacun neuf onces ;

de la fleur de Farine de Froment,
quatre onces ;
de la Poudre très-fine de Jalap,
une once ſix gros ;
de l'Anis pulvériſé,
un gros & demi.

Faites du tout un Biſcuit ſelon l'Art.

La doſe eſt d'un gros par année juſqu'à quatre ans ; depuis quatre juſqu'à ſix, cinq gros ; depuis ſix juſqu'à dix, ſix à ſept gros ; depuis dix juſqu'à quinze, l'once entiére, en augmentant ſuivant l'âge & la force. On en a donné à des Adultes juſqu'à une once & demie, ſans qu'ils ayent été trop purgés.

Remarque. Ce Biſcuit purge très-bien, & ſans aucune fatigue : il eſt de plus auſſi agréable au goût que le Biſcuit ordinaire ; ce qui eſt d'une grande commodité, ſurtout pour les Enfans, qu'il eſt preſque impoſſible de réſoudre à prendre quelque choſe de déſagréable : les perſonnes qui ont une averſion inſurmontable pour les médecines ordinaires, pourront également en faire uſage. Nous convenons cependant qu'une Purgation en liqueur eſt un peu plus legére, & laiſſe après elle moins d'impreſſion de chaleur ; mais lorſqu'on ne peut

faire autrement, il vaut encore mieux se purger avec le Biſcuit, lorſque cela eſt néceſſaire, que de ne le point faire du tout. Au reſte, nous n'en avons jamais vû de mauvais effets pour les grandes perſonnes, en s'y préparant deux ou trois jours devant par quelques Bouillon rafraîchiſſans, ou en uſant de quelques Lavemens; il faudra auſſi avaler par-deſſus un grand gobelet de Tiſane chaude pour le détremper dans l'Eſtomac, & prendre un Bouillon deux heures après, en continuant la boiſſon de Tiſane pour ſoutenir les évacuations.

CHAPITRE VII.

JULEPS & LOHOCHS.

§. I. DES JULEPS*.

ulep Somnifére, ou *pour procurer le ſommeil.*

PRenez de l'Eau de Laitue, quatre onces;
du Syrop Diacode, une demi-once;
ou du *Laudanum* liquide de Sydenham, douze gouttes.

* *Le* Julep *eſt un reméde liquide, compoſé ordinairement d'Eaux diſtillées, & de quelques Syrops. Il différe de la Potion en ce qu'il eſt beaucoup moins chargé, & plus agréable.*

Mêlez le tout, pour un Julep à donner à l'heure du ſommeil.

Remarque. Perſonne n'ignore que rien n'accable tant la Nature, & ne diſſipe tant les eſprits, que l'inſomnie. Elle met, pour ainſi dire, le feu dans le ſang, & elle le dépouille de ſes parties le plus balſamiques, de ſorte qu'elle attire néceſſairement des accidens fâcheux, ſi l'on ne prend ſoin de rapeller le ſommeil par des Remédes convenables. Entre ces Remédes le principal eſt l'*Opium*, & lorſqu'il eſt adminiſtré dans les cas néceſſaires, & à une doſe modérée, il fait, pour ainſi dire, des miracles; mais il y a un préjugé ſi terrible répandu dans le Public contre ce Médicament, que lorſqu'on parle aux Malades de les faire dormir par le ſecours de l'*Opium*, il ſemble qu'on veuille les jetter dans les bras de la mort, & leur procurer le repos éternel, de ſorte qu'ils aiment mieux ſouffrir l'inſomnie la plus cruelle, que de riſquer pour leur ſoulagement la moindre doſe de ce Reméde. Ce préjugé a ſans doute ſon origine dans quelque *qui pro quo* répété pluſieurs fois, où par une doſe trop forte d'*Opium*, on aura fait dormir les Malades beaucoup plus que de raiſon. Car les bruits populaires renferment toujours quelque choſe de vrai, mais que l'on étend trop loin ordinairement. Nous penſons donc qu'il ſera utile de marquer ici en peu de mots les cas où conviennent les préparations d'*Opium*, & ceux où elles peuvent faire du mal : par-là

les esprits assurés se prêteront avec confiance à l'usage d'un Reméde qui est une des colomnes de la Médecine, & auquel elle a chaque jour de nouvelles obligations.

L'*Opium* convient dans tous les cas, où les Malades souffrent de violentes douleurs qui ne leur donnent point de relâche : car il les apaise presque à l'instant, en calmant l'agitation des esprits, & en faisant succéder un doux sommeil à de longues souffrances. C'est par cette raison qu'il est utile dans les Cours de ventre accompagnés de tranchées & de tenesme, dans les Dyssenteries, dans les Vomissemens énormes, dans les Coliques, & surtous les Néphrétiques, dans les Toux séches, & dans celles qui sont causées par une pituite âcre & salée qui se jette sur les Poumons. Son usage n'est pas moins convenable aux personnes attaquées de Cancers, d'Ulcéres, de Gouttes chaudes, de Rhumatismes universels, & autres maladies chroniques accompagnées de douleurs vices, qui empêchent les Malades de prendre aucun repos. On s'en sert encore avantageusement dans les maladies spasmodiques des nerfs, & dans la Passion hystérique. Voilà l'usage qu'on doit faire de l'*Opium* ; voyons maintenant en quoi il est dangereux.

1° On ne doit jamais donner ce Reméde dans les Fluxions de Poitrine avec relâchement, lorsqu'il y a de l'opression, & que les crachats sont épais, collans & glaireux, parce qu'il en empêcheroit l'expectoration.

2°. Les personnes extrêmement affoiblies & exténuées doivent s'en abstenir, parce qu'il les jetteroit dans un abattement & un accablement qui pourroit devenir funeste.

3°. Les Filles ou les Femmes qui ont leurs Régles, ou les Femmes qui sont en travail, ou qui viennent d'accoucher, ne le doivent point prendre ; car ce Reméde pourroit suspendre les évacuations nécessaires.

Enfin, Les Malades qui sont dans l'assoupissement ceux qui ont été attaqués d'Apoplexie, de Léthargie, d'engourdissement ou de foibleſſe dans les membres, d'Hydropisies, de Catarres suffoquans, feront bien de s'en passer, à moins qu'ils n'y soient forcés par la violence des douleurs. Une attention qu'il faut encore avoir, est de ne le donner jamais lorsque l'Estomac est rempli d'alimens. C'est pourquoi il faut attendre quatre heures après qu'on a mangé quelque chose de solide, & du moins deux heures après un bouillon ; il faudra aussi mettre le même intervalle avant que de donner de nouvelle nourriture.

Que si cependant pour n'avoir pas fait attention aux Remarques ci-dessus, ou par quelque accident, on avoit donné un Narcotique mal-à-propos, ou en trop forte dose, & qu'il produisît des symptômes fâcheux, comme une Léthargie, on y remédie d'abord par la Saignée, & ensuite par l'Emétique, si les forces du Malade sont suffisantes pour suporter ces Remédes : ont fait avaler ensuite jusqu'à

la quantité d'un demi-ſeptier de jus de Citron, ou de fort vinaigre, obſervant de n'en faire prendre que deux ou trois cuillerées à la fois, ou pures, ou mêlées avec de l'eau, & de laiſſer un quart-d'heure de diſtance entre chaque priſe : dans les intervalles il faut agiter & tourmenter le Malade, lui faiſant fleurer ſans ceſſe l'Eſprit volatil de Sel Ammoniac, & lui douchant la tête avec de l'eau fraiche. On doit encore ajouter à ces Remédes des Lavemens acres, des Sternutatoires, & un Véſicatoire à la nuque du col. Tous ces Remédes en ſecouant fortement les fibres nerveuſes, y font aborder les eſprits en plus grande abondance ; ce qui en rétablit le ton & les oſcillations.

Julep contre l'Apopléxie.

Prenez des Eaux de Mélisſe ſimple,
de Chardon-benit,
de chacune deux onces ;
des Eaux de fleurs d'Orange,
de Canelle orgée,
de chacune deux gros ;
du Sel Ammoniac, un demi-gros,
de l'Eſprit volatil de Corne de Cerf,
du *Lilium* de Paracelſe,
de chacun douze gouttes ;
du Syrop d'Oeillet, une once.

Mêlez le tout, pour un Julep à donner à la cuillier, ou en deux doſes, de quatre heures en quatre heures.

Remarque. Ce Julep ſupoſe que l'A-

poplexie eſt ſéreuſe, c'eſt-à-dire, cauſée par une abondance de pituite & de glaires qui inondent le cerveau, car ſi l'Apoplexie étoit ſanguine, il feroit du mal, en augmentant le bouillonnement du ſang; & il faudroit s'en abſtenir. On fera précéder ſon uſage du Lavement purgatif-majeur, & de l'Emétique décrits ci-deſſus (*a*), ſans oublier l'Emplâtre véſicatoire, qui eſt d'un grand ſecours dans cette maladie.

On peut encore employer ce Julep dans la Syncope, & dans toutes les maladies où le pouls eſt petit, concentré, & les extrêmités froides.

Julep anodin contre la Dyſſenterie.

Prenez de l'Eau diſtillée de Lis,
quatre onces;
du Corail rouge préparé,
des Yeux d'Ecreviſſes préparés,
de chacun un ſcrupule;
du *Laudanum* liquide de Sydenham,
douze gouttes;
du Syrop de Guimauve,
une demi-once.

Mêlez le tout pour un Julep à prendre à l'heure du ſommeil.

Remarque. La Diſſenterie eſt un flux de ſang fréquent, accompagné d'une dou-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Lavemens*, pag. 93. *de l'Emétique*, pag. 131 *& ſuiv. & des Emplâtres.*

leur aigue de ventre apelée *Tranchées*, ou Colique. Les douleurs ne donnent de repos ni jour ni nuit : la soif, les nausées & l'inflammation des intestins accompagnent cette maladie ; & la fiévre, quoiqu'obscure dans les premiers tems, s'allume insensiblement d'elle-même. On ressent une vive douleur au Fondement, avec une envie fréquente & importune d'aller à la selle, quoiqu'on n'évacue que très-peu de matiére. Les excrémens sont toujours mêlés d'une matiére grasse ; ils sont quelquefois écumeux, & parsemés de gouttes de sang. Si la maladie continue, les forces manquent, parce que le dégoût & les douleurs sont extrêmes ; alors les intestins s'ulcérent, ou sont attaqués de gangrêne. Dans cet état les selles sont de très-mauvaise odeur, crues, legéres, noirâtres ; & l'on rend par intervalles beaucoup de sang.

La Dyssenterie est fréquente en Automne, à cause des fruits que l'on mange, comme les Prunes, les Melons, &c. qui s'aigrissent facilement dans l'Estomac ; mais celle qui vient d'une semblable cause n'est point maligne, & se guérit aisément : la contagieuse est souvent mortelle, parce que toute la masse du sang se trouve infectée d'un levain corrosif capable d'ulcérer profondément les intestins ; & c'est de cette source que naissent les déjections purulentes, accompagnées de fiévre lente & d'une maigreur excessive, avec enflure des extrêmités, qui conduisent souvent les Malades au tombeau.

Pour traiter méthodiquement la Dyſſenterie, il faut commencer par ſaigner le Malade, s'il y a fiévre, & que les douleurs de ventre ſoient violentes. On lui donnera pendant toute la Maladie la Décoction blanche-aſtringente (*a*) pour boiſſon, & des Lavemens anodins ou de Bouillon de Tripes décrits plus haut, auſquels on joindra le Julep ci-deſſus le ſoir, à l'heure du ſommeil. On le purgera enſuite, lorſque la force des accidens ſera tombée, avec la ſeconde de nos deux Potions purgatives-aſtringentes, réïtérant le Julep le ſoir de la Purgation. Après cela, ſi la maladie perſévére, on fera uſage de notre premier Bol contre la Diſſenterie pendant deux jours, en réduiſant le ſecond jour la Poudre d'*Ipécacuanha* à douze grains. Enfin on terminera le traitement en donnant au Malade, juſqu'à guériſon, le ſoir à l'heure du ſommeil, un grain d'*Ipécacuanha* incorporé dans un gros de *Diaſcordium*, dont on fera un Bol enveloppé de pain à chanter.

Julep pour prévenir l'Avortement.

Prenez des Eaux de Plantin,
de Roſes,
de chacune deux onces ;
de la Terre ſigillée,

(*a*) *Voyez les Chapitres des Décoctions*, pag. 19 *des Lavemens*, pag. 96. *des Potions purgatives*, pag. 119. *& des Bols.*

du Bol d'Arménie,
de chacun un demi-gros ;
du ſuc d'Ortie dépuré, deux onces ;
du Syrop Diacode, une demi-once.

Mêlez le tout pour un Julep à donner à l'heure du ſommeil.

Notez que ſi ce Julep ſe répéte dans le jour, comme cela peut-être néceſſaire, on ſubſtituera au Syrop Diacode ſix gros de Syrop de Coing, ou de Roſes ſéches.

Remarque. Quand un Femme groſſe craint de s'être bleſſée par quelque effort ou autre accident, il eſt à propos qu'elle garde le lit huit ou neuf jours, ou du moins qu'elle évite tous les mouvemens conſidérables ; qu'elle ſe faſſe faire une Saignée du bras, ſi elle n'eſt pas trop foible ; & qu'elle prenne le Julep ci-deſſus pendant quelques jours, juſqu'à ce que les douleurs ſoient ceſſées, en y joignant l'Opiate d'écrite plus bas contre le même accident : que s'il y a perte, elle y joindra la Tiſane aſtringente, le Bol contre le Crachement de Sang, & le Cataplaſme pour prévenir l'Avortement, décrits chacun dans leur lieu (*a*).

Julep pour faire ſortir le Fœtus mort.

Prenez des Eaux de Fleurs d'Orange,
de Chardon-bénit,
de chacune deux onces.

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 42. *des Bols, des Opiates, & des Cataplaſmes.*

des Trochiſques de Myrrhe,
un ſcrupule ;
du Syrop d'Armoiſe,
une demi-once.
Mêlez le tout pour un Julep.

Remarque. Ce Julep excite les purgations des Accouchées, chaſſe le *Placenta* & les Fœtus mort dans la matrice : il peut ſervir également pour faciliter un Accouchement laborieux par la foibleſſe & l'atonie des parties ; mais il faut bien prendre garde ici de ſe tromper : car cette foibleſſe eſt bien plus rare que la trop grande roideur, l'enflure & l'ardeur dans ces mêmes parties ; & qui donneroit ce Julep dans ce dernier cas, feroit beaucoup de mal. Voilà à quoi il faut ſoigneuſement faire attention avant que de le preſcrire ; auſſi voyons-nous ſouvent que les Femmes en travail reçoivent plus de ſoulagement de la Saignée du bras, ou des Fomentations faites avec des Décoctions émollientes & anodines, ou des Lavemens émolliens, que de tous les Remédes fortifians.

§. II. DES LOHOCHS *.

Lohoch commun.

PRenez du Syrop de Guimauve,
de l'Huile d'Amandes douces,
de chacun une once,
du Blanc de Baleine diſſous dans
l'Huile ci-deſſus, un gros.

Mêlez le tout enſemble pour un Lohoch à prendre par cuillerées dans les accès de toux, le laiſſant fondre doucement dans la bouche.

Remarque. Ce Lohoch convient dans la Pleuréſie, la Péripneumonie, l'Aſthme ſec, & dans tous les cas où une humeur âcre & tenue ſe jette ſur les Poumons, & y excite la toux; il adoucit cette humeur & facilite l'expectoration.

Lohoch Anti-Aſthmatique, ou *contre l'Aſthme.*

Prenez du Syrop d'*Erifimum*,
de l'*Ozymel* ſcillitique,
de chacun une once;
Du Blanc de Baleine diſſous dans

* *Le* Lohoch *eſt un Remède liquide, mais d'une conſiſtance plus épaiſe que le Syrop, deſtiné pour la Poitrine, & compoſé de Poudres, d'Huile, de Syrops, & de Mucillages.*

une ſuffiſante quantité d'Huile d'Amandes douces, un gros ;
de la Gomme Ammoniac diſſoute dans du vin, quatre ſcrupules ;
de l'Eau d'Hyſſope, trois onces.

Mêlez le tout pour un Lohoch à prendre à la cuillerée de demi-heure en demi-heure.

Remarque. Ce Lohoch eſt propre pour inciſer & atténuer les phlegmes qui engorgent les Poumons dans les attaques de l'Aſthme humide ; il fait cracher abondamment, lors même que le relâchement & la fluxion formée ſemblent menacer d'un Catarre ſuffoquant : on doit le continuer juſqu'à ce que les crachats ſortent avec facilité. Il faut en même-tems faire uſage de l'Hydromel ſimple décrit ci-deſſus (*a*) ; & lorſque l'accès ſera paſſé, on ſe purgera avec une priſe de la Poudre Anti-Aſthmatique, ou des Pilules Anti-Aſthmatiques décrites dans leur lieu (*b*).

Lohoch dans la péripneumonie, lorſque l'expectoration eſt ſuprimée.

Prenez de l'Huile d'Amandes douces récente, une once & demie ;
du Syrop violat,
du Miel de Narbonne,
de chacun une demi-once ;

(*a*) *Voyez le Chapitre des Hydromels*, p. 59.
(*b*) *Voyez les Chapitres des Poudres*, pag. 172. *& des Pilules.*

le jaune d'un Œuf frais.
Mêlez le tout pour un Lohoch à prendre à la cuilliere juſqu'à ce que les crachats reviennent.

Remarque. Ce Lohoch eſt moins inciſif que le précédent, quoique donné pour la même fin, c'eſt-à-dire, pour rapeler l'expectoration ſuprimée ; mais la Peripneumonie & l'Aſthme humide ſont deux maladies bien différentes. La premiére eſt accompagnée d'inflammation qui demande que l'on adouciſſe, bien loin de donner quelque choſe d'irritant : c'eſt ce que l'on fait par ce Lohoch ci, qui eſt adouciſſant & legerement déterſif, à cauſe du miel qui y entre, & par-là eſt en état de faire couler les crachats ; au lieu que l'Aſthme humide ſupoſant un relâchement dans les Poumons, il eſt néceſſaire de les ſecouer fortement, pour les débarraſſer des phlegmes viſqueux qui les engorgent, & c'eſt ce qu'on obtient par le précédent Lohoch.

Lohoch contre l'Eſquinancie.

Prenez des feuilles d'Aigremoine, deux poignées ;
de celles de Ronce,
de Plantain,
de chacune une poignée ;
une Grenade.
Mettez le tout dans un pot de terre avec trois chopines d'eau que vous réduirez à une chopine par l'ébullition.

Paſſez enſuite la liqueur par un linge, & ajoutez-y aſſez de ſucre pour faire un ſyrop plus épais que le ſyrop ordinaire, dont le Malade prendra une cuillerée de quart-d'heure en quart-d'heure, le laiſſant fondre doucement dans la bouche.

Remarque. L'Eſquinancie eſt une difficulté d'avaler & de reſpirer, cauſée par l'inflammation du *Larinx* & du *Pharinx*; c'eſt-à-dire, par l'inflammation des parties deſtinées à porter l'air dans les Poumons, & les alimens dans l'Eſtomac. Les effets de cette maladie ſont une douleur aigue dans le goſier, cauſée par une tumeur qui gêne la reſpiration au point, que cela va quelquefois juſqu'au dégré de ſuffocation. Il s'y joint une difficulté d'avaler plus ou moins grande, le Malade ne pouvant ſouvent rien prendre, pas même de la boiſſon qui revient par les narines. La fiévre qui ſe met de la partie, eſt vive & continue. Dans cet état le viſage eſt rouge, les yeux ſont étincelans; la langue noircit à la longue, & quelquefois elle s'enfle ſi conſidérablement qu'elle ne peut plus être contenue dans la bouche. L'eſquinancie étant parvenue à ce dégré, jette le Malade dans un péril évident: car le pouls devient petit, concentré, & les extrêmités froides; & le Malade meurt enfin oprimé par la ſyncope qui ſe joint à la ſuffocation.

Pour traiter cette maladie avec méthode, il faut réduire le Malade dès le commencement au régime le plus tenu & le

plus éxact. Sa boiſſon ordinaire doit être notre Tiſane pectorale-adouciſſante (*a*); & ſes bouillons, de l'Eau de Veau ou de Poulet. Il faut le ſaigner copieuſement du pied au moins trois fois le jour les deux premiers jours, en y joignant deux Lavemens par jour, dont à l'alternative l'un ſera ſimple & rafraîchiſſant, & l'autre laxatif. On le purgera le plutôt qu'il ſera poſſible avec deux onces de Manne aiguiſées de deux grains de Tartre émétique, le tout fondu dans un verre de Tiſane; & ſi le Malade a trop de difficulté d'avaler, on prendra trois ou quatre grains de bon Emétique, que l'on fera fondre dans un ſeptier d'Eau chaude, & qu'on lui donnera par cuillerées de quart-d'heure en quart-d'heure. L'Emétique fait des effets ſurprenans dans cette maladie; & tous les bons Médecins lui donnent ici la préférence ſur tout autre Purgatif. Le malade ſe gargariſera le goſier, s'il eſt poſſible, pluſieurs fois le jour avec du Lait de Vache tiéde, ou avec notre Gargariſme rafraîchiſſant (*b*): il fera auſſi uſage du Lohoch ci-deſſus, ou du Lohoch blanc, s'en tenant à ceux de ces Remedes qui feront le mieux. On lui apliquera autour de la gorge le Cataplaſme de mie de Pain & de Lait avec

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 39. *& des Lavemens*, pag. 91. *& 92.*

(*b*) *Voyez les Chapitres des Potions purgatives*, pag. 116. *& ſuiv. des Cataplaſmes & des Gargariſmes.*

un peu de Saffran, ou le Cataplasme contre l'Esquinancie avec le Bec-de-Grue, faisant attention que ce dernier étant astringent & résolutif, ne convient que dans le commencement ou sur la fin, & que celui de mie de Pain & de Lait, convient mieux dans l'état de la maladie. On continuera ce traitement jusqu'à ce que la résolution se fasse, & que les passages deviennent libres, purgeant toujours jusqu'à ce tems deux fois la semaine avec nos Potions purgatives ordinaires.

Tout ce que nous venons de dire jusqu'ici ne regarde que la véritable Esquinancie, causée par l'inflammation du *Larynx* & du *Pharinx*; mais les Médecins en reconnoissent encore une autre qu'ils apellent fausse, ou bâtarde, qui provient de l'inflammation ou gonflemens des Amygdales, & des Parties qui les avoisinent. Cette espece d'Esquinancie se traite de la même maniére que la vraie. Ainsi si les Amygdales sont enflammées, il faut beaucoup saigner, & purger avec notre Eau minérale émétique (*a*), pour détourner par la voye des Intestins les impuretés de l'Estomac, qui causent ou entretiennent l'inflammation. On donne beaucoup de Lavemens, & l'on prescrit pour boisson notre Tisane pectorale adouciſſante, à laquelle on joint le Gargarisme contre

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tisanes*, pag. 39. *des Potions purgatives*, pag. 132. *des Poudres*, pag. 173. *des Cataplasmes*, & *des Gargarismes*.

l'inflammation des Amygdales. Enfin tous les Remédes indiqués ci-deſſus ſont également d'uſage dans ce cas-ci ; mais ſi la maladie n'eſt cauſée que par un ſimple gonflement œdémateux ſans inflammation conſidérable, alors on ſaigne moins, & on aplique ſur la gorge des Topiques réſolutifs, tels que notre Cataplaſme de Bec-de-Gruë, ou celui de nid d'Hyrondelle. On trouvera encore ci-deſſous une Poudre & un Gargariſme, qui conviennent dans cette eſpece d'Eſquinancie ; il faudra en faire uſage.

Lohoch contre l'Hémophthiſie, ou *le Crachement de Sang.*

Prenez de la Gomme Arabique diſſoute dans une ſuffiſante quantité d'Eau de Plantain, un gros ;
du Corail rouge préparé, deux ſcrupules ;
de l'Huile d'Amandes douces récente,
des Syrops de grande Conſoude, de Guimauve, de chacun une once.

Mêlez le tout pour un Lohoch, à prendre d'heure en heure à la cuillier.

Remarque. Ce Lohoch eſt adouciſſant & conſolidant ; il répand au moyen de ſes parties mucilagineuſes, un vernis onctueux ſur l'ouverture des vaiſſeaux déchirés, & en facilite la réunion. Il convient encore lorſque la mucoſité qui en-

duit intérieurement la Gorge, l'Eſtomac & les Inteſtins, a été enlevée; il couvre ces conduits, & les préſerve de l'acrimonie des humeurs, ainſi on doit s'en ſervir dans la Dyſſenterie, le Vomiſſement de ſang, & dans toute Hémorrhagie du conduit inteſtinal.

Il faut accompagner ſon uſage de nos Bouillons & Tiſanes contre le Crachement de ſang décrits ci-deſſus (*a*).

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 44. *& des Bouillons*, pag. 75.

CHAPITRE VIII.

POUDRES, BOLS ET OPIATES.

§. I. DES POUDRES.

Poudre tempérante.

PRENEZ du Nitre purifié, deux gros;
du Tartre vitriolé,
des coquilles d'Huitre préparées, de chacun un gros;
du Cinabre factice, un ſcrupule.

Pulvériſez le tout, & mêlez-le éxactement.

La doſe eſt d'un ſcrupule trois fois le jour pour les Adultes, & de douze grains deux fois le jour pour les Enfans.

Notez qu'on prend pour véhicule de cette Poudre une cuillerée d'Eau, ou de Tiſane.

Remarque. Cette Poudre eſt d'uſage dans deux occaſions principales. 1°. Dans toutes les maladies aiguës, lorſque la poitrine eſt bien conſtituée, & que le Malade ne touſſe pas. Elle tempére l'effervescence du ſang, fait couler les urines, & diſpoſe le ventre à la purgation 2°. Dans toutes les maladie des Enfans avec fiévre, ou ſans fiévre, cauſées par les aigreurs de l'Eſtomac auſquelles ils ſont très-ſujets. On leur en fait prendre pendant quelques jours : on les purge enſuite, & l'on continue l'uſage de ces Poudres, qui les guériſſent en peu de tems.

Poudre abſorbante.

Prenez de la Craïe. *.

* Préparation de la Craïe.

On prendra de la Craïe, telle quantité qu'on voudra ; on la pulvériſera dans un mortier, & l'ayant miſe dans une terrine, on verſera deſſus de l'Eau commune. On agitera la matiére avec un biſtortier, & on la verſera doucement dans un autre vaiſſeau ; afin que le plus pur & le plus ſubtil de la Poudre coule avec l'eau ; on continuera à laver & à agiter la matiére, & à verſer dans l'autre vaiſſeau, juſqu'à ce qu'il ne reſte au fond que du ſable, ou autre impureté groſſiere qu'on rejettera : on verſera enſuite toute la matiére dans un entonnoir garni de papier gris, afin que l'eau s'en ſépare ; & l'on fera ſécher la Craïe au ſoleil pour la conſerver pour l'uſage.

des Yeux d'Ecreviſſes,
des Coquilles d'Huitres *, le tout préparé, de chacun un gros;
de la Noix muſcade, un demi-gros.

Pulvériſez-le tout, & mêlez-le exactement pour prendre à la doſe d'un ſcrupule deux heures après le diner, & autant après le ſouper.

Notez qu'on peut faire une Opiate de ces Poudres, en les incorporant avec le Syrop de Roſes ſéches.

Remarque. Cette Poudre eſt propre pour abſorber & pour détruire les aigres de l'Eſtomac, elle arrête auſſi le vomiſſement, les Cours de ventre, & facilite la digeſtion du Lait; qui dans certains Eſtomacs s'aigrit facilement. Elle n'eſt pas d'un moindre ſecours dans la toux violente qui eſt produite par une pituite âcre: elle adoucit cette pituite, & en arrête par ſes parties fines le bouillonne-

* Préparation des Coquilles d'Huitres.

Prenez de cette partie de la Coquille d'Huître qui eſt creuſe, en jettant l'autre moitié qui eſt plate, telle quantité qu'il vous plaira; lavez-la bien des ordures exterieures, & faites-la ſécher pendant quelques jours au ſoleil; étant bien ſéche, pilez-la dans un mortier de marbre; elle ſe mettra en bouillie; expoſez-la de nouveau au ſoleil pour la ſecher, puis achevez de la piler; paſſez-la poudre par un tamis fin, & gardez-la dans un endroit ſec pour l'uſage.

ment ; mais il en faut ceſſer l'uſage, lorſqu'on ne ſe ſent plus d'aigreurs, parce que cette Poudre peut s'attacher aux plis de la membrane intérieure de l'Eſtomac, & cauſer un ſentiment de peſanteur incommode ; ce qu'on évitera en en faiſant un uſage modéré.

Poudre contre l'Epilepſie.

Prenez des Poudres de racines
de Velériane ſauvage,
de Pivoine mâle,
de chacune une demi-once.
Melez-les éxactement.

La doſe eſt depuis un demi-gros juſqu'à un gros & demi, ſuivant l'âge, dans deux cuillerées de Vin blanc, & pour les Enfans dans une cuillerée de Lait.

Remarque. L'Epilepſie a des ſymptômes aſſez ſenſibles pour ſe faire connoître des moins ſçavans. La perſonne qui en eſt attaquée tombe de tems en tems privée de ſentiment & de connoiſſance, avec des agitations & des convulſions violentes : elle a le viſage rouge, & les yeux tournés ; le pouls & la reſpiration ſont quelquefois inſenſibles : elle rend de l'écume par la bouche ; & ſe tournant par terre avec des tremblemens de membres, elle laiſſe ſouvent aller involontairement l'urine avec les excrémens. Ces ſymptômes cependant ne ſont pas ſi univerſels, qu'on ne voye quelquefois des Epileptiques dans leur accès ſans perdre connoiſſance :

il y en a même qui pleurent, qui rient, & qui tiennent des poſtures & font des contes ridicules. Tous ces ſymptômes venant à s'arrêter, le Malade demeure ſans mouvement, comme ſtupide & hébêté ; & les accès ſont plus ou moins longs & plus ou moins violens, ſelon que la cauſe du mal eſt plus ou moins forte, ou plus ou moins invétérée.

Cette maladie eſt des plus fâcheuſes, & d'autant plus, que ſes accès plus longs & plus fréquens donnent moins de relâche au Malade, & ont des intervalles plus courts. Elle eſt ordinairement très-longue, & accompagne ſouvent juſqu'à la mort, ſans accourcir ſenſiblement la vie, comme on le remarque dans des Vieillards qui en ſont attaqués depuis long-tems ; mais dans ſa naiſſance, elle tue quelquefois par de fréquens & de fâcheux accès.

De quelque cauſe que viennent l'Epilepſie, elle eſt plus ordinaire aux Hommes qu'aux Femmes, & attaque plutôt les Enfans, même les plus nouvellement nés, que les perſonnes plus avancées en âge, & plus rarement encore les Vieillards. Rien ne guérit mieux les Enfans de cette maladie, que le cours des années : les jeunes Filles en ſont ordinairement délivrées ſi-tôt qu'elles deviennent réglées, & les Garçons à l'âge de puberté ; mais quand on a paſſé vingt-cinq ans, on n'en guérit que trés-rarement, ou même jamais, ſur-tout ſi l'on vient de Parens épileptiques.

Cette maladie a deux tems pour ſa curation,

tion, l'un pendant l'accès, & l'autre hors de l'accès. Dans l'accès on ne doit employer aucun Remede, parce qu'il ceſſe de lui-même, à moins qu'il ne ſoit trop long ou trop violent, ou que les accès ne ſoient ſi fréquens, qu'il y ait danger qu'ils ne tournent en Apoplexie. Il faut alors employer les mêmes Remedes que nous avons propoſés ci-deſſus pour la cure de l'Apoplexie ſanguine, parce que cette derniére Maladie peut être prévenue & détournée par les Remedes avec leſquels on a coutume de la guérir. Ainſi on ſaignera du bras & du pied, on donnera des Lavemens purgatifs, & on fera vomir avec l'Emétique, ſelon qu'il eſt marqué dans l'Article de l'Apoplexie. L'accès terminé, il faut empêcher, s'il ſe peut, la récidive, & pour cela on examinera d'abord ſi le Sujet que l'on a à traiter a moins de quinze ans, ou s'il eſt d'un âge plus avancé, parce qu'il ne faut pas s'opiniâtrer à faire beaucoup de Remedes aux Enfans au-deſſous de cet âge. On doit ſe contenter de les ſaigner du bras, & quelques jours après du pied, ſuivant leur force; on les purge enſuite deux fois, en mettant quelque intervalle, comme de quinze jours, entre les deux Purgations: on peut même le faire la premiére fois avec deux ou trois gros de Syrop royal-émétique étendus dans un gobelet d'Eau tiéde. On leur donne enſuite la Poudre ci-deſſus trois jours de ſuite chaque mois, la réïterant pendant ſix mois, après quoi ſi la maladie eſt rebelle à ces premiers Remedes, il faut ab-

ſolument ceſſer d'en donner, & attendre l'âge de puberté, qui, comme nous venons de le dire, eſt ſouvent une époque où la Nature guérit cette maladie ſans aucun ſecours, à moins qu'il ne ſoit à propos d'aider les jeunes Filles dans leurs évacuations menſtruelles; & alors on ajoutera une demi-once de Saffran de Mars apéritif à la totalité de la Poudre ci-deſſus, ou bien on leur donnera les Remedes que nous avons preſcrits plus haut contre les Pâles-couleurs.

Mais ſi le ſujet épileptique eſt une Fille qui paſſe l'âge de quinze ans, on s'informera ſi elle eſt réglée, ou ſi elle ne l'eſt pas; & dans ce dernier cas, il faudra lui donner les Remedes que nous avons détaillés plus haut dans l'Article des Pâles couleurs; & après ces Remedes faits, & les ſecours établis comme il faut, ſi l'Epilepſie ne ceſſe pas, on ſaignera la Malade du pied: on la purgera enſuite avec une de nos Potions purgatives ordinaires (*a*), & on la mettra à l'uſage de la Poudre ci-deſſus, qu'elle prendra pendant un an, trois jours de ſuite chaque mois, réïtérant la Purgation de deux en deux mois. Après ce tems, ſi elle n'eſt pas entiérement guérie, elle paſſera à l'uſage de notre Opiate anti-épileptique, s'y préparant par la Saignée du pied & la Purgation, comme il eſt ſpécifié dans la Remarque. Que ſi c'eſt un Garçon épilep-

(*a*) *Voyez les Chapitres des Potions purgatives*, pag. 116. & ſuiv. *& des Opiates.*

tique de dix-huit ans & au-deſſus que l'on ait à traiter, on lui fera les même Remédes, excepté ceux qui regardent les Pâles-couleurs.

Poudre contre les Convulſions des Enfans.

Prenez des fleurs de Millepertuis, telle quantité qu'il vous plaira.

Faites-les ſécher à l'ombre, & réduiſez-les en poudre ſubtile.

La doſe eſt de dix à quinze grains, deux fois le jour dans de la bouillie.

Remarque. On doit ſe ſervir dans l'accès des Convulſions, de la Potion contre les Convulſions des Enfans, que nous avons décrite ci-deſſus *(a)*; & lorſque l'accès ſera paſſé, on employera cette Poudre pour empêcher la récidive.

Poudre contre le Rachitis, *& l'Atrophie des enfans.*

Prenez de la Poudre de feuilles de Lierre en arbre, ou grimpant, depuis un demi-gros, juſqu'à deux ſcrupules.

Mettez infuſer cette Poudre dans une taſſe de Thé ou de Capillaire, ou dans un petit Bouillon, pour prendre pendant neuf jours le matin à jeun au décours de la Lune; ce qui ſe réïtérera trois mois de ſuite.

(a) Voyez le Chapitre des Potions, pag. 116.

Remarque. On joindra à cette Poudre le Liniment contre le *Rachitis* décrit ci-dessous ; & on purgera chaque fois avant que de commencer le Remede.

Et si l'Enfant a le ventre dur, & tendu, mais sans douleur, on fera le Liniment sur tout le bas-ventre, y faisant auparavant quelques frictions séches avec un linge un peu rude.

Poudre Anti-Asthmatique, ou *contre l'Asthme.*

Prenez de la Craye préparée,
une once ;
des Trochisques *Alhandal*,
& du Cinabre factice,
de chacun un gros.

Pulvérisez le tout, & mêlez-le exactement.

La dose est d'un demi-gros, à prendre le matin à jeun, en y ajoutant un gros d'*Arcanum duplicatum.*

Remarque. Cette Poudre est purgative ; elle évacue abondamment les humeurs épaisses & visqueuses, & sur-tout la Pituite, qui se jettant sur les Poumons, y cause les accès de l'Asthme humide. Elle convient encore dans les Migraines invétérées, dans le Vertige venant des mauvaises digestions, dans la Goutte froide, les douleurs de la Sciatique & dans l'Hydropisie. On la prend le matin à jeun dans un gobelet de Tisane tiéde, ou de Bouil-

lon, en y joignant le gros d'*Arcanum duplicatum* ; deux heures après on avale un Bouillon, & on obſerve le reſte du jour le même régime que lorſqu'on a pris Médecine. On doit avoir ſoin d'en répéter l'uſage de tems en tems.

Poudre contre l'Eſquinancie.

Prenez du Criſtal minéral,
une demi-once ;
du Poivre blanc, un gros ;
du Sucre blanc, dix gros.

Faites du tout une Poudre, dont le Malade prendra à la pointe du couteau, la laiſſant fondre doucement dans ſa bouche, & la rejettant à meſure ; ce qu'il répétera ſouvent dans le jour.

Remarque. On doit tenir cette Poudre dans la bouche, juſqu'à ce que la ſalive vienne en abondance ; alors il faut la cracher, & le Malade doit réïtérer la même choſe de quart-d'heure en quart-d'heure : on ne ſçauroit croire quelle quantité de ſalive s'échape par ce moyen ; ce qui dégorge les Amygdales & toutes les glandes de la bouche, & par-là procure beaucoup de ſoulagement au Malade.

Poudre ſternutatoire dans l'Apoplexie.

Prenez de la Poudre d'Ellébore blanc,
douze grains.
de celle d'Euphorbe,
cinq grains.

Mêlez le tout enſemble, & ſoufflez-en dans le nez du Malade avec un tuyau de plume.

Autre Poudre ſternutatoire dans le même cas.

Prenez des feuilles ſéches
de Bétoine,
de Marjolaine,
de Fleurs de Muguet,
de chacune un gros.
Pulvériſez-les, & les mêlez exactement.
L'uſage comme ci-deſſus.

Remarque. Ces deux Poudres excitent l'éternuement, & ſont très-propres à réveiller les Apoplectiques & les Léthargiques; mais comme la premiére cauſe beaucoup d'irritation, il faut s'en abſtenir, ſi l'Apoplexie eſt ſanguine, & que les membranes ſoient menacées d'inflammation. Le plus ſûr ſera donc de commencer par la ſeconde, & de paſſer à l'autre ſi elle ne fait pas d'effet.

Poudre contre la Pituite viſqueuſe du cerveau, & les Maux de tête invétérés.

Prenez de la Poudre de feuilles ſéches de Cabaret, une demi-once;
du Sel Ammoniac pulvériſé,
un demi-gros.
Mêlez le tout enſemble, pour une Poudre dont on prendra la quantité de quatre ou cinq grains en guiſe de tabac, le ſoir

en ſe couchant, en continuant pendant quelques jours.

Remarque. Cette Poudre eſt un excellent Reméde contre pluſieurs maladies de la tête : car elle purge le cerveau, en irritant les fibres nerveuſes, dont les extrêmités s'étendent ſur la tunique intérieure des Narines. Les nerfs & les membranes du cerveau ébranlés & ſecoués par cette irritation, chaſſent les humeurs viſqueuſes qui rempliſſant les glandes ou les ſinus de ce viſcére, & les font deſcendre par les vaiſſeaux ſanguins dans les glandes des narines, du goſier, & des parties voiſines, ſous la forme d'eau, de mucoſité, & de pituite viſqueuſe, que l'on rejette à ſon réveil. C'eſt donc avec raiſon qu'on la preſcrit contre les maladies longues & opiniâtres de la tête, qui viennent d'une matiére tenace, comme la Peſanteur de tête, les Migraines invétérées, la Paralyſie de la langue & du goſier, & des Fluxions des yeux qui ne ſont pas accompagnées de beaucoup de douleur & de rougeur : elle procure dans tous ces cas un ſoulagement conſidérable ; mais il faut s'abſtenir de ſon uſage lorſqu'il y a inflammation, ou qu'on en eſt menacé ; dans les écoulemens du cerveau accompagnés de fiévre, dans les inflammations des yeux, dans les ulcéres des narines, dans l'hémorragie du nez, dans les vertiges & dans la groſſeſſe : car il ſeroit à craindre que dans ces maladies, l'irritation qu'elle cauſeroit aux membranes du cerveau n'occaſionnât quelque ac-

cident fâcheux, auquel il seroit difficile de remédier.

Poudre Ophthalmique contre la foiblesse de la Vûe.

Prenez de l'Euphraise, une demi-once;
des semences de Fenouil doux, deux gros;
du Massis, un scrupule;
du Sucre candi, une demi-once.

Réduisez le tout en poudre fine, & mêlez-le exactement.

La dose est d'un gros dans un petit verre de Vin, à prendre le soir avant que de se coucher, en continuant pendant quelque-tems.

Remarque. Cette Poudre divise les humeurs épaisses & gluantes, & sur-tout celles qui sont épaisses dans le cerveau; ce qui les rend plus propres à la circulation: elle est aussi un peu astringente, & elle affermit & rétablit le ton des fibres relâchées dans les glandes de ce viscére; c'est pourquoi elle est très-propre à fortifier la Vûe. Il faut cependant observer, qu'elle ne convient qu'aux personnes d'un tempérament phlegmatique, & dont la foiblesse & l'obscurcissement de Vûe ne viennent que d'une Pituite froide & visqueuse, qui se dépose sur cet organe: car elle nuiroit beaucoup à ceux qui sont d'un tempérament sec & échauffé.

On doit accompagner son usage du Collyre contre la foiblesse de la Vûe décrit ci-dessous (*a*).

Poudre Æthiopique contre les Dartres, Galles, & autres maladies de la Peau.

Prenez de l'Antimoine crû,
une demi-once ;
de l'Æthiops minéral,
deux gros.

Réduisez le tout en poudre fine, & mêlez-le éxactement.

La dose est d'un demi-gros deux fois le jour pour les Adultes, & de quinze à vingt grains deux fois le jour pour les Enfans, envelopés dans du pain à chanter ; ou bien on peut en faire un Bol, en l'incorporant avec un peu de Miel, ou de Syrop.

On aura soin d'avaler immédiatement par-dessus une prise de notre Bouillon contre les maladies de la Peau, le joignant à l'usage de cette Poudre, ou bien la Tisane de Patience sauvage que nous avons décrite ci-dessus (*b*).

Remarque. Cette Poudre est un Remede des plus sûrs contre les maladies de la Peau ; elle dissout & atténue la lymphe visqueuse qui, arrêtée dans les tégumens, y produit par son âcreté la Galle, les Dartres, & les autres vices cutanés. On la

(*a*) *Voyez le Chapitre des Collyres.*
(*b*) *Voyez les Chapitres des Tisanes*, pag. 42. *& des Bouillons*, pag. 73.

donne encore avec ſuccès contre les Humeurs froides, les Rhumatiſmes, & les abſtructions du Mézentére provenantes de l'épaiſſiſſement de la lymphe, & qui ne ſont pas accompagnées de fiévre & de chaleur ; mais il faut ſe purger de tems en tems pendant ſon uſage, & la continuer au moins pendant quinze jours, pour la reprendre après quelque intervalle de repos.

Poudre contre la Jauniſſe & le défaut des Régles.

Prenez du Saffran de Mars apéritif, une once ;
des yeux d'Ecreviſſes préparés,
des coquilles d'Huître préparées, de chacun trois gros ;
de la Canelle, un gros & demi.

Réduiſez le tout en poudre, & mêlez-le exactement.

La doſe eſt d'un gros le matin à jeun dans du pain à chanter, ou dans un petit verre de vin ou d'eau, en continuant pendant quinze jours, ayant ſoin de manger un potage à dîner, & un à ſouper pendant ſon uſage. On fera auſſi précéder la Saignée & la Purgation, ou au moins cette derniére, ſi la Malade eſt foible ; & il faudra qu'elle faſſe le plus d'exercice qu'il lui ſera poſſible.

Poudre contre les Fleurs Blanches.

Prenez des feuilles de Menthe,

de Véronique mâle,
des ſommités d'Ortie blanche
ſéchées à l'ombre,
du Corail rouge préparé,
des ſemences d'*Agnus caſtus*,
du Karabé,
de chacun deux gros.

Pulvériſez le tout, & mêlez-le exactement.

La doſe eſt d'un gros le matin à jeun pendant neuf jours, en buvant immédiatement par-deſſus deux taſſes d'une legere Infuſion de feuilles de Véronique mâle, ou de Romarin.

Poudre contre les Nauſées & Vomiſſemens des Femmes groſſes.

Prenez de la Noix muſcade,
deux gros;
de la Canelle, un gros;
des clous de Gérofle,
douze grains;
du Sucre blanc,
une demi-once.

Réduiſez le tout en poudre, pour prendre à la doſe d'un gros après le repas, dans un peu de bon Vin rouge, en continuant pendant quelque-tems.

Poudre contre les Flatuoſités de l'Eſtomac.

Prenez de la Poudre ſéche d'écorce d'Oranges amères, un ſcrupule.
Mêlez-la dans un petit verre de Vin

rouge, pour prendre après le repas, en continuant pendant quelque-tems.

Poudre purgative universelle.

Prenez du Séné mondé,
de la Rhubarbe,
de chacun une demi-once;
du Jalap, un gros;
du Diagrede, deux scrupules,
de l'Antimoine diaphorétique non lavé, deux gros;
de la crême de Tartre,
une demi-once;
de la semence d'Anis,
un demi-gros.

Réduisez le tout en poudre fine, & mêlez-le éxactement.

Gardez cette Poudre pour l'usage.

La dose est d'un demi-gros à un gros, incorporé avec quelque Electuaire, ou Syrop purgatif, pour prendre le matin à jeun, envelopé dans du pain à chanter, avalant immédiatement par-dessus un petit Gobelet de Tisane chaude, ou un peu de Bouillon, pour détremper le Bol dans l'Estomac.

§. II. DES BOLS *.

Bol Purgatif.

PRenez du Lénitif fin, deux gros ;
de la Poudre Cornachine,
de celle de Jalap,
de chacune dix-huit grains.

Faites du tout quelques Bols avec un peu de Syrop de fleurs de Pêcher, pour prendre le matin à jeun, envelopés dans du pain à chanter.

Remarque. Ce Bol se donne à ceux qui ne veulent point prendre de Potions, ou qui ne peuvent les retenir : car il est toujours mieux de se purger avec du liquide ; le Reméde s'en distribue plus facilement, & échauffe moins, & c'est la raison pour laquelle on conseille d'avaler immédiatement sur quelque Bol que ce soit un gobelet de Tisane, ou de Thé, ou de quelqu'autre liqueur apropriée à la maladie, afin de délayer le Bol dans l'Estomac, & de le faire passer plus legérement.

* *Le* Bol *est un Médicament de consistance un peu plus épaisse que le Miel, ainsi apelé parce qu'on l'avale comme une bouchée. On le compose ordinairement d'Electuaires, de Pulpes, de Conserves, & de Poudres, que l'on incorpore avec un peu de Syrop, réduisant le tout en une telle consistance, qu'il se puisse avaler sans mâcher.*

Bol contre la Dyſſenterie.

Prenez de la Poudre d'*Ipécacuanha*, un ſcrupule ;
de la Thériaque,
du *Diaſcordium*,
de chacun quinze grains.

Incorporez le tout avec une ſuffiſante quantité de Syrop de Coing, pour partager en quatre doſes, à prendre chacune de quatre heures en quatre heures.

Autre Bol contre la Diſſenterie, & les Pertes habituelles invétérées.

Prenez du verre d'Antimoine préparé avec la cire, ſix grains.

Incorporez-les avec un peu de Conſerve liquide de Roſes rouges, pour former un petit Bol, à prendre le matin à jeun dans du pain à chanter ; ce que l'on continuera juſqu'à guériſon, en laiſſant toujours un jour d'intervalle entre chaque priſe, & donnant le jour qu'on a pris ce Reméde, un Calmant à l'heure du ſommeil.

Remarque. Ce Reméde, dont nous avons réïtéré les expériences d'après celles d'une Société de ſçavans Médecins, eſt auſſi ſûr contre la Dyſſenterie, que l'*Ipécacuanha* ; il ne laiſſe pas même après lui un caractére d'aſtriction, dont ſe plaignent quelquefois ceux qui ont uſé de ce dernier Reméde : enfin, nous nous en ſervons de-

puis pluſieurs années, ſans en avoir jamais remarqué de mauvais effets.

On doit pour les Enfans ſe contenter de deux grains, & l'on peut monter juſqu'à huit pour les Adultes; mais la doſe de ſix grains nous a preſque toujours ſuffi, & les Malades ont guéri en quatre ou cinq priſes au plus.

Ce Reméde fait rarement vomir : il purge quelquefois aſſez vigoureuſement, mais ſans mauvaiſes ſuites ; & quelquefois il ne produit point d'évacuation ſenſible. Il eſt auſſi ſûr contre les Pertes habituelles des Femmes, même les plus invétérées, que contre la Dyſſenterie ; & nous avons guéri la plûpart de celles à qui nous l'avons donné.

Avant de commencer l'uſage de ce Bol dans les Dyſſenteries, il eſt bon d'y préparer le Malade pendant deux jours avec des Tiſanes adouciſſantes, & des Lavemens de même genre, & même par une ou deux ſaignées, ſi la fiévre & les douleurs ſont vives Après quoi on le donne comme il eſt dit ci-deſſus, ou incorporé avec un peu de Syrop de Coing, ou de Guimauve, obſervant le régime des maladies aigues, c'eſt-à-dire, réduiſant le Malade à la Tiſane & aux Bouillons.

Il faut toujours laiſſer un jour d'intervalle entre chaque priſe du Reméde, afin de ne pas trop fatiguer le Malade par des évacuations abondantes & réïtérées, & ne pas manquer de donner notre Julep anodyn contre la Dyſſenterie décrit ci-deſ-

fus (*a*), le soir du jour qu'on l'aura pris.

Bol contre les Hydropisies naissantes, & les Enflures qui viennent à la suite des longues maladies & des Fièvres.

Prenez de l'Eau-de-vie,
une bonne cuillerée ;
du Miel de Narbonne,
trois cuillerées ;
de la Crême de Tartre,
deux gros.

Mêlez bien le tout, & partagez-le en quatre prises pour un Adulte, & en six prises pour un Enfant. On prend une de ces prises de deux jours l'un, le matin à jeun, & l'on est trois heures sans boire ni manger.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Juleps*, pag. 152.

Préparation du Remede.

Prenez du verre d'Antimoine réduit en poudre subtile, une once ;
de la Cire jaune, quatre scrupules.
Faites fondre la Cire dans une cuillier de fer. Ensuite ajoutez-y la Poudre. Tenez la cuillier sur un feu doux sans flamme l'espace d'une demi-heure, en remuant sans discontinuer avec une spatule de fer. Otez ensuite la matière du feu, & versez-la sur un papier blanc. Pulvérisez-la, & gardez-la pour l'usage.

Il faut que la couleur de cette préparation, pour être bienfaite, soit à peu près comme celle du Tabac.

Il faut en prendre dix à douze priſes, & ſe purger en commençant.

Remarque. Rien n'eſt ſi commun parmi les Pauvres, & ſur-tout parmi leurs Enfans, que de les voir tomber à la ſuite de grandes maladies dans des Cachexies, ou mauvaiſes diſpoſitions d'humeurs, accompagnées de bouffiſſures & de duretés de bas-ventre; ce qui provient ordinairement du mauvais régime qu'ils obſervent pendant leur convaleſcence, ſe nourriſſant trop-tôt d'alimens ſolides & groſſiers, & en prenant plus que l'Eſtomac n'en peut digérer. Il eſt donc néceſſaire pour éviter ces états fâcheux, de les raprocher le plus qu'il ſera poſſible du régime éxact que nous allons propoſer. Ce ſera une régle à laquelle ils auront de la peine à s'aſſujettir; mais en y tenant la main de ſon mieux, on ſauvera toujours les plus raiſonnables.

Il faut, 1°. ne donner jamais à manger aux Malades que la fiévre ne ſoit abſolument ceſſée, ſi ce n'eſt qu'elle durât trop long-tems, comme trente à quarante jours, & qu'ils ſe trouvaſſent fort affoiblis. Alors on leur donne quelques tranches de pain dans le bouillon, ſans mitonner. Mais dès que la fiévre les a quittés, & qu'ils ont été purgés une fois, on leur donne le premier jour que l'on commence à les faire manger, une ſoupe le matin, & rien le ſoir que du bouillon; le lendemain on leur en donne une le matin & une autre le ſoir; le troiſiéme jour, une ſoupe le matin, une pomme cuite l'après-dînée, ou un petit biſcuit, &

une autre soupe le soir ; le quatriéme jour, on ajoute à la soupe du matin un peu de viande bien cuite, que le Malade a soin de bien mâcher, & l'on donne un œuf à la coque, ou un biscuit, ou une tranche de pain & des confitures dans l'après-dînée : on colore aussi l'eau avec un peu de vin, que l'on retranche s'il vient à s'aigrir sur l'Estomac ; le cinquiéme jour, on donne un peu de viande matin & soir ; le sixiéme, on commence à manger du rôti à dîner, & ainsi l'on augmente tous les jours peu-à-peu, ayant soin de retrancher de la nourriture, dès que le Malade se trouve l'Estomac chargé, & d'entremêler ce régime de quelques Purgations. Par ce moyen, l'Estomac qui ne sera point surchargé, se rétablira facilement, & les digestions se perfectionnant, il ne se fera aucun amas de mauvais sucs capables de former des rechûtes ou de nouvelles maladies. Que si cependant pour n'avoir pas pris ces précautions, le Malade devient jaune, bouffi, avec un ventre dur & tendu, il faudra le mettre à un régime de vivre éxact, lui faire user des Bouillons apéritifs (*a*), le purger doucement & souvent, & enfin lui fortifier l'Estomac par le Reméde ci-dessus, pour passer ensuite à l'usage du Vin d'Absinthe, qu'il continuera pendant quelque-tems.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Bouillons*, pag. 69. & suiv.

Bol contre le crachement de Sang, & autres Hémorragies.

Prenez du Sang-dragon,
du Corail rouge préparé,
de la Terre ſigillée,
de l'Alun purifié,
de chacun un gros.

Pulvériſez le tout, & incorporez-le dans une ſuffiſante quantité de Conſerve de Roſes rouges, pour partager en huit Bols, à donner chacun de quatre heures en quatre heures.

Remarque. Ce Bol convient à toutes les Hémorragies en général, tant internes qu'externes. On peut donc s'en ſervir utilement dans l'écoulement du ſang, cauſé par l'ouverture de quelque vaiſſeau dans les premiéres voies ; dans le Saignement du nez, dans les Crachemens & Vomiſſemens de ſang, dans le Flux des urines ſanglantes & des Hémorroïdes ; dans toutes les Pertes de ſang qui arrivent aux Femmes, en quelque-tems qu'elles leur ſurviennent, pendant leur groſſeſſe & après l'accouchement. Il faut ſeulement prendre garde d'arrêter trop-tôt & imprudemment ces Flux de ſang, qui quelquefois ſont critiques, & fourniſſent à la Nature une voie pour ſe décharger d'un ſang trop abondant : c'eſt pourquoi il faut ſaigner ſuivant le beſoin avant de donner ce Reméde, & commencer le traitement par l'uſage des Tiſanes, Potions & Bouil-

lons indiqués ci-dessus contre les Hémorragies (a). On passe ensuite à ce Bol, si l'accident continue, ayant soin de tenir le ventre libre par des Lavemens. afin que la circulation n'y soit pas gênée, & que le sang, par cette raison, ne se porte pas plus abondamment du côté des vaisseaux ouverts.

On observera encore, de ne jamais l'employer dans les Hémorragies accompagnées de Fiévres violentes.

Bol contre la Galle.

Prenez des Fleurs de Souffre,
douze grains ;
du Mercure doux sublimé six fois,
six grains ;
de la Confection *Hamech*,
deux gros.

Incorporez le tout avec une suffisante quantité de Syrop de Fumeterre, pour un Bol, à prendre le matin à jeun dans du pain à chanter.

Remarque. Pour traiter la Galle avec méthode, & la guérir sans retour, il faut commencer par saigner le Malade, le purger le lendemain, & lui faire user pendant tout le traitement de notre Tisane de Patience, d'écrite ci-dessus (b): on le frottera

(a) *Voyez les Chapitres des Tisanes*, pag. 44. *des Bouillons*, pag. 73. *& des Potions*, pag. 113.
(b) *Voyez les Chapitres des Tisanes*, pag. 42. *& des Onguens.*

le lendemain de la purgation avec notre Onguent contre la Galle, lui donnant chaque jour le matin à jeun le Bol que nous venons de décrire, & finiſſant la cure par une ſeconde purgation.

Bol fortifiant & calmant.

Prenez de la Conſerve liquide de Roſes rouges, un demi-gros ;
de la Confection d'Hyacinthe,
de la Thériaque,
de chacune un ſcrupule ;
du *Laudanum* ſolide,
un demi-grain ;
ou du *Laudanum* liquide de Sydenham,
dix ou douze gouttes.
Mêlez le tout, pour un Bol, à prendre à l'heure du ſommeil dans du pain à chanter.

Remarque. Il arrive ſouvent que l'on ſe trouve fatigué le ſoir d'une Purgation, ſoit par la foibleſſe naturelle, ſoit par la quantité d'évacuations que la Médecine a occaſionnées: dans ces deux cas le Bol ci-deſſus produit toujours un bon effet ; il fortifie ſans échauffer, & le calme qu'il fait naître, modére ſur le champ des évacuations qu'un Purgatif quelquefois trop fort entretiendroit pendant pluſieurs jours.

Bol ſtomachique.

Prenez de la Conſerve d'Abſinthe,
ou d'*Enula campana*,
une demi-once ;

de l'Opiate de Salomon,
& de l'extrait de Genièvre,
de chacun deux gros

Mêlez le tout, pour prendre de la grosseur d'une Noix Muscade après le repas, dans du pain à chanter.

Remarque. Ce Bol est un Remède des plus souverains contre la foiblesse d'Estomac, & pour en rétablir les fonctions. On en continue l'usage tant que l'on sent en avoir besoin, & s'il n'échauffe pas, on peut le prendre deux fois le jour, à dîner & à souper; mais il supose que le Malade a été purgé, & qu'il n'est plus question que de fortifier l'Estomac.

Bol contre la Gangréne.

Prenez du Quinquina pulvérisé,
un gros & demi.

Incorporez-le avec une suffisante quantité de Syrop d'Oeillet, & partagez le tout en trois doses, à donner dans la journée, de quatre heures en quatre heures; ce que l'on répétera suivant le besoin.

On aura soin en même-tems de frotter deux ou trois fois le jour la partie gangrénée d'Huile de Térébenthine, ou de se servir de la Fomentation contre la Gangréne, décrit ci-dessous (*a*).

Remarque. La propriété de guérir les Fiévres intermittentes, n'est pas la seule

(*a*) *Voyez le Chapitre des Fomentations.*

qui réſide dans le Quinquina ; il a encore celle d'arrêter les progrès de la Gangréne, & de rétablir dans la partie gangrénée une ſupuration ſalutaire ; les expériences qu'on en a faites en Angleterre depuis pluſieurs années, ſuivies d'un heureux ſuccès, nous engagent à exciter les Perſonnes charitables qui s'attachent à la Chirurgie des Pauvres, à tenter les mêmes épreuves. Il eſt fâcheux de ne ſçavoir encore que couper pour arrêter un mal ſi funeſte, encore ſouvent ne l'arrête-t-on point. Nous avons vû pluſieurs fois avec douleur des amputations continuées pendant pluſieurs ſemaines, ne ſe terminer que par la mort du Malade : il eſt donc à ſouhaiter qu'il ſe trouve quelque Remède que l'on puiſſe ſubſtituer à des opérations auſſi cruelles. Le Quinquina ſe preſente, apuyé d'un grand nombre d'expériences qui parlent en ſa faveur : pourquoi héſiteroit-on de le mettre en uſage ? Il n'y auroit que l'aſſerviſſement à d'anciennes routines, (écueil trop ordinaire à la perfection des Arts,) qui pourroit le faire négliger.

Bol purgatif & Anti-Aſthmatique,
ou *contre l'Aſthme.*

Prenez du Souffre lavé, dix-huit grains ;
du Diagréde, ſix grains ;
du Kermès minéral, un grain.

Incorporez le tout avec un peu de Syrop de Chicorée compoſé de Rhubarbe, pour former un Bol, à prendre pendant trois

jours de suite, le matin à jeun, enveloppé de pain à chanter, & buvant par-dessus une tasse de Thé, ou de Capillaire.

Autre Bol Anti-Asthmatique, pour prévenir l'Hydropisie de Poitrine.

Prenez de la Poudre préparée d'Oignon de Scille,
depuis huit jusqu'à douze grains ;
de la Confection d'Hyacinthe,
douze grains.

Incorporez le tout avec un peu d'*Oxymel* scillitique, pour former un Bol, à prendre pendant dix ou douze jours, le matin à jeun, dans les paroxysmes d'Asthme, & les grandes oppressions de Poitrine qui menacent d'Hydropisie.

Remarque. Les deux Bols ci-dessus sont utiles, tant dans les accès de l'Asthme humide, que pour prévenir l'Hydropisie de poitrine : ainsi on doit les joindre dans le même traitement. On commencera par le premier ; & après les trois jours de son usage, on passera au second, qui sera continué pendant neuf jours ; après quoi on se reposera pour les recommencer dans le besoin, & lorsque l'oppression se fera ressentir. Si le Malade ne tousse pas, on ajoutera au second Bol douze grains de Nitre purifié pour le rendre plus diurétique ; mais pour peu qu'il tousse, il faudra s'en passer. Nous avons vu plusieurs fois de très-bons effets de ces deux Bols, & les Malades se trouver la respiration libre, le sommeil facile,

facile, & les jambes défenflées aprés quelques jours de leur uſage.

Bol contre les Ecrouelles.

Prenez de l'Æthiops minéral,
un ſcrupule;
de la poudre de Cloportes,
de la Gomme Ammoniac,
de chacune quinze grains.

Incorporez le tout avec une ſuffiſante quantité de Conſerve de Fumeterre, pour former un Bol, à prendre trois fois la ſemaine pendant un mois, le matin à jeun, dans du pain à chanter, ſe purgeant tous les dix jours avec une doſe de notre Opiate fondante & purgative (*a*), proportionnée à l'âge du Malade.

Notez, qu'il faudra diminuer la doſe du Bol ci-deſſus à moitié, ſi c'eſt pour un Enfant.

Remarque. Ce Bol eſt non-ſeulement bon contre les Ecrouelles, mais encore contre la Galle, les Dartres, & les autres maladies de la Peau, qui ont pour cauſe un amas de ſéroſités épaiſſies dans les Glandes, qui par la cauſticité qu'elles y acquiérent, y produiſent toutes ces maladies; il réſout cette ſéroſité, & en adoucit l'acrimonie. Si l'on s'en ſert pour les Ecrouelles, il faudra faire uſage en même-tems de l'onguent contre les Humeurs froides décrit ci-deſſous, & d'une

(*a*) *Voyez le Chapitre des Opiates*, pag. 195.

Tiſane contre la même maladie, que nous avons indiquée plus haut *(a)*. On ne peut employer trop de Remédes enſemble pour détruire cette fâcheuſe maladie, dont le ſang eſt ſouvent infecté dès la naiſſance, & qui chez les Pauvres eſt entretenue par les mauvais alimens dont ils ſe nourriſſent, ce qui la rend extrêmement rebelle & difficile à guérir.

Bol contre les Vers, & ſur-tout contre les Vers plats.

Prenez de la racine de Fougere femelle, un gros ;
du Mercure doux ſublimé ſix fois, }
de la Rhubarbe, }
de la Coraline, } de chacun ſix grains.

Pulvériſez le tout, & incorporez-le avec un peu de Syrop d'Abſinthe, pour former un Bol, à prendre dans du pain à chanter.

(a) Voyez les Chapitres des Tiſanes, pag. 57 *& des Onguens.*

§. III. DES OPIATES *.

Opiate Martiale-fondante & purgative, contre les Obſtructions.

PRenez du Saffran de Mars apéritif, une demi-once ;
du Scéné mondé,
de la Rhubarbe
du Sel d'Abſinthe,
& de l'*Arcanum duplicatum*,
de chacun un gros ;
du Jalap,
du Diagrède,
du Mercure doux ſublimé ſix fois,
& des Trochiſques *Alhandal*,
de chacun deux ſcrupules ;
de la Gomme-Ammoniac,
& de la Myrrhe,
de chacune quatre ſcrupules ;
de la Canelle, un gros.

Pulvériſez le tout, & après l'avoir mêlé exactement, incorporez-le avec une ſuffiſante quantité de Syrop de fleurs de Pêcher.

La doſe eſt de deux gros pour un Adulte, à prendre le matin à jeun deux fois la ſemaine pendant quinze jours, envelopé

*. L'Opiate *eſt un Médicament ſemblable au Bol, mais d'une conſiſtance plus molle. On le compoſe ordinairement de Conſerves, d'Electuaires, de Poudres, de Sels & de Syrops dont on forme un tout, qui ſert pour pluſieurs doſes.*

dans du pain à chanter ; une fois la semaine pendant quinze autres jours, en continuant une fois le mois pendant quelque-tems.

La dose pour un Enfant est depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros. On avale par-dessus un peu de Tisane chaude, ou de Bouillon.

Remarque. Cette Opiate convient dans les maladies qui ont pour cause l'Obstruction des viscéres ; dans la Cachexie, dans les Bouffissures & pour prévenir l'Apoplexie & la Paralysie séreuses. Elle fond parfaitement les matiéres glaireuses qui s'attachent aux parois de l'Estomac & des Intestins, & les entraîne par les selles ; mais il n'y a que les tempéramens froids & humides qui doivent s'en servir ; car elle nuiroit à ceux dont les viscéres sont chauds, & dont le sang est bilieux & bouillant. Elle ne convient point encore aux Hectiques & aux Phthisiques, à ceux qui crachent ou vomissent le sang, ou qui sont sujets à quelqu'autre Hémorragie ; les Femmes grosses doivent aussi s'en abstenir. Il sera bon de prendre la Tisane ou les Bouillons apéritifs décrits ci-dessus (*a*), avant & pendant son usage, & de le continuer long-tems, sur-tout si l'Estomac est glaireux & fait mal ses fonctions.

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tisanes*, pag. 43 *& des Bouillons*, pag. 69.

Opiate apéritive & purgative contre l'Hydropiſie.

Prenez du Saffran de Mars apéritif, de l'Antimoine cru, de chacun deux gros ; du Diagréde, une once.

Faites du tout une poudre fine, & ajoutez-y une ſuffiſante quantité de Syrop des cinq Racines apéritives, pour former une Opiate de molle conſiſtance, à prendre à la doſe de deux ſcrupules à un gros, le matin & le ſoir, envelopé de pain à chanter.

Remarque. Cette Opiate évacue puiſſamment les ſérolités ; ce qui la rend propre contre l'Hydropiſie du bas-ventre, & la Bouffiſſure univerſelle apelée Leucophlegmatie ou Anaſarque. On la donne encore avec avantage dans les Cachexies, les Maladies hypocondriaques & dans les Obſtructions invétérées. L'Auteur de qui nous la tenons, & qui en faiſoit un ſecret pendant ſa vie, s'en ſervoit avec un ſuccès merveilleux dans tous ces cas. Il faut avoir attention, lorſqu'on la donne contre l'Hydropiſie, que le Malade ne boive point pendant ſon opération. Il faut auſſi la continuer aſſez long-tems, mais en éloigner les doſes à meſure que le Malade ſe trouve ſoulagé, c'eſt-à-dire, n'en prendre que deux fois la ſemaine, enſuite une fois, & enfin en terminer l'uſage inſenſiblement.

Opiate fébrifuge & purgative.

Prenez de bon Quinquina, une once ;
du Lénitif, une demi-once ;
du Séné mondé,
quatre ſcrupules ;
du Sel de Glauber,
du Sel d'Abſinthe,
des Yeux d'Ecreviſſes préparés,
de chacun un gros.

Pulvériſez ce qui doit l'être, & incorporez le avec une ſuffiſante quantité de Syrop de fleurs de Pêcher.

La doſe eſt d'un gros & demi à deux gros pour un Adulte, à prendre de quatre heures en quatre heures, trois ou quatre fois le jour, dans du pain à chanter ; & d'un demi-gros à un gros pour les Enfans.

Remarque. Les Fiévres intermittentes, qui ſont celles dont il s'agit ici, ſont ainſi nommées, à cauſe des intervalles qu'elles laiſſent entre leurs accès ; les plus communes d'entre ces Fiévres ſont la Quotidienne, la Tierce & la Quarte. La Fiévre quotidienne prend tous les jours à la même heure ; la Fiévre tierce prend de deux jours l'un, en laiſſant un jour de bon ; & la Quarte laiſſe deux jours de tranquillité entre ſes accès. Il y a encore les Fiévres Doubles-tierces, Doubles-quartes, &c. qui ne différent que du plus au moins de ces premiéres, auſquels on peut les raporter.

Toutes ces ſortes de Fiévres commencent ordinairement par le froid, & finiſſent par la chaleur. Le Malade fait des baillemens, il étend les bras, il ſent une laſſitude & une courbature dans tous les membres. Les extrêmités du corps ſe refroidiſſent ; & le froid ſe fait principalement ſentir vers les lombes, & ſemble monter & deſcendre le long du dos. Au commencement du friſſon le pouls eſt petit, obſcur & concentré : le froid enſuite faiſant place à la chaleur, la ſoif augmente, & le pouls devient élevé, fort & accéléré ; enfin l'accès ſe termine par des ſueurs plus ou moins abondantes.

De quelque eſpéce que ſoit la Fiévre intermittente que l'on a à traiter, il faut toujours commencer indiſpenſablement par les Remédes généraux. Ainſi on débutera par donner au Malade le Lavement laxatif (*a*) de ce Livre : on le ſaignera le lendemain matin, & on lui tirera environ dix onces de ſang d'un des bras ; dans l'après-dîner il prendra un ſecond Lavement ſimple émollient. Le lendemain de la Saignée on le purgera avec une de nos Potions purgatives convenables à ſes forces & à ſon tempérament, ou bien avec une de nos Potions émétiques, ſi c'eſt une Fiévre quarte, ou que l'on ſoupçonne un amas de matiéres impures dans les premiéres voies. On ne peut manquer

(*a*) *Voyez les Chapitres des Lavemens*, pag. 91. *& ſuiv. & des potions purgatives*, pag. 117. *& ſuiv.* 131. *& ſuiv.*

en ſuivant cette méthode, malgré le ſentiment de certains Praticiens, qui veulent qu'on laiſſe paſſer trois ou quatre accès avant que de rien faire, ſous prétexte que la Fiévre détruit l'humeur. Mais ce ſentiment eſt faux, comme il ſeroit facile de le prouver, & il tient plus du préjugé que de la raiſon. La Fiévre eſt un mauvais Hôte, qu'il faut déloger promptement, & les Remédes généraux que nous venons de preſcrire, ne peuvent être apliqués trop-tôt. On a de plus l'expérience, que ſouvent les ſeuls Remédes évacuans guériſſent les Fiévres ſans retour: il eſt même inutile de donner des Remédes ſpécifiques, tels que le Quinquina, ſi les premieres voies ſont embarraſſées; & l'on ſçait qu'elles le ſont ordinairement au commencement des Fiévres intermittentes: quand bien même elles ne le ſeroient pas, on précipite par les ſelles les levains de ces Fiévres, & l'on rend plus certain l'action du Spécifique qui doit ſuivre & aſſurer la guériſon. La boiſſon du Malade ſera notre Tiſane commune aiguiſée de ſel de Nitre, dont il boira abondamment, ſur-tout dans l'ardeur de la Fiévre; on le mettra après la Purgation & un rafraîchiſſement ſuffiſant, à l'uſage de l'Opiate ci-deſſus, qu'il continuera de la maniere qu'elle eſt preſcrite, juſqu'à ce que la Fiévre ait ceſſé; après quoi il en éloignera les priſes, pour les terminer inſenſiblement. Le régime du Malade doit être exact, ne prenant que de la ſoupe & du bouillon juſqu'à

ce que l'accès de Fiévre ait manqué ; enſuite il reviendra peu-à-peu à la nourriture ſolide.

Autre Opiate contre la Fiévre quarte.

Prenez du Quinquina en poudre,
du Diaprun ſolutif,
& du Syrop de fleurs de Pêcher,
de chacun une once ;
du Sel Ammoniac pulvériſé,
un ſcrupule.

Mêlez le tout enſemble, pour former une Opiate, dont le Malade prendra ſix jours de ſuite, deux gros le matin à jeun, & autant le ſoir, envelopés de pain à chanter, & buvant une demi-heure après chaque priſe un bouillon au Veau altéré d'une poignée de feuilles de Chicorée ſauvage.

Autre Opiate fébrifuge pour les Poitrines délicates.

Prenez de bon Quinquina pulvériſé,
ſix gros.
du Miel de Narbonne,
du Syrop de Capillaire,
de chacun une once.

Mêlez le tout éxactement, & partagez-le en quatre doſes, à prendre dans un petit verre de Vin ; la premiére à l'entrée du friſſon, & les autres ſucceſſivement de vingt-quatre heures en vingt-quatre heures, ſoit qu'il y ait Fiévre ou non, obſervant de faire précéder la Purgation.

Remarque. Quoique le Quinquina ſoit le Reméde ordinaire des Fiévres intermittentes, il demande cependant bien des précautions dans ſon uſage : car comme il eſt aſtringent, chaud & irritant, il y a des tempéramens auſquels il ne convient pas, ſur-tout s'il eſt donné bruſquement, & ſans avoir préparé le Malade par des boiſſons rafraîchiſſantes ; ainſi dans les mauvaiſes Poitrines, dans les perſonnes qui ont craché le ſang, dans les Obſtructions anciennes du bas ventre accompagnées de Fiévre lente, dans les ardeurs de Feu que l'on reſſent dans les entrailles ; en un mot, par-tout où il y aura de l'érethiſme, une ſéchereſſe, & une chaleur brûlante à la Peau, le Quinquina eſt contraire. On doit donc éviter de le donner dans tous ces cas ; & ſi l'on y eſt obligé, il faut choiſir les préparations les plus adoucies, telles que l'Opiate ci-deſſus, les Apozêmes avec les herbes tempérées, le Quinquina en Tiſane avec l'eau de Veau, de Poulet, ou émulſionné : encore ſi la Fiévre devient un peu plus vive, il faut abſolument l'abandonner, & ne pas faire comme ces mauvais Praticiens, qui croyent que toute Fiévre doit céder au Quinquina, aſſocié ſur-tout avec les amers, en ſorte que lorſqu'ils ont lâché une Ordonnance montée ſur ce ton, ils n'en démordent jamais, quelques accidens qui arrivent, & il n'y a que la mort du Malade qui mette fin à la Fiévre, & aux fautes du Médecin.

Opiate fondante contre les Tubercules du Poumon.

Prenez de la Conſerve de Tuſſillage, une once ;
des Pilules balſamiques de Morton, deux gros ;
des fleurs de Souffre,
du Blanc de Baleine,
de chacun un gros & demi ;
de Mercure doux ſublimé ſix fois,
des Yeux d'Ecreviſſes préparés,
de chacun un gros.

Mêlez le tout avec une ſuffiſante quantité de Baume de Souffre térébenthiné, pour prendre le matin à jeun, & le ſoir en ſe couchant, à la doſe d'un demi-gros, dans du pain à chanter.

Remarque. Les Phthiſiques ſe trouvent très-bien de l'uſage de cette Opiate, qui adoucit le ſang, fortifie le Poumon, & réſout les Tubercules crus qui s'y engendrent, les détergent lorſqu'ils ſont ſupurés, & conſolide même ſes ulcéres ; ce qui la rend utile dans les différens dégrés de la Phthiſie : on doit accompagner ſon uſage de notre Tiſane pectorale adouciſſante, & des Bouillons de Moû de Veau décrits ci-deſſus (*a*). L'Opiate qui ſuit convient dans les mêmes cas ; & comme

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 39 & *des Bouillons*, pag. 68.

elle eſt plus ſimple, on peut la lui ſubſtituer, lorſqu'on ne peut pas faire celle-ci commodément.

Autre Opiate contre la Phthiſie.

Prenez de la racine récente de Chardon à Foulon, une once.

Pilez-la après l'avoir lavée, & l'incorporez enſuite avec une ſuffiſante quantité de Miel blanc ou de Narbonne, pour former une Opiate, à prendre deux fois le jour, à la doſe d'un gros & demi, dans du pain à chanter, en buvant par-deſſus un verre de Tiſane pectorale (*a*).

Opiate Anti-Aſthmatique, ou *contre l'Aſthme.*

Prenez des fleurs de Souffre, ſix gros;
du Blanc de Baleine, deux gros;
de la poudre d'Iris de Florence, un gros.

Incorporez le tout avec une ſuffiſante quantité de Miel blanc.

La doſe eſt de la groſſeur d'une Noix-Muſcade, à prendre le matin à jeun dans du pain à chanter.

Remarque. Cette Opiate inciſe efficacement & fait évacuer par l'expectoration le phlegme viſqueux, & épaiſſi dans les

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 39.

Poumons, où il cauſe la difficulté de reſpirer, & les accès de l'Aſthme humide : on doit avaler par deſſus chaque priſe un grand gobelet de notre Hydromel décrit plus haut (*a*). Elle fera un meilleur effet.

Nous préviendrons ici une objection qu'on pourroit nous faire, qui eſt que contre la promeſſe que nous avons faite dans notre Avertiſſement, on trouve dans ce Recueil pluſieurs Remédes ſous différentes formes, comme de Tiſane, de Bols, & d'Opiates, qui ſont tous pour la même maladie ; en ſorte qu'il paroit que c'eſt multiplier les Remédes ſans néceſſité, puiſqu'un ſeul de ceux-là pourroit ſuffire pour remplir l'indication qu'on a en vue. Nous répondrons que ces Remédes, quoique pour la même maladie, ne ſont point les mêmes, mais qu'ils concourent ſeulement enſemble, & forment un aſſortiment propre à remplir les différentes indications qui peuvent ſe rencontrer : Que qui ne donneroit, par exemple, dans la Pleuréſie qu'une Tiſane adouciſſante, ſans y joindre les Apozêmes, les Lohocs, & les autres Remédes convenables, courroit grand riſque de ne la pas guérir. Si les maladies qui ſe preſentent dans la Pratique étoient ſimples, elles ne demanderoient qu'un ſeul Remède pour leur guériſon ; mais commes elles ſont ordinairement compliquées, on a beſoin d'en employer pluſieurs qui répon-

(*a*) *Voyez le Chapitre des Hydromels*, pag. 59.

dent à chaque indication que l'on a à remplir : ainſi la multiplicité des Remédes pour une même maladie eſt inévitable ; & nous ne nous y ſommes étendus qu'autant que la néceſſité nous y a forcés. Nous avons eu en outre deux bonnes raiſons pour varier quelques-unes de nos Formules. La premiere a été pour nous conformer au goût des Malades, dont les uns ne veulent que des Remédes liquides, & les autres donnent la préférence à ceux qui ſont ſous une forme ſolide. La ſeconde, c'eſt que nous avons éprouvé qu'il n'y a point de ſi bon Reméde, qui ne manque quelquefois ſon effet par quelque cauſe cachée qu'on ne peut démêler ; en ſorte que nous en avons multiplié quelques-uns qui nous ont paru bons dans les mêmes cas, quoiqu'ils n'ayent pas réuſſi également ſur tous les Sujets : on pourra donc les eſſayer ſucceſſivement, & s'en tenir à celui qui fera le mieux. Le Miel, par exemple, entre dans preſque tous les Remédes que l'on donne contre l'Aſthme humide ; & c'eſt avec juſte raiſon, puiſqu'il déterge, & fait couler avec abondance la matiere des crachats épaiſſie dans les Poumons. Nous avons cependant connu des perſonnes Aſthmatiques qui ne pouvoient le ſuporter ; il leur troubloit les entrailles, & leur cauſoit des Coliques ſourdes, qui duroient pluſieurs jours : ces mêmes perſonnes ſe trouvoient extrêmement bien de l'uſage de nos Pilules Anti-aſthmatiques : ce qui fait voir qu'il ne faut pas trop inſiſter ſur un Reméde,

qui quoique bon en ſoit, ne peut convenir également à tout le monde, & que c'eſt par ſon bon, ou ſon mauvais effet, qu'on doit principalement en juger.

Opiate Mézentérique, ou *contre les Obſtructions du Mézentére.*

Prenez des extraits de Chicorée ſauvage,
de Fumeterre,
& de Rhubarbe,
de chacun deux gros;
de l'extrait de Coloquinte,
huit grains;
& de Concombre ſauvage,
douze grains;
du Saffran de Mars apéritif,
deux gros;
Poudre de Séné,
Mercure doux ſublimé ſix fois,
de chacun un gros;
Poudre de Jalap,
Diagrède,
de chacun deux ſcrupules;
Sel d'Abſinthe,
de Tamatiſc,
de chacun un demi-gros;
Saffran Oriental,
dix-huit grains;
Macis, ſix grains.

Mêlez le tout éxactement, & incorporez-le avec une ſuffiſante quantité d'*Oxymel* ſimple, pour former une Opiate, à prendre le matin à jeun dans un pain à chanter, à la doſe d'un gros à un gros

& demie, & un Bouillon apéritif une heure après.

Remarque. Rien de si commun que les Obstructions, & rien de si difficile à guérir quand elles sont anciennes; elles sont la source de toutes les maladies chroniques; & comme elles abolissent les fonctions des viscéres qu'elles engorgent, elles ménent nécessairement à la mort. Il est donc très-utile de s'attacher aux Remédes qui peuvent les détruire, ou en arrêter les progrés. Nous avons donné cidessus une Opiate fondante & purgative contre les Obstructions en général, qui pourroit servir contre celles de Mézentére; mais cette derniere que nous décrivons, a produit de si bons effets dans les embarras de ce viscére, que nous conseillons de lui donner la préférence, lorsqu'on aura cette espéce d'Obstruction à combattre. On doit la continuer pendant quinze jours, se reposer ensuite quelques semaines, pour la reprendre de nouveau, & cela jusqu'à guérison, excepté dans les grandes châleurs, où il faut la cesser totalement.

Opiate contre l'Apoplexie, la Paralysie, & autres affections des Nerfs.

Prenez de la semence de Moutarde, deux onces;
de celle de Cresson Alénois, de Roquette, de chacune deux gros;
des feuilles séches d'Origan,

de Menthe,
de chacune ſix gros.

Pulvériſez le tout, & incorporez-le avec une ſuffiſante quantité de Syrop de Pivoine ſimple.

La doſe eſt d'un gros le matin à jeun, & autant ſur les cinq heures du ſoir, envelopé dans du pain à chanter, en avalant par-deſſus un gobelet de la Tiſane décrite ci-deſſus contre l'Apoplexie, & la Paralyſie (*a*).

Remarque. Cette Opiate eſt atténuante, apéritive, & fortifie les digeſtions; ce qui la rend utile contre l'Apoplexie & la Paralyſie, maladies qui viennent ordinairement d'épaiſſiſſement d'humeurs, occaſionné par les crudités & les glaires de l'Eſtomac. Mais ſi l'on veut qu'elle produiſe un meilleur effet, il faut avoir fait uſage quelque tems auparavant de l'Opiate martiale, fondante & purgative décrite ci-deſſus, parce que les Remédes altérans, comme eſt celui-ci, ſont toujours mieux placés, lorſque les mauvais levains des premiéres voyes ſont évacués; & une régle générale parmi les bons Praticiens, eſt de purger de tems en tems pendant l'uſage des Remédes apéritifs, ou qui tendent à ſéparer quelque impureté de la maſſe du ſang, parce qu'il eſt à craindre que ces impuretés étant fondues, ne faſſent de fâcheux dépôts ſur quelques viſcéres, ſi on ne les évacue à meſure.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Tiſanes*, pag. 51.

Opiate Anti-Epileptique, ou *contre l'Epilepſie.*

Prenez du Quinquina, ſix gros ; de la racine de Serpentaire de Virginie, deux gros.

Réduiſez le tout en poudre ſubtile, & incorporez-le avec une ſuffiſante quantité de Syrop de Pivoine compoſé, pour en faire une Opiate à prendre matin & ſoir dans du pain à chanter, à la doſe d'un gros pour un Adulte, & d'un ſcrupule à un demi-gros pour un Enfant.

Cette Opiate ſe continuera de même pendant trois ou quatre mois, & le reſte de l'année on ſe contentera d'en prendre ſeulement pendant quatre jours avant les nouvelles & pleines Lunes.

Remarque. Cette Opiate eſt un Reméde des plus aſſurés contre l'Epilepſie, pourvû que cette maladie ne ſoit point héréditaire, ou idiopathique, comme on parle en Médecine, c'eſt à-dire, cauſée par un vice interne du cerveau ; ce qui la rend ordinairement incurable. Mais ſi elle eſt la ſuite d'une Peur, d'une ſupreſſion de Régles, ou de quelqu'autre accident, qui jette le Malade dans des accès vaporeux, convulſifs, épileptiques, alors on peut l'employer avec aſſurance qu'elle procurera la guériſon. On doit préparer le Malade à ſon uſage par la Saignée du Pied & la Purgation, & même par l'Emétique, ſi rien ne le défend ;

que ſi l'on ſoupçonne une ſupreſſion de Régles être cauſe de la maladie, il faudra ajouter au total de l'Opiate deux gros de Saffran de Mars apéritif; ſinon, on la laiſſera telle qu'elle eſt, ayant ſoin de faire avaler par-deſſus chaque priſe une taſſe d'infuſion de fleurs de Tilleul, adoucie avec un peu de Sucre.

Opiate contre la Néphrétique, difficulté & ardeur d'Urine.

Prenez du Lénitif fin, deux onces;
de la Térébenthine de Veniſe, une demi-once;
de la Crême de Tartre, un gros.

Mêlez le tout enſemble, pour faire une Opiate, dont la doſe eſt d'un gros deux fois le jour, à prendre un gros le matin à jeun, & l'autre ſur les cinq heures du ſoir, dans du pain à chanter, en buvant par-deſſus un verre d'une des deux Tiſanes adouciſſantes décrites ci-deſſus (*a*).

Remarque. Cette Opiate eſt apéritive, & purge doucement: on en uſe pour prévenir la Néphrétique, pour faire jetter les ſables & les glaires par les urines, pour déterger & conſolider les ulcéres des Reins & de la Veſſie, & pour les Rétentions d'urine; mais il faut avoir

(*a*) *Voyez le Chapitre des Tiſanes*, pag. 39. *& ſuiv.*

attention de ne la jamais donner dans l'accès, & seulement lorsqu'on a calmé l'inflammation. L'Opiate suivante nous a encore très-bien réussi dans les mêmes cas. On pourra les essayer successivement, & s'en tenir à celle qui fera le mieux : si même il n'y a point d'ulcére dans les Reins ou dans la Vessie, il faudra commencer par celle qui suit, qui pourra suffire.

Autre Opiate contre la Néphrétique, l'ardeur d'Urine, & les Urines sanglantes.

Prenez du Savon d'Alicante,
une once ;
de la racine de Filipendule en poudre,
& de la farine de Lin,
de chacune deux gros.

Pilez le tout, & l'incorporez avec une suffisante quantité de Syrop de Guimauve, pour former une Opiate, à prendre pendant neuf jours, à la dose de deux gros le matin à jeun dans du pain à chanter, en buvant par-dessus un grand verre tiéde d'eau seconde de Chaux, ou une tasse ou deux d'infusion de Turquette, ou de Pariétaire.

Remarque. Les Urines sanglantes ont pour l'ordinaire deux sources différentes, qui demandent chacune leur traitement particulier. 1°. Elles peuvent avoir pour cause le déchirement de quelque vaisseau, dans les Reins, les Uretéres ou la Vessie,

par la préſence d'une pierre inégale ou raboteuſe, ou par des graviers qui occaſionnent un épanchement de ſang dans ces cavités. 2°. Elles peuvent venir de quelque violent effort, comme en voulant lever de terre un poids trop conſidérable, ou bien de la plénitude & de la raréfaction du ſang qui s'ouvre un paſſage dans les Reins, ou enfin de l'ouverture de quelque vaiſſeau dans l'intérieur du corps, qui ſe dégorge par cette voie. L'Opiate ci-deſſus ne convient que dans le premier, parce qu'elle fond les mucoſités glaireuſes qui s'attachent aux Reins & à la Veſſie, déterge les graviers & les grumeaux de ſang, & en facilite l'expulſion; mais elle feroit du mal dans le ſecond, qui ne veut que des Vulnéraires mucilagineux, ou legérement aſtringens : ainſi il faudra examiner laquelle de ces cauſes a pu occaſionner le Piſſement de ſang, & dans le ſecond cas on employera la Tiſane, la Potion, & les Bouillons contre l'Hémophthyſie, ou le crachement de ſang, décrits ci-deſſus dans leur lieu (*a*).

Opiate pour prévenir l'Avortement.

Prenez de la graine de Kermès,
ou de la Cochenille,
& du Sang Dragon pulvériſé,
de chacun un gros;

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tiſanes*, pag. 44. *des Bouillons*, pag. 73. *& des Potions*, pag. 113.

du Corail rouge préparé,
un gros & demi;
de la Confeſſion Alkermès,
ou d'Hyacinthe,
deux gros.

Mêlez le tout avec une ſuffiſante quantité de Syrop de Kermès, ou de Roſes ſéches, pour former une Opiate, dont la doſe ſera d'un demi-gros le matin à jeun, pendant neuf jours à prendre dans du pain à chanter, en buvant pardeſſus un gobelet tiéde de la Tiſane contre le crachement de ſang décrite ci-deſſus (*a*).

Remarque. Cette Opiate doit ſe joindre au Julep que nous avons décrit ci-deſſus contre l'Avortement (*b*); elle ſe prend le matin à jeun pendant neuf jours, & le Julep le ſoir à l'heure du ſommeil : on doit faire uſage en même-tems pour boiſſon ordinaire de notre Tiſane contre le crachement de ſang que l'on trouvera en ſon lieu.

Opiate contre les Hémorroides.

Prenez du Lénitif fin,
une once & demie;
des fleurs de Souffre,
une demi-once.

Incorporez le tout avec une ſuffiſante quantité de Syrop Violat, pour former une Opiate, dont la doſe ſera de la groſ-

(*a*) *Voyez le Chapitre des Tiſanes*, pag. 44.
(*b*) *Voyez le Chapitre des Juleps*, pag. 154.

ſeur d'une Noix Muſcade, le matin à jeun, & autant à l'heure du ſommeil, dans du pain à chanter.

Remarque. Cette Opiate purge doucement, amollit le gonflement des Hémorroïdes, & en calme la douleur. On y joindra l'uſage du Liniment contre les Hémorroïdes décrit ci-deſſous (*a*); mais on obſervera de ne pas le donner aux Femmes enceintes, parce que les Remédes où entre le Souffre, leur ſont contraires.

Opiate contre la Jauniſſe.

Prenez de la graine d'Ancolie, ſix gros;
du Saffran Oriental, un gros;
du Tartre vitriolé, un demi-gros.

Incorporez le tout, après l'avoir réduit en poudre, avec une ſuffiſante quantité de Conſerve de *Kynorrhodon*, pour partager en ſept parties égales, à prendre le matin à jeun pendant ſept jours dans du pain à chanter, en buvant par-deſſus un verre de Tiſane apéritive (*b*).

Remarque. Cette Opiate, qui a été éprouvée pluſieurs fois avec un heureux ſuccès, excite les Regles, les Sueurs & les Urines;

(*a*) *Voyez le Chapitre des Linimens* pag. 228.
(*b*) *Voyez le Chapitre des Tiſanes*, pag. 43.

il faut s'y préparer par l'usage de nos Bouillons apéritifs, & par la Purgation (*a*).

Electuaire Lénitif.

Prenez de la décoction de racines de Guimauve,
& de Figues grasses,
quatre livres ;
du Sucre blanc, trois livres.
Faites cuire le tout en consistance de Miel, ou de Syrop épais.
Ajoutez-y ensuite
de la pulpe de Casse récemment mondée, une livre ;
de la pulpe de Prunaux,
de la poudre de Sené,
de chacune une demi-livre ;
des semences de Violette pilées,
trois onces ;
des semences d'Anis pilées,
deux gros.
du Sel végétal, une once & demie.
Faites du tout un Electuaire suivant l'Art.

F A C. O N.

On fera premierement bouillir une livre de racines de Guimauve récentes, lavées & concassées, & une livre de Figues grasses dans huit livres d'eau, réduisant le tout à moitié : on coulera cette décoction avec une legére expression ; on fera cuire

(*a*) *Voyez le Chapitre des Bouillons*, pag. 69.

cuire à part dans de l'eau les Pruneaux, dont on tirera la pulpe ; ce qui fera pareillement de la Caſſe. On fera deſſecher ces pulpes ſur un petit feu ; on pulvériſera le Séné, les ſemences de Violette & d'Anis, & le Sel végétal ; on fera cuire enſuite le Sucre par un feu lent dans la décoction ci-deſſus, juſqu'en conſiſtence de Miel ou de Syrop bien épais. On retirera la baſſine de deſſus le feu, & l'on y diſſoudra les pulpes avec un biſtortier, enſuite on y mêlera les Poudres, pour faire un Electuaire qu'on gardera pour l'uſage.

Remarque. Comme le Lénitif eſt un Reméde d'un grand uſage en Médecine, parce qu'il purge ſans violence, & qu'il modére l'action des autres Purgatifs avec leſquels on le mêle, nous avons cru devoir en donner ici la deſcription, afin que les Dames de Charité qui voudront le tenir, puiſſent le préparer par elles-mêmes. Nous les exhortons fort à le faire, vû la bonté du Remede, qui ne laiſſe jamais de mauvaiſes ſuites après lui ; & comme il n'eſt pas d'un grand prix, il convient aux Pauvres pour toutes ſortes de raiſons. La doſe en le donnant ſeul, eſt depuis demi-once juſqu'à une once & demie, & en le mêlant avec d'autres Purgatifs, depuis demi-once juſqu'à ſix gros.

CHAPITRE IX.

PILULES & TABLETTES.

§. I. DES PILULES*.

Pilules purgatives universelles.

PRenez de la Poudre Cornachine, une demi-once ;
du Diagréde, trois gros ;
de la Crême de Tartre, deux gros ;
de la Poudre de Cloportes, un gros.

Mêlez le tout, après l'avoir pulvérisé ; & avec le Mucilage de Gomme-Adragant, formez des Pilules du poids de douze grains chacune.

La dose est de trois Pilules ou d'un demi-gros pour un Adulte, à prendre le matin à jeun, avalant par-dessus un gobelet de Tisane chaude, ou de Bouillon.

Remarque. Ces Pilules purgent sans irritation, sans tranchées, & sans violence.

* *Les* Pilules *sont un Médicament de consistence solide, & de forme ronde. On les compose ordinairement de Poudres, que l'on incorpore avec du Syrop, ou du Miel, ou quelque Mucilage, afin de les mettre plus facilement en masse.*

On peut en donner une, ou douze grains aux Enfans de dix ans ; deux, ou vingt-quatre grains à vingt ans, & la prise entiére aux Adultes, observant néanmoins d'augmenter ou de diminuer la dose suivant la force du Sujet. Ces Pilules se conservent aussi long-tems que l'on veut. Mais lorsqu'on les a gardées quelques mois, il faut les écraser, & en faire un petit Bol avec le Syrop de fleurs de Pêcher, ou autre Syrop. On l'avalera dans du pain à chanter, buvant un peu de Bouillon ou de Tisane par-dessus. On peut encore, après avoir écrasé ces Pilules, les délayer dans un jaune d'œuf ; ce qui pourra mieux convenir aux Enfans, ou aux personnes qui ont de l'aversion pour tout ce qui s'apelle Médecines, & qui sont sujettes à les rejetter.

Pilules Hydragogues, ou *contre l'Hydropisie.*

Prenez de la Gomme-Gutte,
deux gros;
de la poudre de Jalap,
du Diagréde,
de chacun un gros;
de l'*Arcanum duplicatum*,
une demi-once.

Mêlez le tout, après l'avoir réduit en poudre ; & avec le Mucilage de Gomme-Adragant, formez des Pilules du poids de dix grains chacune.

La dose est de deux Pilules, ou vingt

grains, à prendre le matin à jeun, dans dans du pain à chanter.

Remarque. On employe ces Pilules dans toutes les occasions, où l'on a besoin de purger abondamment les sérosités; comme dans l'Hydropisie, la Sciatique, les Rhumatismes & la Goutte. Quoique la dose ne soit que de deux Pilules, on peut la pousser jusqu'à quatre, en montant par degrés. Ce sont les évacuations qui doivent régler, & la façon dont le Malade soutient l'action du Purgatif.

Elles se donnent ordinairement à jeun, dans du pain à chanter, ou toutes seules dans une cuillerée d'eau; si elles sont anciennes, on les écrase auparavant, & on les incorpore avec un peu de Syrop pour en faire un Bol, en faisant boire au Malade immédiatement par dessus un gobelet de Bouillon: deux heures après on fait prendre un second Bouillon, & trois heures après ce dernier Bouillon un bon potage. Toutes les fois que le Malade va à la selle, ou lui fait boire un gobelet de Tisane chaude.

Lorsqu'on s'aperçoit que le Malade vomit le Reméde peu de tems après l'avoir avalé, on lui fera prendre ces Pilules entre deux soupes de pain trempées dans du Bouillon, & on lui fera manger par-dessus un peu de potage, afin que l'aliment modére & adouciſſe l'action du Reméde sur l'Estomac; trois heures après on donnera au Malade un Bouillon, qui sera suivi au bout de deux heures d'un nouveau potage.

Ce Remede ſe réïtére après trois jours d'intervalle : ſi le Malade n'a pas beaucoup évacué, & que l'enflure ne diminue pas conſidérablement, on en augmentera un peu la doſe, juſqu'à ce qu'il cauſe des évacuations ſuffiſantes ; mais s'il paroît cauſer de l'irritation, on y ſubſtituera quelqu'autre Purgatif.

Pilules Vermifuges purgatives.

Prenez du Mercure crû, éteint dans la Térébenthine une once ;
de l'Aloës Hépatique, une demi-once ;
du Séné mondé,
de la Rhubarbe, de chacun deux gros ;
de la Coraline,
du *Semen contrà*, de chacun un gros.

Pulvériſez ce qui doit être mis en poudre, & mêlez le tout avec le Syrop de Chicorée compoſé de Rhubarbe, pour former des Pilules ; dont la doſe eſt de douze à dix-huit grains pour les Enfans, & d'un demi-gros à deux ſcrupules pour les Adultes, à prendre dans du pain à chanter, le ſoir en ſe couchant.

Remarque. On ne ſçauroit trop louer ces Pilules, qui ne manquent jamais leur effet, en tuant les Vers (*a*), & en les en-

(*a*) *Voyez ci-deſſus la Remarque ſur la Tiſane contre les Vers*, pag. 55.

traînant dehors par les selles. De plus, comme ce sont presque toujours les Enfans qui en font usage, elles leur sont très-commodes à cause du petit volume du Remede à prendre, & qu'il n'opére que le lendemain, sans interrompre leur sommeil. Ainsi on conseille de le préférer à tous les autres qui sont indiqués pour la même maladie. Les épreuves que l'on en a faites ont toujours réussi.

Pilules Anti-Asthmatiques, ou *contre l'Asthme.*

Prenez de l'Aloës Hépatique, une once;
de la Gomme-Ammoniac,
une demi-once;
Dissolvez le tout dans le Vinaigre Scillitique, le réduisant en consistance de Pâte solide.
Ajoutez-y ensuite
du Tartre Vitriolé,
un gros & demi;
de la Gomme-Gutte pulvérisée,
un gros.
Formez du tout des Pilules de six grains chacune, dont la dose sera de douze grains, ou deux Pilules, en montant jusqu'à un scrupule, ou quatre Pilules, à prendre le soir avant que de se coucher, deux heures après le souper, en les réïtérant suivant le besoin.

Remarque. Ces Pilules sont fondantes & purgatives. Elles détournent par la voie des Intestins les glaires de l'Estomac, qui

ſe jetteroient ſur la Poitrine, pour y cauſer les accès de l'Aſthme. Les Perſonnes ſujettes à cette maladie doivent en prendre de tems en tems, ſur-tout dans l'Hyver, dans les tems pluvieux, & lorſque la perte d'apétit, le gonflement d'Eſtomac, & l'opreſſion leur font connoître le retour de la maladie. Si les deux Pilules que l'on aura priſes le premier ſoir, ne ſoulagent pas, il faudra en prendre quatre le lendemain, pour revenir enſuite à deux, ſi l'on en a beſoin, mais en laiſſant un jour d'intervalle. Tandis que l'on uſera de ces Pilules, on aura ſoin de ſe ménager ſur le régime de vivre, évitant tout ce qui eſt crû & indigeſte, & s'abſtenant de faire maigre : on doit ſur toutes choſes ſouper legérement, & de bonne heure ; & même ſe contenter d'un potage, ſi cela ſe peut.

Pilules contre les embarras des Reins, la Colique Néphrétique, & les Urines ſanglantes.

Prenez du Savon d'Alicante,
ou du Savon blanc ordinaire,
une once ;
de l'Huile d'Anis,
trente gouttes.

Mêlez le tout dans un mortier de marbre, & partagez-le en vingt Pilules, que l'on envelopera de Poudre d'Yeux d'Ecreviſſes.

La doſe eſt de deux Pilules par jour dans une cuillerée de Syrop de Guimauve,

l'une le matin à jeun, & l'autre sur les cinq heures du soir, en avalant immédiatement par-dessus un verre d'Eau seconde de Chaux, ou une tasse d'infusion de Turquette, ou de Parietaire.

Remarque. Ces Pilules sont fondantes & déterſives. Elles entraînent par la voye des Urines les glaires & les graviers inhérens aux Reins & à la Vessie, & en facilitent l'écoulement. Il faut accompagner leur usage de la Tisane diurétique adoucissante marquée ci-dessus (*a*), & les répéter de tems en tems, pour empêcher qu'il ne se forme de nouveaux embarras dans les Reins. On observera, si les Urines sanglantes viennent d'une autre cause, de changer le traitement, comme il est dit ci-dessus dans la Remarque de l'Opiate contre les Urines sanglantes (*b*).

Pilules contre les Pertes, & autres Hémorragies.

Prenez de l'Alun de Roche purifié, & réduit en poudre, deux onces.

Faites-le fondre dans une cuillier de fer, & ajoutez-y du sang-Dragon pulvérisé, une once.

Mêlez le tout & ôtez-le du feu, en remuant toujours avec une espatule de fer, jusqu'à ce que vous l'ayez mis en consistence de pâte molle; & pour lors vous

(*a*) *Voyez le Chapitre des Tisanes*, pag. 40
(*b*) *Voyez cet Article*, pag. 212

en formerez des Pilules de la groſſeur d'un pois, que vous garderez pour l'uſage.

La doſe eſt d'un ſcrupule juſqu'à un gros, que l'on réïtére de quatre heures en quatre heures, ou plus ſouvent, ſuivant l'urgence du cas, & juſqu'à ce que le Flux de ſang ſoit arrêté ; enſuite on en donne une ou deux doſes tous les jours pendant quelque-tems.

On fait boire à la Malade un verre de Tiſane aſtringente (*a*) par-deſſus la priſe de Pilules.

On peut également en faire un Electuaire, en incorporant les Poudres d'Alun, & de Sang-Dragon, avec trois onces de Conſerves de Roſes rouges. La doſe en ſera d'un gros, de quatre heures en quatre heures.

Remarque. Ce Reméde eſt un des plus ſûrs contre les Pertes des Femmes, ſoit pour prévenir les retours trop fréquens de leurs Régles, ou pour en modérer la trop grande quantité, ſoit pour arrêter les écoulemens auſquels elles ſont ſujettes pendant leur groſſeſſe. Il eſt rare qu'une Hémorragie ne ceſſe pas après en avoir pris trois gros, ou une demi-once. Nous avons donné un Bol ci-deſſus (*b*) qui convient dans les mêmes cas ; mais comme la doſe d'Alun y eſt beaucoup moins forte, peut-être ne ſuffiroit-elle pas dans des Pa-

(*a*) *Voyez le Chapitre des Tiſanes*, pag. 44.
(*b*) *Voyez le Chapitre des Bols*, pag. 187.

tes ſubites & abondantes, & dans des vomiſſemens de ſang qui mettent tout d'un coup les Malades dans le danger le plus preſſant : auſſi en pareilles circonſtances faudroit-il préférer ces Pilules, & en accompagner l'uſage des autres Remedes indiqués à l'article du Bol (a) contre les crachement de Sang, & autres Hémorragies.

Pilules contre les ſupreſſions des Régles invétérées.

Prenez de l'Aloës Soccotrin,
deux gros ;
du Séné, un gros ;
de l'*Aſſa fœtida*,
du *Galbanum*,
de la Myrrhe,
de chacun un demi-gros ;
du Sel de Mars de Riviére,
deux gros ;
du Saffran,
du Macis,
de chacun dix-huit grains ;
de l'Huile de Succin,
vingt gouttes.

Pulvériſez ce qui doit l'être ; & incorporez le tout avec une ſuffiſante quantité de Syrop d'Armoiſe, pour former une maſſe, que l'on diviſera en cent Pilules, & dont la doſe ſera de quatre Pilules, à prendre une heure ou deux après le ſou-

(a) *Voyez le Chapitre des Bols*, pag. 187.

per, de deux jours l'un, pendant un mois ou ſix ſemaines.

Remarque. Dans les Pâles-couleurs ordinaires des Filles, & lorſque la ſupreſſion des Régles n'eſt pas bien ancienne, on doit commencer par l'uſage des Tablettes martiales, ou de la Poudre pour procurer les Régles que nous avons propoſée plus haut (*a*) ; mais ſi la maladie à réſiſté à ces premiers Remédes, ou qu'il y ait très-long-tems que la Malade ſouffre une ſupreſſion, il faudra en venir aux Pilules ci-deſſus, dont on a éprouvé pluſieurs fois des ſuccès merveilleux dans ces circonſtances : on aportera à leur uſage les mêmes attentions & le même régime que nous conſeillons dans la Remarque de nos Tablettes (*b*) ; il faut conſulter cet endroit. On aura auſſi attention ſi ces Pilules qui ſont laxatives, & qui doivent être continuées long-tems, produiſent trop d'évacuations, d'en diminuer la doſe, & de la réduire à trois Pilules, & même à deux, s'il en eſt beſoin.

Pilules Anti-Hyſtériques, ou *contre les Vapeurs.*

Prenez de l'extrait d'Aloës,
une demi-once ;
du Succin en poudre, deux gros ;

(*a*) *Voyez les Chapitres des Poudres*, pag. 178. *& des Tablettes*, pag. 230.
(*b*) Pag. 230.

du *Caſtoreum* en poudre,
un gros & demi ;;
du *Laudanum* ſolide,
& de l'extrait de Saffran,
de chacun un demi-gros ;;
de l'Huile de Tartre par défaillance,
deux gros.

Mêlez le tout exactement, & formez-en une maſſe de Pilules, dont la doſe ſera de quinze à vingt grains le ſoir en ſe couchant.

La doſe peut ſe réïtérer de douze heures en douze heures ; & on peut la donner dans quelque véhicule que ce ſoit.

Remarque. Quoique la pauvreté & les Vapeurs ne ſéjournent guéres enſemble, & que celles-ci accompagnent ordinairement une vie aiſée, oiſive & ſédentaire, cependant il arrive quelquefois que les Perſonnes du ſexe y ſont ſujettes parmi les Pauvres, ſur-tout lorſqu'à un certain âge les Régles veulent ſe ſuprimer. Ainſi il eſt néceſſaire de les ſoulager par l'uſage de ces Pilules, qu'on peut donner en toute ſureté, excepté dans les tems de Groſſeſſe ou des Régles, où l'on doit s'en abſtenir. L'attention qu'il faut avoir, eſt qu'il y ait trois heures de diſtance du repas, lorſqu'on voudra s'en ſervir, & qu'on ne prenne aucune nourriture que trois heures après. Leur effet eſt de calmer le déſordre des eſprits, d'apaiſer les agitations, les convulſions, la mélancolie ; enfin, de tranquiliſer & de faire dormir.

Pilules Anti-Caterrales contre la Toux nocturne.

Prenez des Pilules de *duobus*,
ou des Pilules cochées-majeures,
une demi-once;
des Pilules de Styrax, un gros;
Mêlez le tout éxactement, & formez des Pilules du poids de six grains chacune, pour en prendre trois ou quatre à l'heure du sommeil.

Remarque. Ces Pilules, qui sont purgatives & calmantes, évacuent la férosité salée, qui se jettant sur la Trachée-artére, occasionne la Toux; elles procurent de plus du sommeil : il faut en faire usage quelques jours de suite, à moins qu'elles n'ayent trop purgé; auquel cas on mettroit un jour d'intervalle entre chaque prise. On aura aussi attention qu'il y ait trois heures de distance entre le souper & le Reméde, & de se contenter d'un potage, si cela se peut.

§. II. DES TABLETTES *.

Tablettes Martiales-apéritives contre les Pâles-Couleurs.

PRenez du Sucre fin, quatre onces.
Faites-les diſſoudre dans l'infuſion de deux gros de Séné.

Faites cuire le tout en conſiſtence de Tablettes, ou autrement dit, à la Plume.

Ajoutez-y alors
de la Canelle en poudre,
une demi-once;
du Saffran de Mars-apéritif,
une once & demie;
ayant ſoin de remuer toujours avec une ſpatule, juſqu'à ce que le tout ſoit cuit en conſiſtence requiſe.

Coulez enſuite votre mêlange ſur une feuille de papier blanc frottée d'Huile d'Amandes douces, & formez-en des Tablettes du poids d'un gros chacune, que vous réſerverez pour l'uſage.

La maniére de s'en ſervir eſt de manger pendant ſeize jours deux de ces Tablettes, une le matin trois heures avant

* *Les* Tablettes *ſont un Médicament de conſiſtence plus ſolide que les Pilules, compoſé de Poudres & de Sucre, que l'on fait fondre dans une liqueur convenable, qui ſert à lier ces Poudres; & que l'on fait cuire juſqu'à la conſiſtence requiſe pour être coupé en Tablettes.*

déjeûner, & l'autre le soir trois heures après le souper.

Il faut se bien nourrir pendant ce tems-là, manger deux potages le jour, ne point faire maigre, & éviter tout ce qui est indigeste.

Notez que les personnes qui se dégoûteront des Tablettes, pourront les incorporer avec le Syrop de fleurs de Pêcher, ou celui de Chicorée composé de Rhubarbe, pour les prendre en Bol dans du pain à chanter.

Remarque. Entre tous les Remédes dont on se sert contre les Pâles-Couleurs, & le défaut déruption des Régles, celui-ci doit être regardé comme un des plus sûrs. Il faut en commencer l'usage par la Saignée du bras & la Purgation: encore si le Sujet est trop foible, on se contentera de cette derniere; mais l'attention qu'il faut avoir surtout, est d'être exact à vivre de régime, & à manger par jour les deux potages que l'on y prescrit. Nous avons vû plusieurs fois que des personnes qui avoient la poitrine bonne, & qui ont voulu vivre à leur fantaisie en prenant ce Reméde, ont été sujettes depuis à des Toux, des Resserremens de poitrine, & des Crachemens de sang: car le fer est contraire à la poitrine; mais il n'y a rien à craindre en observant un bon régime. Il faut aussi observer de faire de l'exercice le plus que l'on pourra, & de surmonter la nonchalance, à laquelle les Filles sont naturellement disposées dans ces sortes d'états.

Tablettes Anti-Aſthmatiques, ou *contre l'Aſthme.*

Prenez de la Craïe blanche lavée, une demi-once;
des Yeux d'Ecreviſſes préparés, deux gros;
de la Poudre de Noix-Muſcade, un ſcrupule;
du Sucre-Candi, trois onces;
de l'Huile de Gérofle, trois ou quatre gouttes.

Mêlez le tout, & faites-en des Tablettes ſuivant l'Art, avec le mucilage de Gomme-Adragant.

La doſe eſt d'un gros, à répéter dans la journée, ſuivant le beſoin.

Remarque. On fait uſage de ces Tablettes dans le même-tems que l'on ſe ſert des Pilules Anti-Aſthmatiques décrites ci-deſſus (*a*). On en mange deux ou trois dans la journée. Comme elles ſont abſorbantes, elles s'empâtent des ſéroſités aigres & glaireuſes qui ſont dans l'Eſtomac, & ſont enſuite précipitées par les Pilules, que l'on prend par-deſſus le ſoir en ſe couchant.

Tablettes Vermifuges-purgatives.

Prenez de la Rhubarbe en poudre, deux gros;

(*a*) *Voyez le Chapitre des Pilules*, pag. 222.

de la Poudre de Jalap, un gros;
de la Coraline,
du *Semen contrà*,
de chacun un ſcrupule;
du Sucre blanc, trois onces.

Faites cuire le tout en conſiſtence de Tablettes, dans une ſuffiſante quantité d'Eau de Pourpier.

La doſe eſt d'un demi-gros pour les Enfans, & d'un gros & demi à deux gros pour les Adultes.

Ces Tablettes peuvent ſe ſubſtituer à nos Pilules vermifuges décrites plus haut (*a*). Voyez ci-deſſus la Remarque ſur la Tiſane contre les Vers (*b*).

Tablettes pectorales.

Prenez de la racine de Guimauve ſéchée & pulvériſée, une once;
du Sucre blanc, quatre onces.

Mêlez le tout, & faites-en des Tablettes avec une ſuffiſante quantité de mucilage de Gomme-Adragant.

Remarque. Ces Tablettes ſont trés-adouciſſantes; elles calment la Toux, diſſipent l'Enrouement, & conviennent dans tous les cas où une ſéroſité âcre & ſalée ſe jette ſur la Poitrine: on peut les ſubſtituer à la Pâte molle de Guimauve qui eſt très-difficile à bien faire, & qui par la cherté dont

(*a*) *Voyez le Chapitre des Pilules*, pag. 221.

(*b*) *Voyez le Chapitre des Tiſanes*, pag. 54.

on la tient dans les Boutiques, ne peut être d'uſage pour les Pauvres.

Nous finirons nos Remarques ſur les Remedes internes, en obſervant que dans les Pays de Vignobles, les Pauvres ſont ſi accoutumés à boire du Vin, depuis les Enfans à la mammelle juſqu'aux Vieillards, qu'il eſt ſouvent impoſſible de leur faire prendre des Remedes, à moins qu'ils ne ſoient mêlés avec cette liqueur; & comme, ſuivant le Proverbe, il faut tirer d'une mauvaiſe Paye tout ce que l'on peut, nous conſeillons d'avoir quelque égard pour cette habitude, & même de la tourner en leur faveur : ainſi lorſqu'il n'y aura pas de raiſon trop marquée pour le défendre, comme Fiévre, Inflammation, &c. on fera bien de leur faire infuſer ou délayer le Reméde à prendre dans un peu de Vin; ce moyen réuſſira toujours mieux que toutes les repreſentations qu'on pourroit leur faire.

SECONDE PARTIE.

REMÉDES EXTERNES.

CHAPITRE PREMIER.

FOMENTATIONS & CATAPLASMES.

§. I. DES FOMENTATIONS. *

Fomentation émolliente.

PRENEZ des feuilles
de Mauve,
de Pariétaire,
de Violier,
de Bouillon-blanc,
de chacune une poignée, ou deux poignées, si vous n'en prenez que de deux especes.

* *La* Fomentation *est un Remède liquide, qui s'aplique à diverses parties, suivant les différentes indications. Elle se compose de décoctions de Racines & d'Herbes propres aux Parties malades. On en fait aussi quelquefois avec le Vin, l'Oxycrat, le Lait, &c.*

Faites-les bouillir dans trois chopines de Lait, & autant d'eau commune, juſqu'à la diminution du tiers.

Trempez-y un morceau de Flanelle, que vous exprimerez enſuite fortement, pour l'apliquer le plus chaudement qu'il ſera poſſible ſur la Partie malade; ce que l'on réïtérera pluſieurs fois le jour.

Remarque. Il faut conſidérer les Fomentations comme une eſpéce de demi-Bain particulier, que l'on peut faire dans tous les tems de l'année avec moins d'apareil que le Bain entier, ou le demi-Bain, & pour quelque maladies de certaines Parties, comme de la tête, à l'égard deſquelles le Bain n'eſt pas praticable. On ſe ſert très-utilement de celle-ci dans les affections du bas-ventre, pour amollir les viſcéres endurcis, pour en tempérer les ardeurs, & en prévenir l'inflammation. Ainſi on ne doit jamais la négliger dans les maladies aigues, ou le bas-ventre eſt tendu & douloureux; & on doit la continuer juſqu'à ce qu'il ait repris ſa ſoupleſſe naturelle, & que les douleurs ſoient tout-à-fait ceſſées. Il faut encore s'en ſervir dans les Tranchées qui ſuivent les Accouchemens, lorſqu'elles menacent de ſupreſſion, enfin dans toutes les Coliques qui ne cédent point aux Lavemens adouciſſans, & dont les ſuites peuvent devenir funeſtes.

L'attention que l'on doit avoir, eſt de ſi bien exprimer l'étoffe de Laine dont on ſe ſert pour la Fomentation, que le Malade n'en puiſſe pas être beaucoup mouillé,

& de ne point la laiſſer refroidir ſur le corps.

Fomentation contre le Rhumathiſme, & les débilités de Nerfs.

Prenez des fleurs de Paſſe-Roſes, apelées *Tourdons*, ſéchées à l'ombre,
deux pincées.

Mettez-les infuſer dans un plat de terre verniſſé, avec de bon Vin rouge qui les ſurnage d'un demi-doigt, & laiſſez-les évaporer ſur les cendres chaudes, juſqu'à ce qu'il reſte peu de Vin.

Baſſinez-en chaudement la Partie malade, & étendez-en le marc ſur une compreſſe, que l'on apliquera ſur l'endroit affecté, réïtérant ce Reméde deux fois le jour.

Ou bien,

Prenez des ſommités fleuries de Tanaiſie, telle quantité qu'il vous plaira.

Faites-les infuſer dans de l'Eau-de-vie dans une bouteille bien cloſe, que vous expoſerez au Soleil pendant un mois.

La maniére de s'en ſervir eſt de bien frotter d'abord avec un linge ſec la partie affectée, pour en ouvrir les pores, & faire que le Reméde pénétre davantage: de la fomenter enſuite de cette Eau, couvrant le tout d'une compreſſe pliée en quatre; ce que l'on repétera deux fois le jour pendant quelque tems, ſe ſervant toujours de la même compreſſe.

Fomentation contre l'Eréſipéle.

Prenez des fleurs de Sureau,
deux poignées.
Faites-les infuſer dans une pinte d'eau bouillante, & fomentez-en la Partie affligée pluſieurs fois le jour.

Remarque. Cette fomentation eſt un des plus ſûrs Remédes que l'on puiſſe employer extérieurement contre l'Eréſipéle: comme elle eſt adouciſſante & tonique, elle diminue l'ardeur brûlante qui ſe fait ſentir dans la Partie affligée, & aide à la tranſpiration de l'humeur qui ſéjourne ſous la Peau, & qui cauſe la maladie. On n'a que trop apris par une triſte expérience, combien les Médicamens onctueux, comme Onguens, Huiles & Mucilages, ſont contraires dans cette maladie, parce que ces Remédes bouchant les portes de la Peau & arrêtant la tranſpiration, gênent le cours du ſang dans la Partie; ce qui y produit bien-tôt une inflammation gangrêneuſe. Il en eſt de même des Remédes aſtringens, froids & répercuſſifs, tels que l'Oxycrat: ces Remédes ſoulagent dans le moment; mais ce ſoulagement coûtent bien cher, lorſqu'il eſt ſuivi de la gangrêne. On n'a rien à craindre de ſemblable de notre Fomentation, qui adoucit l'humeur de l'Eréſipéle, & en facilite l'évaporation. Si l'on manque de fleurs de Sureau, on pourra ſe ſervir de Vin tiéde, & en baſſiner ſouvent l'endroit affecté, laiſſant

dessus une compresse que l'on mouillera de tems en tems.

Fomentation contre le Saignement de Nez.

Prenez du Vinaigre, un demi-septier ;
du Sucre de Saturne,
trois gros.

Mêlez le tout ensemble, & trempez-y à froid des tentes de linge, que l'on introduira dans le Nez.

On versera de plus peu-à-peu de l'Eau froide sur le sommet de la Tête, & on trempera dans cette Eau une compresse que l'on apliquera dessus.

Fomentation Aromatique contre l'enflure des Jambes, & les tumeurs Œdémateuses.

Prenez des Sommités de Lavande,
d'Origan,
d'Absinthe,
de Thim,
de Sauge,
d'Hyssope,
de Romarin,
de chacune une demi-poignée.

Versez sur le tout deux pintes d'Eau bouillante, & laissez infuser pendant deux heures dans un vaisseau couvert.

Ajoutez à la colature une chopine de Vin rouge.

Baſſinez enſuite la Partie chaudement, & apliquez-y le Marc.

Ce Reméde ſe réïtérera pluſieurs jours de ſuite, ſuivant le beſoin.

Notez que ſi l'on manque de quelques-unes des Plantes ci-deſſus, on y ſubſtituera la Camomille & le Mélilot.

Remarque. Cette Fomentation, au moyen des parties ſubtiles & pénétrantes des Plantes que l'on y employe, eſt très-propre pour rétablir le ton des ſolides trop foible & trop relâché : elle excite l'oſcillation des fibres nerveuſes, diſſout les humeurs épaiſſies qui ſéjournent dans l'interſtice des muſcles, & dans le tiſſu de la peau ; & elle en facilite la marche & la circulation. Si l'Œdême eſt conſidérable, & qu'il menace de gangrêne, comme cela arrive quelquefois, on doit y ajoûter deux onces d'Eau-de-Vie camphrée ; & pour lors on ne ſe contente pas de la ſeule Fomentation, mais on envelope encore les Parties œdémateuſes de linges trempés dans cette Eau-de-Vie, que l'on mouille de nouveau dès qu'ils ſont ſecs.

Nota. L'Eau-de-Vie camphrée ſe fait en faiſant fondre une demi-once de Camphe dans une chopine d'Eau-de-Vie.

Fomentation pour apaiſer les douleurs après l'Acouchement.

Prenez des ſommités de Camomille, de

de Mélilot,
de chacune une poignée,
Semences de Fénugrec,
deux gros.

Faites bouillir le tout dans deux pintes d'Eau commune, que vous réduirez à trois chopines.

Trempez-y enſuite un morceau de Flanelle, que vous exprimerez bien, & que vous étendrez ſur le bas-ventre le plus chaudement qu'il ſera poſſible, réitérant cette Fomentation toutes les fois qu'elle ſe refroidira.

Remarque. Cette Fomentation eſt émolliente, anodine & réſolutive; elle eſt très-recommandée contre les Coliques & les douleurs qui ſuivent ordinairement l'Accouchement. Mais comme elle a un peu d'odeur, il n'en faudra pas faire uſage auprès des Femmes qui ſont ſujettes aux Vapeurs; & l'on ſubſtituera en ce cas notre Fomentation émolliente, (*a*) en y ajoutant une poignée de Cerfeuil, & une demi-poignée de graine de Lin.

Fomentation contre la Gangréne.

Prenez des feuilles de Perſicaire douce;
deux poignées.

Faites les bouillir dans une pinte de gros Vin rouge, à la conſomption du tiers.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Fomentations*, pag. 235.

Paſſez enſuite par un linge avec une forte expreſſion, & trempez dans ce Vin des compreſſes, que vous apliquerez chaudement ſur la Partie gangrenée, ou menacée de gangréne, les renouvellant de trois heures en trois heures ;; & ſi elles ſont féches, les mouillant du même Vin avant que de les lever.

On aura ſoin de faire avaler au Malade, dans le tems qu'on baſſinera la plaie, un petit verre chaud de cette même Décoction, dont on aura mis une partie à part pour cet uſage.

Remarque. Ce Reméde eſt un des plus ſûrs dont on puiſſe ſe ſervir pour empêcher la Gangréne, ou pour en arrêter les progrès ; & même ſi l'on s'en ſert de bonne heure, lorſque la Partie en eſt ſeulement menacée, on peut ſe paſſer des Scarifications que l'on emploie ordinairement contre cet accident. On doit y joindre le Bol de Quinquina (*a*), que nous avons indiqué plus haut. Ces deux Remedes unis enſemble produiront un effet plus prompt.

Fomentation contre les excoriations des Enfans par écoulement d'urine, & défaut de propreté.

Prenez les premiers jours du Lait de Vache tiéde, dont on baſſinera les Par-

(*a*) *Voyez le Chapitre des Bols*, pag. 190.

ties excoriées plusieurs fois dans la journée ; & quand la douleur & l'inflammation seront bien diminuées, on se servira d'Eau de Plantain, dans laquelle on mêlera un quart d'Eau de Chaux *. On aura soin de plus de tenir les Enfans proprement, & que leurs linges soient toujours bien secs.

Fomentation contre la Contusion de l'Œil.

Prenez des feuilles d'Hyssope, trois pincées.

Enfermez-les dans un nouet, & faites-les bouillir dans un septier de bon Vin rouge, à la réduction de la moitié.

Fomentez ensuite l'Œil avec le Vin tiéde, & apliquez dessus le nouet en Cataplasme, maintenant le tout avec une compresse & quelques tours de bande ; ce qui se répétera trois fois le jour jusqu'à guérison.

Remarque. Cette Fomentation est très-utile pour dissoudre le sang grumelé, ou extravasé entre les lames de la Conjonctive, ou de la Cornée, & pour lui

* Préparation de l'Eau dé Chaux.

Prenez une demi-livre de Chaux vive, que vous éteindrez dans une terrine avec deux pintes d'Eau chaude. Laissez le tout reposer vingt-quatre heures. Versez ensuite l'Eau par inclination, & gardez-la pour l'usage. C'est ce qu'on apelle Eau de Chaux.

faire reprendre les routes de la circulation ; on peut s'en ſervir non-ſeulement contre la contuſion de l'Œil, mais encore contre les autres meurtriſſures qui peuvent arriver dans quelque Partie du corps que ce ſoit : elle aura toujours un bon effet.

§. II. DES CATAPLASMES *.

Cataplaſme de Mie de Pain.

PRenez de la mie de pain blanc fraiſée, trois onces.

Faites-en une Bouillie claire ſur le feu, avec une chopine de Lait de Vache nouvellement trait, pour un Cataplaſme que l'on renouvellera quatre fois en vingt-quatre heures.

Notez qu'on peut y ajouter un demi-gros de Saffran en poudre, & un ou deux jaunes d'œufs, pour le rendre plus anodin & plus réſolutif.

Remarque. Ce Cataplaſme eſt adouciſſant & réſolutif ; c'eſt-à-dire, qu'il

* *Le* Cataplaſme *ne différe de la fomentation, qu'en ce que le marc des Herbes s'applique ſur la Partie malade, ſoit ſimplement, ſoit paſſé par le Tamis. On y ajoute quelquefois des Poudres, des Farines, des Huiles, ou de la Graiſſe, ſuivant les différentes indications.*

eſt propre pour apaiſer les douleurs, & pour diſſiper les tumeurs phlegmoneuſes. On doit s'en ſervir dans le commencement de l'inflammation des Parties externes, excepté dans l'Eréſipèle.

Cataplaſme émollient & maturatif.

Prenez deux Oignons de Lis cuits ſous la cendre.

Pilez-les dans un mortier de marbre avec deux poignées de feuilles d'Oſeille.

Faites cuire enſuite le tout avec une ſuffiſante quantité de Sain-doux, juſqu'à conſiſtance de Cataplaſme.

Remarque. Ce Cataplaſme eſt propre à ramollir les tumeurs, & à avancer leur ſuppuration, lorſqu'elles veulent abſcéder; on l'etend ſur un linge, & on l'aplique chaudement ſur la Partie, le renouvellant deux fois par jour.

Cataplaſme Anti-Pleurétique, ou *contre la Pleuréſie.*

Prenez un Pot de terre neuf, qui contienne un peu plus de demi-ſeptier.

Mettez y un demi-ſeptier de gros Vin rouge, & faites-y infuſer enſuite ſur les cendres chaudes pendant deux heures deux onces de Tabac à machicatoire bien effeuillé; ou quatre onces de Tabac ordinaire: puis retirez le Pot, & ajoutez y la groſſeur d'un œuf de Poix de Bourgogne, ou à ſon défaut de Poix noire

coupée par morceaux ; remettez le tout ſur les cendres chaudes pendant une demi-heure, le remuant toujours avec un petit bâton.

La maniére de ſe ſervir de ce Remede, eſt de l'étendre ſur de la filaſſe, & de l'apliquer ſur le côté douloureux, l'aſſujettiſſant par une compreſſe & une ſerviette. On le laiſſe vingt-quatre heures ſans faire aucun Remede, excepté que l'on donne au Malade du Bouillon, du Lohoch & de la Tiſane : on léve le Cataplaſme après les vingt-quatre heures, évitant de le ſentir. Il eſt bon de ſaigner deux fois avant d'apliquer ce Topique, afin que le ſang engagé dans la Pleure puiſſe ſe prêter plus facilement à l'action du Remede, & rentrer dans les voies de la circulation.

Cataplaſme Anti-Pleurétique de l'Hôpital de la Charité de Paris.

Prenez du poivre long,
& du Gingembre pulvériſé,
de chacun une demi-once.

Mêlez ces deux Poudres avec une ſuffiſante quantité de blancs d'œufs, & faites-en un Cataplaſme qu'il faudra mettre ſur des étoupes, & apliquer enſuite tout chaud ſur le côté où eſt la douleur.

Remarque. Les deux Cataplaſmes ci-deſſus agiſſent pour la même fin ; ils atténuent le ſang extravaſé ſur la Pleure, l'obligent à reprendre le fil de la circu-

lation, & par-la calment la douleur & le Point de côté, qui eſt le ſymptôme le plus urgent de la Pleuréſie. On peut les répéter s'il en eſt beſoin. De tous les Topiques que nous avons employés en différentes occaſions, ceux-ci nous ont paru ceux ſur leſquels on pouvoit le plus compter.

Nous pouvons encore mettre de ce nombre, un Pigeon ou Pigeonneau vivant, fendu par le dos, & apliqué ſur le côté douloureux, où on le laiſſe quinze heures & plus, juſqu'à ce que l'odeur en ſoit inſuportable au Malade, le maintenant avec une compreſſe & une ſerviette autour du corps.

On trouvera ci-deſſus à l'Article de l'Apozême contre la Pleuréſie (*a*), les autres Remédes qui doivent accompagner leur uſage.

Cataplaſme de Bec-de-Grue contre l'Eſquinancie.

Prenez du Bec-de-Grue, apelé *Herbe à Robert*, une poignée;
de l'Eau commune,
du Vinaigre;
de chacun trois cuillerées.

Mêlez le tout, & faites-le chauffer ſur un plat de terre, en froiſſant l'herbe, juſqu'à ce qu'elle ſoit ſuffiſamment imbibée, pour un Cataplaſme, que l'on apliquera chaudement ſur la gorge, le

(*a*) *Voyez le Chapitre des Apozêmes*, pag. 3.

maintenant avec une compreſſe & quelques tours de bande.

On réitérera ce Remede au bout de huit heures, s'il eſt néceſſaire.

Remarque. Ce Cataplaſme eſt aſtringent, mais d'une façon tempérée ; ainſi pour être utile dans l'Eſquinancie, il doit être employé dès le commencement. On trouvera encore dans ce Livre un Lohoch, une Poudre & un Gargariſme propres contre la même maladie (*a*). Il faut faire uſage de tous ces Remedes en même-tems. L'Eſquinancie eſt une maladie violente, qui ne donne point de tréve ; il faut employer pour la guérir toutes les reſſources de la Médecine ; la Saignée copieuſe & ſouvent répétée en eſt la principale.

Cataplaſme contre la Rétention d'Urine.

Prenez trois Oignons blancs, & autant de jaunes d'œufs.

Hachez les Oignons, & mêlez-les avec les œufs.

Faites cuire le tout dans une Poële, ou ſur une Pelle chaude, en conſiſtance de Cataplaſme.

Mettez-le enſuite entre deux linges, & apliquez-le chaudement ſur la région de la Veſſie.

Ce Reméde ſe réitére au bout de

(*a*) *Voyez les Chapitres des Lohochs*, p. 159. *des Poudres*, p. 172. *& des Gagarijmes*, 281.

trois heures, s'il ne réuſſit pas la premiére fois.

Remarque. Lorſque le cours des Urines ſera rétabli par l'aplication des Remedes convenables comme la Saignée, les demi-Bains, les Potions huileuſes, & le Cataplaſme ci-deſſus, on ſera uſage d'une de nos deux Opiates contre la Néphrétique décrites plus haut (*a*), pour empêcher la récidive.

Cataplaſme contre l'Œdéme & l'enflure des Jambes.

Prenez des feuilles d'Hyéble, deux poignées.
Envelopez-les dans du papier mouillé, & mortifiez-les ſous les cendres chaudes.
Pilez-les enſuite, en les arroſant d'Eau-de-vie, & faites-en un Cataplaſme, à apliquer ſur la partie affectée; ce qui ſera renouvellé deux fois le jour.

Cataplaſme contre les Engorgemens inflammatoires des Mammelles.

Prenez des feuilles de Pariétaire, une poignée.
Pilez-les, en y mêlant peu à-peu de la mie de Pain bien frailée, deux onces.
Faites-en un Cataplaſme avec une ſuffiſante quantité d'Huile de Lis, ou de

(*a*) *Voyez le Chapitre des Opiates*, pag. 211 *& ſuiv.*

Camomille, lequel on renouvellera, s'il en eſt beſoin.

Remarque. Rien n'eſt ſi commun aux nouvelles Accouchées parmi les Pauvres, que de prendre des friſſons au ſein, ſoit par négligence de ſe couvrir, ſoit pour s'expoſer inconſidérément & trop-tôt à l'air froid ; nous n'avons pas trouvé contre cet accident de meilleur Remede que le Cataplaſme ci-deſſus : il réſout le grumellement du lait dans les Mammelles, lorſque l'inflammation n'eſt pas violente ; & lorſqu'elle eſt trop avancée, il l'amène doucement à ſupuration, & en calme la douleur. Dans ce dernier cas, on doit ſe ſervir de l'Onguent contre les Humeurs froides décrit ci-deſſous (*a*), pour panſer la Mammelle juſqu'à guériſon.

Cataplaſme pour prévenir l'Avortement.

Prenez des racines de Chardon-Roland lavées & concaſſées, deux poignées.

Faites-les bouillir dans une ſuffiſante quantité de Vin rouge, pour les cuire en conſiſtance de Cataplaſme, que l'on apliquera chaudement ſur la région de la Matrice ; le couvrant d'un linge plié en quatre.

Ce Cataplaſme ſe renouvellera huit heures après, & on le répétera pluſieurs fois ſuivant le beſoin, & juſqu'à ce que la perte ou les douleurs ſoient ceſſées.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Onguens*, pag. 287.

Voyez ci-deſſus notre Remarque ſur le Julep pour prévenir l'Avortement (*a*).

Cataplaſme contre les Régles immodérées.

Prenez des feuilles de Tabouret,
ou Bourſe à Paſteur,
& de Plantain,
de chacune une poignée.

Arroſez-les de Vinaigre, en les pilant dans un mortier.

Faites les cuire dans une Poële en conſiſtance de Cataplaſme, que vous apliquerez le plus chaudement qu'il ſera poſſible ſur le Pubis.

Remarque. Ce Cataplaſme qui eſt Vulnéraire-aſtringent, arrête inſenſiblement les Hémorragies de la Matrice. Il faut le répéter quelques jours de ſuite, & faire uſage en même-tems de la Décoction contre les mois immodérés, ou des Bouillons contre l'Hémoptiſie decrits ci-deſſus (*a*).

Cataplaſmes contre les Loupes.

Prenez des feuilles de grande Bardane,
une poignée.

Faites-les bouillir dans une chopine d'Urine, à la réduction de la moitié.

Paſſez par un linge, & faites fondre

(*a*) *Voyez le Chapitre des Juleps*, pag. 154.
(*b*) *Voyez les Chapitres des Décoctions*, pag. 22. *& des Bouillons*, pag. 73.

dans cette Urine, ſur un petit feu, une once de Sel commun, réduiſant le tout en conſiſtance de Miel épais ; étendez de ce mélange ſur des étoupes ou ſur une compreſſe, pour l'apliquer en Cataplaſme, que vous renouvellerez ſoir & matin.

Ou bien,

Prenez ſix œufs frais, caſſez-les avec les coquilles dans une ſuffiſante quantité de bon Vinaigre. Battez le tout, & le laiſſez repoſer pendant un jour, pour que les coquilles aient le tems de ſe diſſoudre. Levez enſuite la peau qui ſe forme deſſus, que vous rejetterez comme inutile. Mettez le reſte ſur un petit feu juſqu'à ce qu'il ait acquis la conſiſtance de Miel épais ; étendez une partie de ce mêlange ſur des étoupes, ou de la charpie ; & apliquez le chaudement ſur la Loupe, le renouvellant tous les jours juſqu'à guériſon.

Il faut avoir ſoin de bien manier la Loupe auparavant, pour l'échauffer & la ramollir.

Il y a encore ci-deſſous un Onguent noir qui nous a très bien réuſſi contre les Loupes ; on conſultera ſon Article (*a*),

Cataplaſme contre la Goutte remontée.

Prenez de la racine de Raifort ſauvage,
de l'Ail,
des ſommités de Rue,

(*a*) *Voyez le Chapitre des Onguens*, pag. 288.

& de la fiente de Pigeon,
de chacune une once.

Pilez le tout dans un mortier, en l'arroſant de Vinaigre ; ajoutez-y ſur la fin de bonne Moutarde à manger,
trois onces.

Faites du tout un Cataplaſme, à apliquer ſous la plante des pieds, que l'on renouvellera lorſqu'il ſera ſec.

Si l'on manque de Moutarde préparée, on prendra deux onces de vieux Levain, & une once de graine de Moutarde : on pilera la graine de Moutarde, en l'arrolant de Vinaigre, on y ajoutera le Levain, & on achevera le Cataplaſme comme il eſt dit ci-deſſus.

Cataplaſme contre la Chûte du Fondement.

Prenez de la racine de grande Conſoude,
ratiſſée & pilée,
& de la farine de Féves,
de chacune parties égales.

Formez-en un Cataplaſme avec une ſuffiſante quantité de gros Vin noir, ou d'Eau de Forgeron.

Ou bien,

On peut ſe contenter de boucher le Fondement avec un tampon de Coton imbibé de gros Vin rouge, ou de Vinaigre, mêlé avec autant d'Eau, dans laquelle on aura fait bouillir des Roſes rouges. Cela ſuffit quelquefois.

Cataplasme contre les Vers.

Prenez des feuilles d'Absinthe, une poignée.

Faites-les bouillir dans du Lait avec trois gousses d'Ail, en consistance de Cataplasme, que vous apliquerez sur le Nombril, en l'assujettissant avec une compresse & une serviette.

Remarque. Ce Cataplasme est excellent contre les Vers, & réussit quelquefois mieux que les Remedes internes. Il sera plus sûr cependant d'y joindre quelques Purgations, & l'usage de notre Bol & Tisane vermifuges (*a*), afin que cette Vermine attaquée en dedans & en dehors, soit obligée de quitter la place.

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tisanes*, pag. 55. *& des Bols*, pag. 194.

CHAPITRE II.

LINIMENS ou *ONCTIONS* *.

Liniment contre les Rhumatismes.

PRENEZ des Huiles de Camomille, de Millepertuis,

* *Le* Liniment *ou* l'Onction, *est un Remede d'une consistance moyenne entre l'Huile & l'Onguent. Il se compose d'Huile, de Beurre, de Graisse, de Moëlle, d'Onguent, & de Poudres.*

de l'Eſprit de Vin camphré,
de chacune une demi-once.

Mêlez le tout, & faites-en une Onction ſur la Partie affectée, la couvrant d'un linge bien chaud plié en quatre.

Ou bien,

On peut ſe ſervir de l'Urine chaude d'une perſonne ſaine, dans un verre de laquelle on fait fondre du Suif de chandelle, en formant du tout un Liniment clair, dont on frotte chaudement la partie malade, l'envelopant d'un linge.

Remarque. Ce Liniment eſt fortifiant, anodin & réſolutif. Il convient lorſque le Rhumatiſme dépend d'une ſéroſité extravaſée dans l'interſtice des muſcles, ou d'un engorgement limphatique œdémateux : mais ſi le Rhumatiſme eſt accompagné de Fiévre & de chaleur, il faudra s'en abſtenir, & y ſubſtituer le Cataplaſme de mie de Pain décrit ci-deſſus, ou celui des Plantes émollientes (*a*).

Liniment contre la Paralyſie, & les débilités de Nerfs.

Prenez de l'Huile de Vers de terre, trois onces;
de l'Eſprit de Vin camphré, une once;
de l'Huile de Térébenthine, une demi-once;

(*a*) *Voyez le Chapitre des Cataplaſmes* pag. 244. & 245.

de l'Eſprit de Sel Ammoniac, un gros.

Mêlez le tout pour un Liniment.

Notez que l'Eſprit de Vin camphré ſe fait, en faiſant fondre un demi-gros de Camphre dans une once d'Eſprit de Vin: on expoſe le tout au ſoleil dans une phiole éxactement bouchée, juſqu'à ce que le Camphre ſoit diſſous.

Remarque. Ce Liniment eſt très-bon contre la Paralyſie, la Sciatique, & toutes ſortes de Rhumatiſmes. Il faut faire l'Onction devant le feu, & frotter d'abord la Partie avec un linge ſec, afin qu'elle pénétre davantage; & on doit la réitérer ſuivant le beſoin: que s'il ſurvient une Eriſipéle, comme cela arrive quelquefois, il faudra ajouter au Liniment un peu d'Huile d'Amandes douces pour en modérer l'activité.

Liniment contre les Contuſions & douleurs internes venant de chûtes, ou de coups reçus.

Prenez de l'Huile Roſat,
de Laurier,
de chacune une once.

Mêlez-les enſemble, & ajoutez-y une ſuffiſante quantité d'Eſprit de Vin, pour faire un Liniment clair, dont on frottera la Partie trois fois le jour, la couvrant d'un papier brouillard, & d'une compreſſe pliée en quatre.

Voyez ci-deſſus la Remarque ſur la

ot ion vulnéraire contre les chûtes & Contuſions, pag. 110.

Liniment contre les Hémorroïdes gonflées & douloureuſes.

Prenez de la Graiſſe de Porc non ſalée, *ou* du Sain-doux, une once
une Coquille d'Huître calcinée, & réduite en poudre.

Mélez le tout éxactement, & faites-en une Onction ſur les Hémorroïdes le ſoir en vous couchant ; ce qui ſe répétera pendant quelques jours.

Ou bien,

Prenez de bonne Huile d'Olive, la quantité qu'il vous plaira.

Empliſſez-en à moitié une bouteille, que vous acheverez de remplir de fleurs de Bouillon blanc.

Expoſez au Soleil la bouteille bien bouchée, juſqu'à ce que le tout ait acquis une conſiſtance de bouillie, pour vous en ſervir en Liniment.

Remarque. Les deux Linimens ci-deſſus ſont très-adouciſſans, & apaiſent en peu de tems la douleur des Hémorroïdes ; on doit joindre à leur uſage l'Opiate contre les Hémorroïdes, décrite ci-deſſus (*a*).

(*a*) *Voyez le Chapitre des Opiates*, pag. 214.

Liniment Anti-Scorbutique, ou *contre le Scorbut.*

Prenez du Sang-Dragon,
des Santaux,
du Corail rouge préparé,
de la Graine d'Ecarlate,
& de l'Alun de Roche,
de chacun deux gros.

Pulvérisez le tout, & mêlez-le avec trois onces de Miel-Rosat clarifié.

Faites-le cuire ensuite en consistance d'Electuaire liquide. On étendra de ce mêlange sur de petits morceaux de toile claire, crue & déliée, que l'on apliquera sur les gencives le soir en se couchant, en continuant pendant du tems.

Remarque. Ce Liniment raffermit les gencives, & resserre les dents dans leurs alvéoles. Voyez ci-dessus la Remarque sur l'Apozême contre le Scorbut, pag. 7.

Liniment contre les entorses & les foulures de Tendons & de Nerfs.

Prenez de l'Huile de Lin, trois onces;
de la Cire jaune, une once;
du Sang-Dragon,
un gros & demi;
du Camphre,
de l'Alun,
la Pierre Hématite,
de chacun deux gros;

du *Laudanum* ſolide,
trente grains.

Faites fondre la Cire dans l'Huile de Lin ſur un petit feu, & faites une Poudre du Sang-Dragon, de l'Alun, & de la Pierre Hématite, que vous incorporerez dans la Cire & l'Huile à demi refroidies; ajoutez-y enſuite le *Laudanum*, & le Camphre diſſous auparavant dans un peu d'Eſprit de Vin.

Remarque. Ce Liniment eſt un excellent Remede contre les entorſes & toutes les foulures, même invétérées; il fortifie les nerfs, calme la douleur, & diſſout le ſang extravaſé: il faut en oindre la Partie bleſſée, & mettre par-deſſus une compreſſe trempée dans l'Eau froide; ce que l'on réïtérera tous les jours, juſqu'à guériſon.

Liniment contre le Rachitis, ou *la Noueure des Enfans.*

Prenez de la Moelle de Bœuf,
de l'Urine d'une perſonne ſaine,
& du Vin rouge,
de chacun deux onces.

Faites cuire le tout à un feu très-lent, juſqu'à l'évaporation de preſque toute l'humidité.

Coulez, & ajoutez à ce mêlange chaud
de l'huile de Vers de terre,
une demi-once;
du Blanc de Baleine, deux gros;

de l'Huile de Noix muſcade,
un gros.

Mêlez le tout enſemble, pour un Liniment, dont on frottera l'Epine du dos dans toute ſa longueur.

Liniment contre les Galles du Nez des Enfans.

Prenez un peu de Beurre frais.

Faites le fondre, & l'ayant écumé, jettez-le dans l'Eau froide, & ſervez-vous-en pour mettre dans le Nez; ce qu'on répétera deux fois le jour, juſqu'à guériſon.

Ou bien,

Prenez du Blanc de Baleine, un gros.

Diſſolvez-le dans un peu d'Huile Roſat, pour faire un Liniment à ſervir comme ci-deſſus.

Liniment contre la Vermine, & les différens Inſectes qui attaquent le corps humain.

Prenez de l'Huile de Lavande,
une once;
de celles d'Amandes douces,
une demi-once.

Mêlez le tout, pour un Liniment.

Remarque. Les Mites, les Pous, & d'autres Inſectes, ont en averſion l'odeur de ce Liniment; & comme rien n'eſt ſi commun chez les Pauvres, que toutes ces Vermines, qui ſe communiquent facilement

à ceux qui les aprochent, nous avons cru qu'un Reméde qui les détruiroit, ne seroit point ici hors de place, & qu'on pourroit quelquefois en faire usage. La façon de s'en servir est d'en imbiber une feuille de papier brouillard, & de bien frotter avec cette feuille les endroits attaqués, le soir en se couchant; cela chassera, on ne peut mieux, tous ces Insectes, & on les trouvera morts le lendemain.

Liniment contre la Teigne.

Prenez des Baies de Géniévre bien mûres, telle quantité qu'il vous plaira.

Pilez les, & faites-les bouillir avec du Sain-doux.

Passez ensuite par un linge avec expression, & gardez ce Liniment pour l'usage.

On commencera par laver la tête avec une forte Décoction de Feuilles & de Racines de Mauve, & de Guimauve, faite dans l'Urine d'une personne saine.

On fera ensuite l'Onction, couvrant la Tête d'un papier brouillard; & on réïtérera la même chose tous les jours.

Remarque. Il ne faut pas manquer avant l'usage de ce remede, de saigner & purger le Malade: on doit de plus lui faire prendre pendant le traitement le Bol contre la Galle décrit ci-dessus, & la Tisane de Patience sauvage (*a*), le premier

(*a*) *Voyez les Chapitres des Tisanes*, pag. 42. & *des Bols*, pag. 188.

trois fois la ſemaine, & la Tiſane à trois verres par jour, finiſſant le traitement par une ſeconde Purgation : il ſeroit à craindre que faute de ces précautions, l'humeur ne trouvant plus d'iſſue du côté de la Tête, ne ſe jettât ſur quelque viſcére eſſentiel à la vie, & ne causât un deſordre pire que la premiére maladie.

Liniment contre le relâchement, ou *la chûte de la Luette.*

Prenez de la noix de Galle,
de l'Alun,
du Poivre,
de chacun un ſcrupule.

Pulvériſez le tout, & mêlez-le avec un peu de blanc d'œuf, pour en toucher la Luette avec le manche d'une cuillier deux ou trois fois dans la journée.

Remarque. Ce Liniment eſt aſtringent & réſolutif : il affermit les fibres de la Luette relâchée, & il inciſe la lymphe viſqueuſe qui y produit quelquefois du gonflement ; mais ſi ce gonflement eſt accompagné d'inflammation, il ne faudra pas s'en ſervir ; & l'on y ſubſtituera le Gargariſme rafraîchiſſant décrit ci-deſſous (*a*).

Liniment contre le Panaris.

Prenez le jaune d'un œuf frais,

(*a*) *Voyez le Chapitre des Gargariſmes*, pag. 278.

la moitié d'un dé à coudre de Sel commun.

Pulvérisez le Sel, & faites-le fondre dans le jaune d'œuf, en agitant ces deux ingrédiens, jusqu'à ce qu'ils soient bien mêlés.

Faites ensuite un Liniment sur le doigt, que vous enveloperez de linge, le renouvellant de douze heures en douze heures, jusqu'à la guérison qui sera prompte.

Remarque. Ce Reméde qui est très-simple, est un des plus sûrs contre les Panaris; la personne de qui nous le tenons, nous a assuré en avoir guéri nombre de la derniére conséquence par son seul usage, & qu'elle a bien sauvé des doigts de l'amputation, qu'on étoit sur le point d'en faire. C'est une guérison bien fâcheuse, que celle qui ne s'obtient que par la destruction d'une partie de nous-mêmes; & l'on ne peut trop louer les Remédes Chirurgicaux qui guérissent sans le triste secours des opérations.

CHAPITRE III.

COLLYRES & GARGARISMES.

§. I. DES COLLYRES *.

Collyre rafraîchissant contre la rougeur des Yeux.

PRenez des Eaux de Plantain,
de Morelle,
de chacune une once ;
de la Poudre de Tuthie préparée,,
vingt grains ;;
du Sel de Saturne, douze grains.

Mêlez le tout, pour un Collyre, que l'on fera tiédir, & dont on baſſinera les Yeux trois ou quatre fois dans le jour.

Ou bien, s'il y a chaſſie,
Prenez des Eaux d'Euphraiſe ;
de Fenouil,
de chacune une once,
de la Tuthie préparée,
dix-huit grains ;
du Vitriol blanc, quatre grains.

Mêlez le tout, pour un Collyre, dont on laiſſera tomber quelques gouttes dans l'œil deux ou trois fois le jour.

Remarque. Le premier des deux Collyres

* *Le* Collyre *eſt un Remede externe, propre & particulier pour guérir les maladies des Yeux.*

lyres ci-deſſus convient dans les ulcéres & la demangeaiſon des Paupieres ; dans les Ophthalmies invétérées, & pour guérir les Yeux larmoyans, & menacés de fiſtule : il abſorbe & adoucit l'acrimonie corroſive des humeurs qui ſe jettent ſur les yeux ; ce qui lui a fait donner le nom de rafraîchiſſant : le ſecond eſt plus déterſif, & doit être préféré lorſque des humeurs épaiſſes & gluantes collent les bords des paupiéres ; il les nettoie, & les deſſeche promptement.

Collyre contre l'Ophthalmie, ou *inflammation des Yeux commençante.*

Prenez de la Pulpe, ou moelle d'une Pomme grillée devan le feu.

Délayez-la dans un peu de Lait, & ajoutez-y une demi-pincée de poudre de Saffran, pour apliquer chaudement ſur les yeux malades.

Ou bien,

Servez-vous du Cataplaſme de mie de pain & de Lait (*a*), ou de la décoction de Racine de Guimauve, dont on ſe baſſinera pluſieurs fois dans la journée, y trempant des compreſſes que l'on apliquera ſur l'œil malade.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Cataplaſmes* pag. 240.

Collyre contre la Rougeur, Chaſſie, Taie, & Ulcéres des Yeux.

Prenez de la Couperoſe blanche, un ſcrupule ;
du Verd-de-gris, huit grains.

Verſez ſur le tout trois ſeptiers d'eau chaude, & gardez la liqueur pour l'uſage.

La façon de s'en ſervir éſt d'en faire tomber deux ou trois fois le jour quelques gouttes dans l'œil malade, ayant ſoin de remuer la bouteille auparavant.

Ou bien,

Prenez de l'Eau-Roſe, quatre onces.

Diſſolvez-y un peu de Sel Ammoniac, de maniére que la Langue en ſente l'acrimonie ; ce qui peut aller à deux ſcrupules, ou un gros.

Verſez enſuite la Liqueur dans un vaiſſeau de Cuivre, & l'y laiſſez juſqu'à ce qu'elle ait pris une legére couleur bleue ; retirez-la alors, & gardez-la dans une Bouteille pour l'uſage.

La maniére de s'en ſervir, eſt d'en laiſſer tomber quelques gouttes dans l'œil, deux ou trois fois le jour, & de continuer juſqu'à ce que la tache ſoit diſſipée : ſi elle cauſe trop de cuiſſon, on y ajoutera un peu d'Eau-Roſe, pour en modérer l'activité.

Collyre contre l'Ulcére de la Cornée.

Prenez du Miel commun,

& du Jus d'Oignon,
de chacun parties égales.

Mêlez-les enſemble, & faites-en couler quelques gouttes dans l'œil deux fois le jour ; & trempez dedans une compreſſe, pour apliquer deſſus, que vous renouvellerez deux ou trois fois dans les vingt-quatre heures, vous ſervant toujours de la même compreſſe.

Collyre contre la foibleſſe & la rougeur des Yeux.

Prenez de la Tuthie préparée,
une demi-once ;
de la Pierre Hématite préparée, un ſcrupule ;
du meilleur Aloës préparé,
ſix grains ;
des Perles préparées,
deux grains.

Mêlez le tout avec une ſuffiſante quantité de graiſſe de Vipére, dans un Mortier de verre, dont le Pilon ſoit de la même matiére, & faites-en ſoir & matin un Liniment au bord des Paupiéres avec un petit Pinceau.

Remarque. Ce Collyre, dont on a éprouvé pluſieurs fois les bons effets, doit être précédé d'une Saignée, d'un Véſicatoire à la nuque du cou, ou derriére les oreilles, dont on entretiendra le ſuintement pendant un mois, & de quelques Purgations, afin de donner une iſſue à l'humeur qui ſe jette ſur les yeux : ce qui entretient la ma-

ladie : ſans cela point de guériſon à eſpe-
rer. Le Collyre ſoulagera bien pour un
tems ; mais le vice interne ſubſiſtant tou-
jours, on ne manquera pas d'eſſuyer de
fréquentes récidives. Si même malgré ces
précautions, les yeux venoient à être affli-
gés de nouveau, l'unique Reméde ſeroit
un Cautére qu'il faudroit tenir ouvert
toute ſa vie : un organe auſſi précieux
que la vue, mérite bien qu'on s'aſſujet-
tiſſe à une legere incommodité pour ſa
converſation.

---

§. II. DES GARGARISMES*.

Gargariſme rafraîchiſſant,

PRenez de l'Orge entier, deux pincées
Faites-les bouillir dans trois ſeptiers
d'eau commune, que vous réduirez à une
chopine.

Coulez le tout ; & ajoutez-y
du ſyrop de Meures, une once & demie
du Criſtal Minéral, un gros
Pour un Gargariſme, dont on ſe ſervira
pluſieurs fois le jour.

* *Le* Gargariſme *eſt un Reméde liquide, que*
l'on garde dans la bouche, pour en gargariſer
quelque-tems le Goſier.

Gargariſme adouciſſant contre le Chancre, & les petits Ulcéres de la bouche & du Goſier.

Prenez ſix Figues graſſes.

Faites les bouillir dans une chopine de Lait, & un ſeptier d'eau commune, que vous réduirez en tout à une chopine, pour un Gargariſme, dont on ſe ſervira pluſieurs fois le jour.

Notez qu'on y peut ajouter une once de Miel commun, ou de Miel Roſat, ſi on veut le rendre déterſif.

Gargariſme contre la Paralyſe de la Langue, & du Goſier.

Prenez des feuilles de Méliſſe,
de Bétoine,
de Romarin,
de chacun une poignée,
des Fleurs d'Oeillet,
de Lis des Vallées,
ou Muguet,
de chacune une pincée.

Faites infuſer le tout ſur les cendres chaudes dans trois ſeptiers de bon Vin rouge, dans un vaiſſeau fermé, pour un Gargariſme, à répéter pluſieurs fois dans la journée.

Gargarisme Anti-Scorbutique, ou *contre le Scorbut.*

Prenez des feuilles de Ronce,
d'Aigremoine,
de chacune une poignée;
Faites-les bouillir dans une pinte d'eau commune, que vous réduirez à trois septiers.

Ajoutez-y un moment avant que de retirer le vaisseau du feu,
des feuilles de *Cochlearia*,
un poignée.

Passez le tout avec expression, & ajoutez-y
du Miel Rosat, une once.

Pour un Gargarisme, à répéter plusieurs fois le jour.

Gargarisme contre l'inflammation des Amygdales.

Prenez des Roses d'outremer rouges, apelées Passeroses, ou Bourdons,
une demi-poignée.

Faites-les bouillir legérement dans trois septiers de Lait, que vous réduirez à une chopine.

Coulez la liqueur, pour vous en gargariser plusieurs fois le jour.

Remarque. Ce Gargarisme est très-adoucissant; il resserre par une douce astriction les parties du gosier gonflées par l'abon

dance de l'humeur qui s'y porte, & empêche le dépôt qui tend à s'y former.

Gargarisme contre l'Esquinancie Œdémateuse.

Prenez huit navets de moyenne grosseur, & autant de Carottes : après les avoir lavés & ratissés, faites-les bouillir dans trois peintes d'eau, que vous réduirez à la moitié ; passez ensuite par un linge, & ajoutez du Sel végétal, une once. Le Malade se gargarisera souvent dans la journée avec cette décoction tiéde, & l'on apliquera le marc entre deux linges autour de la gorge, le plus chaudement qu'il sera possible.

Remarque. Ce Gargarisme est fondant & résolutif : il divise les humeurs visqueuses & épaisses, qui abreuvent les Amygdales & les Glandes du gosier dans cette espéce d'Esquinancie ; mais il ne conviendroit pas, si elle étoit inflammatoire : il faut en faire usage très-souvent dans la journée, & employer en même-tems le Lohoch contre l'Esquinancie décrit ci-dessus *(a)*.

(a) Voyez le Chapitre des Lohochs, pag. 159.

CHAPITRE IV.

ONGUENS & EMPLATRES.

§. I. DES ONGUENS. *

Onguent contre la Goutte Sciatique, & les Rhumatiſmes.

PRenez du Savon noir, quatre onces. Faites-le fondre ſur une aſſiette, en y mêlant un bon verre d'Eau-de-vie.

Remuez le tout ſur un feu doux, juſqu'à ce qu'il ſoit réduit en conſiſtance d'Ongent.

On en frotte la Partie douloureuſe auſſi chaudement qu'il ſe peut, & l'on aplique par-deſſus le linge qui a ſervi à la friction, maintenant le tout avec une bande.

Remarque. Cet Onguent eſt excellent contre la Sciatique, & toutes les autres affections Rhumatiſantes, pourvû qu'elles ne ſoient point accompagnées de fiévre. Il fond & réſoud les féroſités qui ſe dépoſent ſur les Parties, & il eſt extrêmement pénétrant. S'il arrivoit par hazard qu'il

* *L'*Onguent *eſt un Reméde externe, qui ſe compoſe d'Huile, de Graiſſe, de Moëlle, de Réſine, de Poudres, de Cire, & d'autres choſes ſemblables, que l'on réduit en une conſiſtance plus ferme que le Liniment.*

occaſionnât une Eréſipéle à la Partie ſur laquelle on l'auroit apliqué, il faudroit en ſuſpendre l'onction, & baſſiner l'endroit avec une infuſion de fleurs de Sureau dans l'eau ou dans le lait ; après quoi l'on y reviendroit, en faiſant les onctions plus legéres. On pourroit auſſi, pour empêcher le Reméde d'agir avec tant de chaleur, mettre dans l'Eau-de-vie une quatriéme partie de vin, ou un peu d'eau commune.

Onguent contre la Galle, Gratelle & Demangeaiſons.

Prenez du Beurre, ou de la Graiſſe de Porc récente, une livre ;
de la Céruſe, une demi-livre,
du Mercure-Sublimé, corroſif, ſix gros.

On nettoyera la graiſſe des peaux avec leſquelles elle eſt mêlée, & on la lavera pluſieurs fois dans l'eau : on la fera fondre enſuite par un feu lent dans un plat de terre verniſſé ; puis on mêlera peu-à-peu avec un Biſtortier la Céruſe avec le Sublimé, qu'on aura auparavant réduits en poudre ſubtile : on agitera l'Onguent, juſqu'à ce que les ingrédiens ſoient bien unis ; puis on le gardera pour le beſoin.

La maniére de ſe ſervir de cet Onguent, eſt d'en frotter les Galles trois ou quatre jours de ſuite en ſe couchant.

Remarque. L'Onguent ci-deſſus eſt propre contre la Galle, la Gratelle, les Dartres, & les autres demangeaiſons de la

peau. On en frotte toutes les Parties du corps galleuſes, excepté la tête & la poitrine : il faut ſeulement avoir ſoin de ne jamais employer ce Réméde avant que d'avoir bien préparé le Malade, ſoit par la Saignée, ſoit par la Purgation plus ou moins réitérées, ſoit même par des Bouillons ou des Apozêmes délayans & apéritifs, que nous avons preſcrits plus haut, (*a*) afin de corriger & d'évacuer les humeurs âcres & vicieuſes qui corrompent le ſang, & qui empêchent qu'on n'en puiſſe rétablir la conſtitution. Car il y auroit du danger d'arrêter tout-à-coup par des Remédes topiques les mauvais ſucs, que le ſang a coutume de chaſſer par les pores de la peau, parce que ces ſucs étant portés dans les parties internes, y formeroient des embarras, & y cauſeroient des maladies ſouvent pires que celle qu'on veut guérir. Combien ne voyons-nous pas tous les jours de maux, pour avoir fait rentrer trop-tôt & imprudemment la Galle & les autres vices de la peau, par des Remédes apliqués à l'extérieur, tandis que l'on néglige les Remédes internes !

Une autre attention qu'il faut avoir, c'eſt de préparer cet Onguent au moment que l'on veut s'en ſervir, afin d'éviter de garder du Sublimé-corroſif en nature, qui eſt un poiſon des plus terribles pris intérieurement, & dont il eſt

(*a*) *Voyez les Chapitres des Apozêmes*, pag. 11. & 14. & *des Bouillons*, pag. 73.

arrivé quelquefois des accidens funeſtes, pour en avoir goûté par mégarde & ſans le connoître : ainſi un Particulier n'en doit jamais prudemment tenir chez ſoi.

Quant à l'uſage extérieur de ce Reméde contre les maladies de la peau, comme nous le preſcrivons ici, il n'y a rien à en craindre ; il n'agit que ſuperficiellement, en rongeant les petites Galles, & en les deſſéchant, ſans pénétrer dans la maſſe du ſang. C'eſt ce que l'expérience nous a prouvé depuis pluſieurs années ; & nous n'en avons jamais vû que de bons effets. Comme cet Onguent eſt blanc, & qu'il ne ſent rien, on doit le préférer au Souffre incorporé avec le Beurre, qui déplaît à bien des gens par ſon odeur déſagréable.

Les Perſonnes qui par quelques raiſons particuliéres ne voudroient pas ſe ſervir de frictions, pourroient ſe guérir également & commodément avec une Ceinture mercurielle, après avoir obſervé les conditions que nous venons de preſcrire ſur les Remédes internes. Elle ſe fait en agitant long-tems du Mercure crû avec du blanc d'œuf dans un mortier de Marbre, juſqu'à ce qu'ils ſe changent tous les deux en écume : on fait des Ceintures de Coton que l'on trempe dans cette écume, on les fait ſécher, & on les porte ſur les Reins juſqu'à ce que l'on ſoit guéri.

Il faut obſerver cependant, que ſi l'on préfére la Ceinture Mercurielle pour guérir la Galle, il faut choiſir le tems de l'Eté pour en faire uſage, parce qu'alors la ſaiſon favoriſe la tranſpiration, & que le

Mercure s'échapant facilement par les pores de la peau, entraîne avec lui le levain de la Galle dont il eſt chargé ; au lieu qu'il eſt ſouvent arrivé, que voulant guérir cette maladie de cette façon pendant l'Hyver, il eſt ſurvenu des Bouffiſſures univerſelles, des Opreſſions violentes, des Eréſipéles & d'autres accidens fâcheux, produits par une tranſpiration interceptée, & par le reflus du Mercure & de l'impureté galleuſe dans la maſſe du ſang.

Onguent pour faciliter l'éruption ou la ſortie des dents des Enfans.

Prénez du Beurre frais,
& du Miel commun,
de chacun parties égales.

Mêlez le tout, pour en frotter les Gencives pluſieurs fois le jour.

On bien,

Prenez une Coenne de Lard de la longueur & largeur du doigt.

Faites-la un peu griller, & frottez-en de tems en tems les Gencives.

Onguent contre la Brûlure.

Prenez de la meilleure Huile d'Olive, une once & demie ;
de la Cire vierge, une once ;
le Jaune de deux Oeufs durcis ſous la cendre.

Faites fondre la Cire ſur un feu doux, & ajoutez-y enſuite l'Huile & les Jaunes d'Oeufs, en remuant le tout, juſqu'à ce

qu'il ait acquis la consistance d'un Onguent qu'on gardera pour l'usage. La maniére de s'en servir, est d'étendre une couche mince de cet Onguent froid sur un linge, & d'en couvrir la Partie brûlée; ce qu'on répétera deux fois le jour, jusqu'à la guérison qui sera prompte.

Remarque. Cet Onguent est un des meilleurs que l'on puisse employer contre la Brûlure, soit que la Peau soit entamée ou non; il en calme la douleur, & en apaise en peu de tems l'inflammation.

Onguent contre les Humeurs froides.

Prenez du vieux-Oing d'un Porc mâle bien sain,
du Miel blanc,
de bonne Huile d'Olives,
& de la Farine de Seigle tamisée,
de chacun trois onces;
trois Jaunes d'Oeufs frais dont on aura ôté le germe.

On nettoyera l'Oing de ses peaux, & on le pilera ensuite dans un mortier de pierre ou de marbre, en y ajoutant successivement d'abord le Miel, ensuite les Jaunes d'Oeufs l'un après l'autre, & puis l'Huile d'Olive. Lorsque le tout sera bien mêlangé, on y incorporera peu-à-peu, & en remuant toujours, la Farine de Seigle, & l'on gardera cet Onguent pour l'usage dans un pot de faïance.

Remarque. Cet Onguent est très-bon

contre les Humeurs froides, & contre les engorgemens des Glandes, provenant d'une Lymphe épaiſſe & viſqueuſe; ainſi l'on s'en ſert avec ſuccès dans les tumeurs qui viennent derriére les oreilles & ſous la gorge, & dans les gonflemens des articulations produits par l'épaiſſiſſement de la Sinovie, & qui menacent d'Ankyloſe: on l'emploie encore utilement contre les inflammations des Mammelles par un lait grumelé, & contre les abſcès. Cet Onguent calme la douleur & l'inflammation, réſoud la tumeur ſi elle eſt en état de l'être, ou bien il l'améne doucement à ſuppuration, la déterge enſuite, & la cicatriſe, ſans qu'il ſoit beſoin dans tous ces cas d'avoir recours à l'inſtrument tranchant: on doit en apliquer une couche mince ſur un linge un peu plus large que la tumeur, & le renouveler tous les jours, obſervant de ne point enlever ce qui ſe trouve attaché à la Partie. Si l'on s'en ſert pour une Ankyloſe, il faut accompagner ce Remède de Bains, & de Fomentations aromatiques ſur la Partie.

Onguent noir, émollient, fondant & réſolutif.

Prenez de bonne Huile d'Olive, quatre livres;
du *Minium*,
de la Céruſe,
de la Cire neuve, de chacun une livre;
de la Térébenthine bien claire, ſix onces.

On mettra dans une baſſine ſur le feu l'Huile, le *Minium* & la Céruſe : lorſqu'ils ſeront cuits en conſiſtance d'Onguent, on ôtera la baſſine, pour y ajouter la Térébenthine, en remuant toujours avec une eſpatule de bois ; on la remettra ſur le feu, & quelques momens après on y ajoutera la Cire, & on fera cuire le tout à la conſiſtance requiſe : après quoi l'on mettra l'Onguent refroidir, en remuant toujours ; ce qu'il faut obſerver depuis le commencement juſqu'à la fin.

Remarque. Cet Onguent amollit les Parties dures, inciſe les humeurs épaiſſes, réſoud celles qui ſont viſqueuſes & tenaces, & diſſipe les congeſtions : il eſt excellent contre les Loupes, les Ankyloſes, les Tumeurs ſcrophuleuſes, & celles qui viennent aux pieds & aux mains, & qui menacent de ſupuration ; il faut laiſſer l'Emplâtre formé avec l'Onguent, depuis huit juſqu'à quinze jours, plus ou moins, pour que la tumeur ait le tems de ſe fondre & de ſe diſſiper.

Il eſt encore bon pour les tumeurs des Mammelles, cauſées par un lait grumelé ; les Panaris, les Cloux, les Maux d'aventure : il conduit doucement la ſupuration dans tous ces cas ; & lorſque les abſcès ont ſuffiſamment ſupuré, il les cicatriſe ſans autre ſecours, & fond la dureté qui y reſte quelquefois.

Il ſurvient ſouvent aux Gens de travail des abſcès aux mains & entre les doigt, que le Vulgaire apelle des *Fourchés* ; cet

Onguent y eſt extrêmement propre : il en faut garnir les mains deſſus, dedans, entre les doigts, & par-tout où il y a de l'enflure, & laiſſer les Emplâtres quatre ou ſix jours, tant qu'il y a de l'Onguent. Que ſi les trous ſe trouvent profonds, on les panſera pendant quelques jours avec le Baume verd de Mets, autrement dit de Madame de Feuillet, étendu ſur de la Charpie, afin de déterger l'Ulcére, & d'incarner les trous dont ſera ſorti le Bourbillon. Lorſque l'on veut faire les Emplâtres avec cet Onguent, il faut le faire ramollir dans de l'eau bien chaude, ou bien le faire fondre ſur un feu doux dans un vaiſſeau de terre, juſqu'à ce qu'il ſoit aſſez moû pour pouvoir s'étendre aiſément ſur du linge avec une eſpatule de fer.

Cet Onguent ne ſe gâte point, pourvû qu'on le conſerve dans un endroit ſec.

Onguent ou *Baume* d'Arcæus

Prenez de la Gomme-Elemi,
trois livres;
du Suif de Mouton,
du Sain-doux,
de chacun deux livres;
de l'Huile de Millepertuis.
une livre;
de la Térébenthine,
trois livres;
de l'Orcanette,
une demi-poignée.

On mettra fondre ou liquefier toutes les Drogues enſemble dans une baſſine ſur

un feu médiocre ; & l'on paſſera la matiére fondue par un linge, pour en ſéparer les impuretés qui ſe trouvent dans la Gomme-Elemi : on laiſſera refroidir la colature, que l'on gardera dans un pot pour le beſoin.

Remarque. Ce Baume eſt un des Remédes des plus uſités en Chirurgie, & il entre dans preſque toutes les Formules de panſement des Ulcéres : on l'eſtime principalement pour faire ſupurer les abſcès nouvellement ouverts, pour conſolider les plaies, ſur-tout celles de la tête, pour les piquûres, pour les contuſions, pour les diſlocations, & pour fortifier les nerfs.

Onguent de la Mere, ou *Onguent brun.*

Prenez du Beurre frais,
de la Graiſſe de Porc,
du Suif de Belier,
& de la Cire jaune,
de chacun une livre.

Mettez le tout fondre dans une baſſine ſur le feu ; & mêlez y enſuite de la Litharge d'or en poudre, une livre ;
& de l'Huile d'Olive,
deux livres.

Remuez toujours avec une grande eſpatule de bois.

Il ne faut ajouter la Litharge d'or, que lorſque les Graiſſes ſeront fondues, pour incorporer le tout enſemble.

Quand l'Onguent ſera cuit, (ce que l'on connoîtra en en jettant une petite

quantité ſur le pavé, où il prendra d'abord ſa conſiſtance) il faudra le retirer du feu, & le remuer juſqu'à ce qu'il ſoit entiérement refroidi.

Remarque. Cet Onguent eſt d'un très-grand uſage : on en couvre des Emplâtres, qui ſont propres à faire ſupurer les abcès, & à ramollir les tumeurs dures.

Onguent de Styrax.

Prenez de bonne Huile de Noix,
& du Styrax liquide pur,
de chacun cinq onces ;
de la Colophane,
ſept onces & demie ;
de la Gomme Elemi,
& de la Cire neuve jaune,
de chacune trois onces ſix gros.

Mettez d'abord dans une baſſine ſur le feu la Colophane, la Gomme-Elemi & la Cire jaune ; & lorſque ces matiéres ſeront fondues, ajoutez-y le Styrax & l'Huile de Noix, faiſant cuire le tout en conſiſtance d'Onguent, & remuant toujours avec une eſpatule de bois.

Lorſque l'Onguent eſt cuit, on le retire du feu, on le paſſe au travers du linge, & l'on continue de le remuer juſqu'à ce qu'il ſoit entiérement refroidi.

Remarque. Cet Onguent eſt merveilleux pour diſſiper les grandes Contuſions, ou Ecchymoſes, pour détacher la Gangréne, & arrêter ſon progrès : on s'en ſert encore

utilement pour réſoudre les duretés qui arrivent aux joues & aux jambes des Scorbutiques, & contre les Ankyloſes, en y ajoutant un peu de Souffre.

Onguent véſicatoire perpétuel, dans les Fluxions & douleurs opiniâtres des Yeux.

Prenez de l'Onguent *Baſilicum*, ou ſupuratif; une demi-livre;
de la Cire neuve jaune, ſix gros;

Faites-les fondre dans une terrine verniſſée, ſur un petit feu.

Retirez enſuite votre terrine; & lorſque la matiére ſera à demi-refroidie, ajoutez à ce mêlange des Cantharides, une once;
de l'Euphorbe, deux gros;
du Poivre long, un gros;
de la Graine de Moutarde, une demi-once.

Le tout réduit en poudre ſubtile: remuez ce mêlange, juſqu'à ce que les ingrédiens ſoient bien incorporés, & gardez l'Onguent pour l'uſage, dans un Pot de Faïance.

Avant que de ſe ſervir de cet Onguent, on commencera par apliquer ſur la nuque du col un Emplâtre véſicatoire ſimple (*a*), de la grandeur néceſſaire.

Après l'avoir levé, au bout de vingt-quatre heures, on percera la veſſie, & l'on coupera les peaux mortes d'alentour.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Emplâtres*, p. 301.

On mettra enſuite à la place du Véſicatoire une quantité ſuffiſante de l'Onguent ci-deſſus, étendu ſur un linge, & de l'épaiſſeur d'une piéce de douze ſols; on le couvrira d'une compreſſe de toile fine en pluſieurs doubles.

Le Malade doit être panſé de cette maniére deux fois par jour en Eté, & une fois le jour en Hiver, & auſſi longtems qu'il ſera néceſſaire d'attirer les ſéroſités : on aura ſoin chaque fois d'eſſuyer la plaie avec un linge blanc, & lorſqu'on voudra la deſſécher après l'uſage des Véſicatoires, on employera l'Onguent *Album Rhaſis* (*a*) pendant quelques jours : que ſi cet Onguent véſicatoire cauſe trop de douleur à chaque panſement on y ajoutera un peu d'Onguent-Roſat (*b*), pour en modérer l'activité.

Ouguent digeſtif ſimple.

Prenez de la Térébenthine claire,
& de l'Onguent *Baſilicum*,
de chacun une demi-once ;
du Miel-Roſat, deux gros ;
de l'Huile de Millepertuis,
un gros ;
Un jaune d'Oeuf.

Mêlez le tout enſemble pour un Digeſtif.

Remarque. Les Digeſtifs ſont des Re-

(*a*) *Voyez*, pag. 287.
(*b*) *Voyez*, pag. 285.

médes externes en forme molle, dont on ſe ſert pour nettoyer & déterger les plaïes, en les faiſant ſupurer : il y en a de ſimples & de compoſés ; celui-ci eſt ſimple, & d'un uſage le plus ordinaire : on l'étend ſur des Plumaceaux, dont on panſe les plaïes qui doivent ſupurer.

Onguent ſupuratif, ou *Baſilicum.*

Prenez de la Cire jaune,
du Suif de Bélier,
de la Réſine,
de la Poix navale,
de chacun quatre onces,
de l'Huile commune,
une livre quatre onces.

On coupera par morceaux la Cire, & le Suif : on concaſſera la Réſine & la Poix noire; on mettra fondre le tout dans l'Huile ſur un feu médiocre : on coulera la matiére fondue, & on y mêlera la Térébenthine, pour faire un Onguent, que l'on gardera pour l'uſage.

Remarque. Cet Onguent digére les humeurs ; il avance la ſupuration étant apliqué ſur les tumeurs, & il l'entretient dans les plaïes, lorſque l'on s'en ſert pour leur panſement : ſon uſage eſt des plus communs en Chirurgie.

Onguent adouciſſant, ou *Onguent-Roſat.*

Prenez de la Graiſſe de Porc récente,
deux livres;

des Roſes rouges,
& des Roſes pâles,
de chacune une livre.

On nettoyera la graiſſe de ſes peaux, on la lavera pluſieurs fois dans de l'Eau, & on la mettra dans un Pot de terre : on y mêlera enſuite les deux livres de Roſes Rouges & pâles, récemment cueillies, ſéparées de leurs onglets & de leurs calices, & concaſſées dans un mortier de marbre ; on couvrira le pot, & on le mettra en digeſtion au Soleil pendant quatre jours, remuant de tems en tems la matiére avec une eſpatule de bois. Enſuite on fera cuire l'infuſion pendant une heure ou deux ſur un très-petit feu ; on la coulera, exprimant fortement le marc ; on mettra dans l'Onguent coulé, autant de nouvelles Roſes qu'auparavant ; on laiſſera encore digérer la matiére pendant quatre jours : on la coulera avec expreſſion, & on aura l'Onguent-Roſat achevé, dont on ſeparera les féces, & on le gardera pour l'uſage

Si on veut lui donner une couleur rouge, il faut y faire tremper chaudement pendant cinq heures une once de Racine d'Orcanette.

Remarque. Cet Onguent qui eſt d'un uſage très-familier en Chirurgie, eſt eſtimé propre pour réſoudre, & pour adoucir : on s'en ſert pour les Hémorroïdes, & pour les Inflammations ; on le mêle encore avec l'Onguent véſicatoire pour en modérer l'activité, lorſqu'on veut en continuer l'uſage pendant quelque-tems

Onguent desſicatif, ou *Onguent blanc de Rhaſis.*

Prenez de l'Huile-Roſat,
ou de bonne Huile commune,
une livre;
de la Cire blanche,
& de la Ceruſe de Veniſe,
de chacune quatre onces.

Mêlez le tout, pour faire un Onguent ſuivant l'Art.

On rompra la Cire blanche en petits morceaux; on la fera fondre par un feu lent dans l'Huile de Roſes; puis on mêlera avec un biſtortier la Ceruſe, que l'on aura auparavant réduite en poudre ſubtile: on agitera l'Onguent juſqu'à ce que le tout ſoit bien uni, & on le gardera pour l'uſage.

Remarque. Cet Onguent eſt propre pour deſſécher & guérir les brûlures, la gratelle, les démangeaiſons de la peau, & les plaies legeres, comme les écorchures.

Onguent déterſif, ou *Ægyptiac.*

Prenez du Miel blanc,
quatre onces;
du bon vinaigre,
ſept onces;
du Verd-de-gris,
cinq onces;

On pulvériſera le Verd-de-gris, & on le fera cuire avec le Miel & le Vinaigre, juſqu'à conſiſtance d'Onguent.

Remarque. Cet Onguent eſt propre pour conſumer & déterger les chairs baveuſes & la pourriture : on le mêle communément dans les panſemens, lorſque les plaies ou ulcéres ſont ſordides, & que les chairs qui renaiſſent ſont de mauvaiſe qualité.

Onguent pour les Bleſſures, & les Ulcéres gangrenés, ou *avec Carie* (*a*).

Prenez de l'Huile d'Olive,
trois livres ;
de l'Eau Roſe,
un demi-ſeptier ;
de la Cire neuve,
une demi-livre ;
de la Térébenthine de Veniſe ;
une livre ;
du Santal rouge en poudre,
deux onces.

Faites bouillir le tout dans un pot de terre neuf, avec trois demi-ſeptiers de Vin rouge. Ayant bouilli une demi-heure, vous ôterez le pot du feu, & le laiſſerez refroidir ; vous ſéparerez enſuite l'Onguent d'avec le Vin & la Poudre, qui reſtent au fond du pot.

Remarque. On ſe ſert de cet Onguent, non-ſeulement pour toutes ſortes de bleſſures,

(*a*) *Mémoires de l'Académie des Sciences, année* 1702. pag. 207.

fures, soit qu'elles pénétrent, ou qu'elles ne pénétrent pas; pour les Ulcéres gangrénés ou avec Carie, pour les Rhumatismes & toutes sortes de douleurs, mais encore pour les douleurs internes; comme dans la Pleurésie, la Colique, les maux de Tête, &c. Dans ces derniers cas, outre qu'on en oint la Partie chaudement, la couvrant d'un papier brouillard, on en prend de plus deux gros par la bouche; on s'en sert aussi dans les Fiévres malignes, & contre la Morsure des Animaux venimeux.

Aux blessures qui pénétrent dans les cavités, il faut en séringuer dans la plaie, & en faire prendre avec du bouillon de Veau, de Chapon, ou autre, ou même avec quelques Eaux ou Tisanes vulnéraires.

Onguent contre les Dartres rongeantes.

Prenez de l'Onguent blanc de Rhasis, deux onces;
du Mercure précipité blanc, deux gros.

Mêlez le tout pour former un Onguent, dont on frottera les Dartres pendant six jours de suite le soir en se couchant; que si les Dartres ne se dissipent pas, on substituera en pareille dose le Mercure précipité rouge ou blanc.

Remarque. Cet Onguent éxige les mêmes préparations intérieures, que nous avons prescrites ci-dessus pour l'Onguent

contre la Galle ; on consultera cet endroit. (*a*). Il faudra en outre bien plus insister sur les Remédes, que lorsqu'il s'agit de guérir une Galle, qui souvent s'est communiquée depuis peu par un contact impur, & n'a pas eu le tems d'infecter le sang ; au lieu que les Dartres venant presque toujours d'un vice interne, le sang en est abreuvé avant qu'elles paroissent au dehors : il n'y a donc qu'un long usage des Remédes convenables qui puisse détruire ce levain, en rendant aux humeurs leur caractere, & leur fluidité naturelle. Un des meilleurs dont on puisse faire usage dans ce cas est la Décoction d'Esquine continuée long-tems. On prend pour cela une demi-once d'Esquine, coupée par petits morceaux ; on la fait infuser pendant vingt quatre heures dans deux pintes d'Eau bouillante, dans un vaisseau couvert ; on fait bouillir ensuite jusqu'à la consomption du quart : cette Tisane se prend à la quantité de trois ou quatre verres tiédes par jour entre les repas.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Onguens*, pag. 273.

§. II. DES EMPLATRES. *

Emplâtre véſicatoire.

PRenez de la Poix de Bourgogne, une once;
de la Térébenthine de Veniſe,
de la Poudre de Cantharides,
de chacune trois gros.
Faites du tout un Emplâtre véſicatoire.

Ou bien,

Prenez des Cantharides réduites en poudre fine, une demi once.
Mêlez-les exactement avec dix gros de Levain délayé dans un peu de Vinaigre.
Etendez le tout ſur une grande peau, & apliquez l'Emplâtre entre les deux épaules, le laiſſant dix-huit heures, ou juſqu'à ce que l'Epiderme ſe leve en veſſies.

Emplâtre véſicatoire adouci.

Prenez de l'Emplâtre de Céruſe, dix gros;
de l'Emplâtre véſicatoire ordinaire, ſix gros.

* L'Emplâtre *eſt un Remede externe, compoſé de matiéres tirées des Minéraux, des Végétaux, & des Animaux, qu'on incorpore avec des Huiles, des Graiſſes, des Réſines, des Gommes, & autres choſes ſemblables.*

Malaxez le tout exactement, pour former un Emplâtre, qu'on apliquera à la place du Véficatoire ordinaire, le levant au bout de vingt-quatre heures, pour l'eſſuyer, & le renouvellant tous les deux jours.

Remarque. Les Emplâtres véficatoires s'emploient principalement dans les Fiévres malignes, qui viennent de l'épaiſſiſſement du ſang & de la glutinoſité de la lymphe; dans les affections ſoporeuſes, comme l'Apoplexie & la Léthargie; dans les Fluxions Caterrales qui menacent les Poumons, ou qui ſe jettent ſur les Yeux, la Gorge, les Oreilles, ou quelqu'autre Partie; dans les douleurs fixes & rhumatiſantes provenant d'une Lymphe âcre, qui dechire les fibres charnues & membraneuſes; dans pluſieurs maladies de la Peau; enfin dans tous les cas où il faut réveiller le ſentiment dans quelque partie, détourner les humeurs qui menacent de quelque dépôt dangereux, & procurer un écoulement extérieur à quelque impureté de la maſſe du ſang.

Le ſecond Emplâtre adouci, dont on conſeille l'uſage, pour entretenir l'écoulement autant qu'il eſt néceſſaire, eſt plus commode que les feuilles de Poirée frottées de Beurre, ou l'Onguent ſupuratif; dont on ſe ſert ordinairement. Les premiéres deſſéchent trop promptement, & il eſt quelquefois néceſſaire d'entretenir le ſuintement pendant pluſieurs ſemaines, ſur-tout dans les Fiévres malignes, ou la

Tête se rengage de nouveau avec plus de danger qu'auparavant, si on le supprime trop vite. Quant à l'Onguent supuratif, il creuse quelquefois dans les chairs, & forme des Ulcéres qui sont des mois à se cicatriser. Il n'y a rien de semblable à craindre de notre second Emplâtre. On peut le rendre plus ou moins actif, en augmentant ou en diminuant la dose de celui de Cantharides. Il entretient parfaitement bien le suintement de la Lymphe, & lorsqu'on n'en a plus besoin, une compresse séche suffit le plus souvent pour cicatriser, ou tout au plus un jour ou deux d'aplication d'Onguent Rosat, ou de Blanc-Rhasis.

Il faut avoir attention dès que l'on a mis le premier Emplâtre vésicatoire, de donner au Malade pour boisson ordinaire pendant quelques jours, une Tisane adoucissante faite avec la Racine de Guimauve & la Graine de Lin, parce qu'il arrive quelquefois que les Sels des Cantharides font des impressions fâcheuses sur la Vessie, & causent des ardeurs d'Urine, qu'on évite au moyen de cette Tisane.

Emplâtre de Céruse, ou *dessicatif*.

Prenez de la Céruse de Venise,
& de l'Huile Rosat,
de chacune une livre;
de l'Eau commune,
une demi livre, ou ce qu'il en faut.
Faites cuire le tout en consistance d'Emplâtre, & ajoutez sur la fin,

de la Cire blanche, deux onces.

On réduira en poudre ſubtile la Céruſe, en la frottant ſur un tamis renverſé. On la mêlera avec l'Huile & l'Eau ſur la baſſine, qu'on placera ſur le feu pour faire bouillir la matiére, l'agitant inceſſamment avec une eſpatule de bois, juſqu'à ce qu'elle ait acquis une conſiſtance d'Emplâtre, & que l'Eau ſoit conſumée.

On y mettra fondre alors par une lente chaleur la Cire rompue en petits morceaux ; & quand l'Emplâtre ſera refroidi, on le formera en magdaleons avec les mains mouillées d'Eau fraiche.

Remarque. Cet Emplâtre eſt propre pour deſſécher les plaies enflammées, comme pour la brûlure ; on s'en ſert auſſi pour cicatriſer. Nous le malaxons ordinairement avec l'Emplâtre véſicatoire, pour en faire un Emplâtre adouci, tel que nous venons de le décrire ci-deſſus.

Emplâtre fondant.

Prenez des Emplâtres,
de Ciguë,
de Vigo,
de Diachylon gommé,
de chacun parties égales.

Malaxez-les enſemble ſelon l'Art, pour former un Emplâtre.

Remarque. Cet Emplâtre amollit les Parties dures, inciſe les humeurs épaiſſes, réſoud celles qui ſont viſqueuſes & tenaces,

& dissipe les congestions : on s'en sert pour les tumeurs schirreuses du Foie, de la Rate, du Mézentére, & pour les Loupes.

Emplâtre de Nuremberg.

Prenez de la meilleure Huile d'Olive, & de la Cire jaune, de chacune une livre;
de la Céruse,
de la Litharge, de chacune deux onces;
du *Minium*, une once;
du Camphre, une demi-once.

Réduisez séparément en poudre subtile la Céruse, la Litharge & le *Minium*; ensuite mettez l'Huile & la Cire coupée menu dans une terrine neuve, placée sur un feu de charbon modéré, & faites-les bouillir jusqu'à ce que l'Huile soit devenue noire, en remuant toujours avec une espatule de bois; alors vous y ajouterez peu-à-peu la Céruse, la Litharge & le *Minium*, sans discontinuer de remuer & de délayer.

Laissez le tout sur le feu, jusqu'à ce que l'Emplâtre soit cuit au dégré qu'il doit l'être; c'est ce que l'on connoitra aisément, lorsqu'en en jettant un peu dans de l'Eau froide, on le maniera sans qu'il tienne aux doigts : alors vous retirerez la terrine de dessus le feu, & pendant que l'Emplâtre sera encore liquide, vous y jetterez le Camphre, que vous aurez mis en poudre, avec un gros d'Ami-

don, & vous ne discontinuerez point de remuer jusqu'à ce que l'Emplâtre soit refroidi. Il faudra le garder dans de petits pots, ou dans de petites boëtes qu'on huilera en dedans, pour empêcher qu'il ne s'y attache, & qu'on aura soin de fermer exactement. Quelques personnes dans la vue d'augmenter la vertu de cet Emplâtre, ajoutent à sa composition de la Myrrhe & du Souffre en poudre, de chacun une once; mais cette augmentation est purement arbitraire.

Remarque. Cet Emplâtre a une grande réputation pour toutes sortes de Brûlures, d'Engelures & de Plaies, d'Abscès, de Cloux, de Panaris, & autres Maux de cette nature; pour les vieux Ulcéres, & sur-tout ceux des Jambes qui surviennent fréquemment aux Vieillards, & qui sont accompagnés d'Inflammation, ou qui menacent de Mortification & de Gangrene, pour les Dartres farineuses & érélipélateuses, pour toutes sortes de Tumeurs, même les Ecrouelles, & les Cancers scrophuleux, tant ouverts que non ouverts; & pour les Inflammations & Abscès des Mammelles, qui surviennent aux Nourrices par un Lait grumelé, ou à l'occasion de quelque coup.

Pour se servir avantageusement de cet Emplâtre, on ne doit point le faire chauffer, car il perdroit beaucoup de sa vertu. Il faut seulement le manier avec le pouce mouillé dans le creux de la main; il se ramollira très-facilement: alors

on l'étendra sur un linge neuf ferré, ou sur une peau blanche, & après avoir lavé la plaie avec du Vin tiéde, on y apliquera l'Emplâtre.

Quand la Plaie est ouverte avec supuration abondante, on est obligé de changer cet Emplâtre une ou deux fois le jour; mais lorsque l'écoulement est peu de chose, un même Emplâtre peut servir quatre ou cinq jours de suite, observant néanmoins de le lever chaque jour soir & matin, & de le remanier chaque fois avant que de l'apliquer de nouveau.

On se sert encore utilement de cet Emplâtre dans les attaques d'Hémorroïdes externes; & pour lors on en fait fondre une once dans trois onces d'Huile de Navette, ce qui compose un Liniment dont on frotte les Hémorroïdes deux ou trois fois par jour, apliquant pardessus un papier brouillard, plié en plusieurs doubles, & mouille dans l'Eau froide. Ce pansement doit être continué jusqu'à parfaite guérison.

Emplâtre Hiſtérique.

Prenez du *Galbanum*, trois gros;
de la Gomme *Tacamahaca*,
de la Poudre de *Caſtoreum*,
de chacune deux gros.

Mêlez le tout avec une suffisante quantité d'Huile de Succin, & étendez-le sur une peau, pour former un Emplâ-

tre à apliquer au-deſſous du Nombril.

Remarque. Cet Emplâtre calme les Vapeurs hiſtériques : il arrête les mouvemens ſpaſmodiques des Inteſtins, les convulſions des Membres, & il facilite les Mois ; mais avant que de l'apliquer, il faut éxaminer l'état du bas ventre : car s'il eſt douloureux, & que la Malade ſouffre des Coliques, il faut s'en abſtenir, parce que cet Emplâtre ramenant le ſang vers la Matrice, qui ne ſeroit pas diſpoſée à l'évacuation qui lui eſt naturelle, en augmenteroit l'engorgement, & pourroit produire l'inflammation. Il faudroit donc préparer la Malade par des Boiſſons relâchantes, telles que le petit Lait, & nos Bouillons rafraîchiſſans (*a*), le demi-bain, des Lavemens, ſans oublier la Saignée, s'il y avoit plénitude, avant que d'en venir à ſon uſage.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Bouillons*, pag. 67.

FIN.

REMÉDES
CHOISIS,
EXTRAITS
DES ÉPHÉMÉRIDES
D'ALLEMAGNE.

AVERTISSEMENT.

LEs Éphémérides d'Allemagne ſont un Recueil très-intereſſant d'Obſervations de Médecine ; les ſçavans Médecins, de qui nous les tenons, ont joui dans leur tems, & ceux qui vivent actuellement, jouiſſent encore d'une grande réputation. Ils ſont tous ou premiers Médecins de Princes Souverains, ou Penſionnaires des Villes, qui ont ſçû reconnoître & récompenſer leurs talens. Tout ce qui ſort de la plume de Perſonnes auſſi illuſtres, doit donc être pour nous d'un grand prix, & ſur-tout ce qui a raport aux nouvelles découvertes en Médecine, & à la guériſon des maladies. L'amour du bien public, qui eſt répandu dans ces Ecrits, doit les mettre à couvert de tout ſoupçon d'infidelité ; & c'eſt avec confiance que nous devons employer les Remédes qu'ils nous aſſurent leur avoir réuſſi en pluſieurs occaſions. Ces raiſons, & la facilité que nous avons eûe de nous procurer la lecture de cette grande & belle Collection qui eſt fort rare, & écrite

dans une Langue qui n'eſt pas familiere au plus grand nombre de ceux qui pratiquent aujourd'hui la Médecine, nous ont engagés à en faire part au Public; nous avons cru lui rendre un ſervice important, en faiſant choix des Remedes les plus ſimples & les plus faciles à préparer, & qui ont réuſſi en différentes maladies, pour les mettre à portée d'être employés par les Perſonnes charitables qui exercent la Médecine, & qui ſans cela n'en auroient peut-être jamais eu connoiſſance. Nous n'oſons pas nous promettre que ces Remédes réuſſiront tous, comme ils ont fait à ces ſçavans Médecins : la différence du climat, du tempérament, la vertu même de certaines Plantes plus efficaces en certains Pays que dans d'autres, pourront influer ſur leur effet, & le faire varier à quelques égards ; mais quand il arriveroit que ſur le grand nombre des Remédes que nous propoſons, il n'y en auroit qu'une partie qui reuſſiroit, ne ſerions-nous pas toujours aſſez heureux de les ajouter à nos connoiſſances, & d'augmenter chez nous le progrès de la Médecine ? Nous compterons nos peines pour rien, ſi le Public en peut retirer quelque avantage.

Nous avons jugé à propos de ne pas confondre ces Remedes avec ceux qui ſont le corps de cet Ouvrage, pour ne pas aller contre la régle que nous nous ſommes faites, de ne donner preſque jamais qu'un Remede pour chaque maladie, de crainte d'embarraſſer les Perſonnes charitables ſur le choix qu'elles auroient à en faire : nous avons donc préféré de les donner à part ; & ces Remedes ſeront comme un Corps de réſerve dont on ſe ſervira dans l'occaſion, lorſque la maladie aura réſiſté à ceux que l'on emploie ordinairement, & qui ſont le fond de cet Ouvrage. Nous avons eu ſoin de citer le Volume dont nous avons tiré chaque Obſervation, afin que ceux qui ſeront dans le cas de pouvoir lire les Ephémérides d'Allemagne, puiſſent les conſulter s'ils le jugent à propos, & voir le détail de la maladie qui a donné occaſion au Remede que nous propoſons. Enfin, nous avons cru qu'il ſuffiſoit de ranger les Remedes ſuivant l'ordre des années que chaque Volume des Ephémérides a paru dans le Public, & que leur petit nombre n'éxigeoit pas une diviſion en Chapitres & en Sections, comme nous avons fait ci-devant.

Parmi ces Remèdes, il y en a quelques-uns qui pourront paroître singuliers ; mais leur efficacité eſt ſi bien atteſtée, que nous n'avons pas cru devoir les omettre.

Au reſte, avant de faire uſage d'aucun Remede propoſé dans cette nouvelle Section, il ſera important de conſulter les Remarques que nous avons inſerées dans le corps de l'Ouvrage, ſur l'emploi bien entendu des Remedes apropriés à telle ou telle maladie, & ſur les précautions qu'il faut prendre pour les apliquer à propos ; c'eſt à dire, dans les circonſtances & les tems convenables.

EXTRAIT DES ÉPHÉMÉRIDES D'ALLEMAGNE.

POUDRE contre l'Hémorragie du Nez.

Prenez de l'Alun pulvérisé, deux gros.

Ajoutez-y une suffisante quantité de Laque fine des Peintres, pour former du tout une Poudre de couleur incarnate, que l'on soufflera dans le Nez à différentes reprises.

Ephémérides d'Allemagne, Décurie 1. année 1. observation 24. *pag.* 77.

Fomentation contre la Gangrene.

Prenez de l'Eau de Mer, ou à son défaut, de la Saumure, dans laquelle vous ferez bouillir de l'Absinthe.

On en fomentera la Partie chaudement plusieurs fois le jour, la couvrant de compresses trempées dans cette Décoction.

Ephém. d'Allem. Décur. 1. ann. 11. observ. 2. *pag.* 2.

Remedes contre l'incontinence d'Urine.

Prenez la Partie naturelle d'une Truïe, (apelée en Latin *Pudendum Suillum*,) faites-la cuire, & l'aprêtez de quelle façon vous voudrez, & faites-en manger plusieurs jours de suite à la personne incommodée.

Ephém. d'Allem. Décur. 1. ann. 2. observ. 211. pag. 36.

Décoction contre le Diabètes.

Prenez du Cachou préparé,
un demi-gros ou deux scrupules.
Faites-les bouillir dans trois septiers d'Eau commune, que vous réduirez à une chopine.

Le Malade prendra cette Décoction en quatre doses tiédes dans la journée, continuant pendant quelque-tems.

Ephém. d'Allem. Décur. 1. ann. 2. observ. 129. pag. 210.

Aumelette contre les Hémorroïdes.

Prenez de la Racine récente de *Telephium*, ou *Fabaria*, (en François, *Orpin*) suspendez-la à un fil entre les deux épaules, ayant soin qu'il y ait autant de nœuds au morceau de Racine qu'il y a de boutons Hémorroïdaux ; à mesure que la Racine se séche, les Hémor-

roïdes se flétrissent, & cessent d'être douloureuses.

Ephem. d'Allem. Décur. 1. ann. 2. observ. 195. pag. 196.

Errhine ou *Remede pour faire couler la pituite du Cerveau.*

Prenez du Vitriol blanc,
un demi-gros.
Dissolvez-le dans une chopine d'Eau commune, ou d'Eau Céphalique, & coulez la liqueur par un linge.

La maniere de s'en servir est d'en mettre quelques gouttes dans le creux de la main, que l'on respire par le nez: ou bien on y trempe une petite tente, ou une plume, que l'on introduit dans les Narines; ce qui se fait le matin, le répétant plusieurs jours de suite.

Ephem. Décur. 1. ann. 3. observ. 14. *pag.* 17.

Julep contre l'ardeur d'Estomac.

Prenez du Sel de Prunelle,
un demi-gros;
de l'Eau de Sureau,
une chopine.
Mêlez le tout, & partagez-le en deux doses, à prendre dans la journée, ce qui sera répété quelques jours de suite.

On peut pour la même Maladie se servir de la Crême de Tartre, à la mê-

me dose, dans un gobelet d'Eau commune.

Ephém. Décur. 1. ann. 3. obſerv. 210. *pag.* 330.

Remede contre l'Enflure du ventre des Enfans, apellée le Carreau.

Il faut leur faire prendre une cuillerée d'huile de Lin le matin à jeun, en continuant pendant du tems.

Ephém. Décur. 1. ann. 3. obſerv. 216. *pag.* 340.

Décoction contre la Jauniſſe invétérée.

Prenez de la Pulmonaire de Chêne, une poignée.

Faites-la bouillir dans une chopine de Biére, juſqu'à diminution de moitié.

Le Malade en prendra une douzaine de cuillerées chaudes, matin & ſoir, pendant neuf jours.

Ephém. Décur. 1. ann. 3. obſer. 290. *pag.* 441.

Décoction contre la Goutte.

Il faut faire bouillir pendant quelques momens une poignée de Trefle d'eau, en Latin *Trifolium fibrinum paluſtre*, dans une pinte d'eau commune, & que le Malade uſe de cette Décoction en guiſe de Tiſane.

Ephém. Décur. 1. ann. 4. obſerv. 123. *pag.* 24

Décoction Vermifuge.

Faites bouillir une once & demie de Racine de Raifort ſauvage, dans trois chopines d'eau réduite à pinte, pour ſervir de Tiſane.

Ephém. Décur. 1. ann. 6. obſerv. 187. *pag.* 244.

Cataplaſme contre la piquûre des Guêpes & des Araignées.

Il faut apliquer ſur la piquûre une feuille de Sauge franche.

Ephem. Déeur. 1. ann. 8. obſerv. 31. *pag.* 66.

Remede contre la Diarrhée invétérée.

Il faut faire durcir un Œuf, & le manger ſauſſé dans le Vinaigre Roſat.

Ephém. Décur. 1. ann. 8. obſerv. 37. *pag.* 68.

Décoction vulnéraire contre le Sang coagulé ou extravaſé dans les chûtes.

Prenez une poignée de la plante apelée *Arnica* par les Allemands, & en Latin *Doronicum Plantaginis folio alterum.*

Faites-la bouillir dans trois chopines d'Eau, que vous réduirez à une pinte, & ſervez-vous-en en guiſe de Tiſane.

Ephem. Décur. 1. ann. 9. & 10. obſerv. 2. *pag.* 30.

Cataplasme contre les pertes de Sang.

Prenez des crottes de Cochon, à volonté.

Faites-les chauffer, & apliquez-les en Cataplasme sur la région du Pubis.

Ephem. Décur. 1. ann. 9. observ. 56. *p.* 145.

Emulsion contre la rétention d'Urine, & les graviers.

Prenez deux Grillons de cheminée, dont vous ôterez les ailes, la tête & les pieds: faites-les macérer ensuite dans un verre d'eau, ou de décoction de Persil, ou de Saxifrage, jusqu'à ce que la liqueur devienne laiteuse; passez ensuite avec expression; pour une dose à prendre le matin à jeun, & que l'on répétera quelques jours de suite.

Ephém. Décur. 1. ann. 9. & 10. observ. 72. *pag.* 202.

Tisane contre l'Hydropisie.

La Tanaisie bouillie dans de l'Eau.

Ephem. Décur. 2. ann. observ. 112. *pag.* 268.

Cataplasme contre les douleurs & les tumeurs des Articulations.

Prenez des fleurs de Raifort sauvage:

pilez-les, & les apliquez sur l'endroit douloureux, renouvellant quand elles seront séches.

Ephem. Décur. 2. ann. 4. obsérv. 90. *p.* 180.

Cataplasme contre la rétention d'Urine.

Prenez deux poignées de Fleurs de Camomille, faites-les bouillir dans du Lait en consistance de Cataplasme ; mettez les enfuite dans un sachet de toile claire, que vous apliquerez chaudement sur la région de la Vessie.

Ephem. Décur. 2. ann. 5. obsérv. 49. *p.* 92.

Autre cataplasme contre la supression ou Rétention d'Urine.

Prenez une suffisante quantité de Fiente de Bœuf récente, & apliquez-la sur le Pubis, en faisant boire au Malade de l'Eau de riviére, dans laquelle on aura éteint un fer rougi au feu : on doit ne donner d'abord que des cuillerées ; & on augmente à mesure que les Urines percent.

Décur. 2. ann. 5.

Remede contre la Foiblesse & Syncope d'un Enfant nouvellement né, à la suite d'un Accouchement laborieux.

Il faut succer la papille de la Mam-

melle gauche de l'Enfant pendant quelque-tems.

Ephém. Décur. 2. ann. 5. obſerv. 121. *p.* 242.

Fumigation contre le flux exceſſif des Hémorroïdes.

Il faut recevoir ſur une chaiſe percée la fumée de la raclure du Sabot d'un pied de cheval.

Ephém. Décur. 2. ann. 5. obſerv. 130. *p.* 269.

Gargariſme contre l'Inflammation, la ſéchereſſe, & les ulcérations & fiſſures de la Bouche, de la Langue & du Goſier.

Prenez de l'Eau de Plantain.
quatre onces ℥ iv
du Syrop de Roſes ſéches,
une demi-once ℥ ſs
du Sel Ammoniac en poudre,
un ſcrupule.

Mêlez le tout, pour un Gargariſme, dont le Malade uſera pluſieurs fois dans la journée.

Nota. On peut contre les Aphthes ſeules ſe ſervir du Syrop de Roſes ſéches, aiguiſé d'un peu de Sel Ammoniac, mêlés enſemble, dont on touchera les Aphthes trois fois le jour avec un pinceau.

Ephem. Décur. 2. ann. 5. obſerv. 141. *p.* 334.

Remede

Reméde contre la Surdité & le Bourdonnement d'Oreilles.

Il faut introduire dans l'Oreille le petit bout d'une Pipe à tabac, & tirer par le gros bout, ou le pot, l'air qui eſt dans l'Oreille.

Ephém. Décur. 2. ann. 6. *pag.* 254.

Lavement contre la Gangréne des Inteſtins.

Il faut ſe ſervir de Bouillon d'Ecreviſſes de Riviére.

Ephém. Décur. 2. ann. 6. obſerv. 196. *pag.* 392.

Reméde contre la Dyſſenterie.

Il faut prendre un Coing, le couper en deux parties inégales ſuivant ſa largeur, & creuſer la plus groſſe partie pour la remplir de Cire blanche ou jaune : on fait enſuite cuire le Coing ſous la cendre chaude, juſqu'à ce que la Cire ſoit fondue & incorporée dans le fruit ; alors on le donnera à manger au Malade.

Ephém. Décur. 2. ann. 7. obſerv. 3. *pag.* 180.

Bouillon Vermifuge.

Il faut délayer un demi-gros à un gros de cendre de Houblon dans un Bouillon au Lait, que l'on donnera à prendre au

Malade quelques jours de suite, le matin à jeun.

Ephém Décur. 2. ann. 7. obſerv. 240. *pag.* 454.

Autre Bouillon de même qualité.

Il faut bien faire bouillir quelques Têtes d'Ail dans du Lait de Chévre, & faire prendre ce Bouillon à jeun, que l'on peut réïtérer.

Ephém. Décur. 2. ann. 7. *Append.* pag. 130.

Autre Bouillon contre la Colique.

Il faut faire bouillir une legére poignée de Camomille commune dans une chopine de Lait, & paſſer par un linge, pour un Bouillon.

Ephém. Décur. 2. ann. 7. *Append.* pag. 130.

Reméde contre la Phthiſie.

Il faut manger tous les jours à jeun du Creſſon de Fontaine, & ſe ſervir de Lait de Beurre pour boiſſon ordinaire.

Ephém. Décur. 2. ann. 8. obſerv. 142. *pag.* 301.

Reméde contre la ſupreſſion des Régles

Il faut que la Malade mette la che-

miſe d'une perſonne ſaine, qui les a actuellement.

Ephém. Décur. 2. ann. 8. obſerv. 181. *pag* 464.

Poudre contre l'Enrouement.

Il faut prendre trois jours de ſuite, en ſe couchant, un gros d'Yeux d'Ecreviſſes préparés.

Ephém. Décur. 2. ann. 9. obſerv. 43. *pag.* 79.

Julep contre le Flux hépatique.

Il faut prendre pendant quelque-tems, le matin à jeun, quinze à vingt onces d'eau diſtillée de Chicorée ſauvage.

Ephém. Décur. 2. ann. 9. obſerv. 58. *pag.* 82.

Reméde pour empêcher les marques de la petite-Vérole.

Il faut, lorſque les puſtules ſont mûres, aprocher du viſage un fer chaud pluſieurs fois le jour, ce qui les deſſéche, & les empêche de creuſer.

Ephém. Décur. 2. ann. 9. obſerv. 87. *pag.* 149.

Potion contre l'Accouchement difficile par foibleſſe.

Prenez de la Myrrhe, un ſcrupule;
du Borax de Veniſe,

du Saffran,
de chacun douze grains;
de l'Huile de Succin,
trois gouttes.

Mêlez le tout dans quatre cuillerées de bon Vin Rouge, pour donner ſur le champ; ce qui ſe répétera ſix heures après, s'il eſt néceſſaire.

Ephém. Décur. 2. ann. 9. obſerv. 97. *pag.* 169.

Potion contre la Fievre quarte.

Il faut faire infuſer pendant vingt-quatre heures dans cinq onces de Vin blanc une once de graine de Coriandre pilée & réduite en poudre, & paſſée enſuite par un linge : on en prendra à jeun la colature.

Ephém. Décur. 2. ann. 10. obſerv. 85. *pag.* 157.

Topique contre les douleurs aiguës internes des Enfans, ſur-tout du Bas-ventre.

Il faut aſſujettir un Goujon ſur le Nombril de l'Enfant, l'y laiſſer quatorze heures, & répéter cela pluſieurs jours de ſuite.

Ephém. Décur. 2. ann. 10. obſerv. 105. *pag.* 191.

Fomentation contre le Tremblement des membres.

Il faut les fomenter pluſieurs fois le

jour avec ſon Urine, ou celle d'une perſonne ſaine.

Ephém. Décur. 2. ann. 10. obſerv. 146. *pag.* 232.

Bol contre les Vers.

Prenez de la Limaille de Fer porphyriſée, depuis un ſcrupule juſqu'à un demi-gros : incorporez-la avec un gros de Conſerve d'Abſinthe, ou de Fumeterre ; ce qui ſe réitérera pluſieurs fois de ſuite, le matin à jeun, ou en ſe couchant.

Ephém. Décur. 3. ann. 1. obſerv. 7. *pag.* 22.

Potion contre les Contuſions, Fractures, Plaies & Bleſſures internes.

Prenez trois fois le jour douze à quinze gouttes d'Huile de Vers de terre dans une Eau vulnéraire ; ce qui ſera continué quelque-tems.

Ephém. Décur. 3. ann. 1. obſerv. 9. *pag.* 24.

Reméde contre la Sciatique, ou *le Rhumatiſme de quelque Partie.*

Il faut fouetter l'endroit affecté juſqu'à rougeur avec des Orties, & le baſſiner enſuite avec du Vin blanc ; ce qui ſera répété pluſieurs fois.

Ephém. Décur. 3. ann. 1. obſerv. 34. *pag.* 54.

Reméde contre les Fleurs-blanches.

Il faut uſer de Syrop de Corail de Quercetan, ou de la Teinture de Corail mêlée avec la Terre ſigillée.

Ephém. Décur. 3. ann. 1. obſerv. 39. *pag.* 58.

Potion contre les douleurs après l'Accouchement.

Prenez un gros de Blanc de Baleine, dans quatre onces de Décoction d'Armoiſe.

Ephém. Décur. 3. ann. 1. obſerv. 41. *pag.* 59.

Fomentation contre les marques que les Enfans aportent quelquefois en naiſſant.

Il faut diſtiller ſur la fin de Mai toute la Plante apelée *Benoite*, & en Latin *Caryophyllata*, & en laver ces marques, qui ſe diſſipent en peu de tems.

Ephém, Décur. 3. ann. 1. obſerv. 74. *pag.* 114.

Potion contre la Jauniſſe invétérée.

Il faut prendre un blanc d'œuf, que l'on fera mouſſer, & que l'on mêlera avec douze onces d'Eau de Chientdent, y ajoutant un peu de Sucre: pour une doſe, à prendre matin & ſoir pendant quelque-tems.

Ephém. Décur. 3. ann. 2. obſerv. 95. *pag.* 120.

Reméde contre la difficulté d'uriner d'un Enfant nouveau né.

Il faut lui mettre ſur le Gland une Eponge trempée dans du Lait, dans lequel on a fait bouillir de l'Ail ; ou bien une petite pelure d'Oignon.

Ephém. Décur. 3. ann. 3. obſerv. 69. *pag.* 85.

Cataplaſme contre la Sciatique.

Il faut faire bouillir de la Racine de Conſoude ratiſſée, dans l'Urine du Malade ; & lorſqu'elle eſt réduite en pulpe, il la faut apliquer chaudement ſur le haut de la Cuiſſe, couvrant le tout d'une compreſſe, & l'entourant d'une bande : il faut de plus que le Malade reſte vingt-quatre heures couché ſur la Cuiſſe douloureuſe ; après quoi on ôte le Cataplaſme que l'on enfouit ſous terre.

Ephém. Décur. 3. ann. 5. & 6. obſerv. 160. *pag.* 45

Tiſane contre l'Hydropiſie.

Il faut ſe ſervir de la Décoction de Bluet, ou d'Aubifoin.

Ephém. Décur. 3. ann. 5. & 6. obſerv. 20. *pag.* 50.

Cataplaſme contre les Vuidanges & les Mois immodérés.

Prenez telle quantité que vous voudrez de Suie de Cheminée ; mêlez-la avec de bon Vinaigre, que vous appliquerez ſous les genoux en Cataplaſme, que l'on renouvellera lorſqu'il ſera ſec.

Ephém. Décur. 3. ann. 5. & 6. obſerv. 84. *pag.* 167.

Poudre contre les Ulcéres ichoreux.

Il faut faire ſécher des feuilles de grande Joubarbe, les réduire enſuite en poudre, & en ſaupoudrer les Ulcéres deux fois le jour, juſqu'à guériſon.

Ephém. Décur. 3. ann. 5. & 6. obſerv. 115. *pag.* 238.

Cataplaſme contre les plaies récentes.

Il faut apliquer deſſus des feuilles d'Orvale pilées ; ce qui ſera répété une fois le jour, juſqu'à guériſon.

Ephém. Décur. 3. ann. 5. & 6. obſerv. 242. *pag.* 575.

Liniment contre les Dartres rebelles.

Prenez de la Gomme-Adragant, une once.

Diſſolvez-la dans une ſuffiſante quantité d'Eau de Plantain ; ajoutez-y enſuite de l'Alun en poudre, & du Mercure ſublimé, de chacun un gros.

Pour un Liniment.

Ephém. Décur. 3. ann. 7. & 8. obſerv. 18. *pag.* 38.

Cataplaſme contre la Piqûre des Guêpes & des Abeilles.

Il faut couvrir de Boue l'endroit piqué.

Ephém. Décur. 3. ann. 7. & 8. obſerv. 194. *pag.* 314.

Reméde contre les Diabètes.

Il faut faire uſage de Cachou, ſoit en teinture, ſoit en ſubſtance.

Ephém. Décur. 3. ann. 7. & 8. *Append.* obſerv. 29. *p.* 72.

Reméde contre l'Enrouement.

Il faut uſer long-tems de Syrop d'*Eryſimum*, ou bien de Trochiſques compoſés avec parties égales de Myrrhe, d'Encens, & de Sucre-Candi, incorporés avec le mucilage de Gomme-Adragant.

Ephém. Décur. 3. ann. 7. & 8. *Append.* obſerv. 153. *p.* 76.

Poudre contre la Lépre.

Il faut uſer pendant quatre mois, ſoir & matin, de Coquilles d'œufs calcinées & réduites en poudre, à la doſe d'un gros chaque fois, ayant ſoin de ſe purger tous les quinze jours ou trois ſemaines.

Ephém. Décur. 3. ann. 9. & 10. obſerv. 253. *pag.* 276.

Reméde contre les Régles immodérées.

Il faut prendre pendant quelque-tems, ſoir & matin, un ſcrupule de Soie cramoiſie coupée par petits morceaux, dans un verre tiéde de Décoction de Plantain, ou autre Plante aſtringente.

Ephém. Décur. 3. ann. 9. & 10 obſerv. 235 *pag.* 418.

Reméde contre l'Hémorragie qui ſuit une Dent arrachée.

Il faut prendre de la Noix, l'enflammer à une Bougie, & en cautériſer deux ou trois fois l'alvéole dont on a tiré la Dent, ſe gargariſant la bouche avec une Eau aſtringente.

Ephém. Centur. 1. & 2. obſerv. 7. *pag.* 45.

Reméde contre l'Enrouement.

Il faut prendre du petit Lait bien chaud soir & matin pendant du tems.

Ephém. Centur. 1. & 2. obſerv. 8. *pag.* 46.

Reméde contre le Marasme, ou *la Maigreur exceſſive.*

Il faut uſer de Bains tiédes domeſtiques.

Ephem. Centur. 1. & 2. *Append.* obſerv. 46. *pag.* 187.

Liniment contre les Aphthes.

Il faut mêler du Suffran en poudre dans de l'Huile d'Amandes douces, & s'en ſervir en Liniment.

Ephém. Centur. 1. & 2. *Append.* obſerv. 72. *pag.* 187

Liniment contre la Brûlure.

Il faut diſſoudre un Jaune d'œuf dans de l'Huile de Lin, & s'en ſervir en Liniment.
Ou bien, il faut faire un Onguent avec la Chaux vive & l'Huile de Roſes.

Ephém. Centur. 1. & 2. *Append.* pag. 188.

Pilules contre la Colique de Miſerere.

Faites cuire telle quantité que vous vou-

drez de Miel en consistance d'extrait solide, & formez-en des Pilules, que l'on donnera dans de l'Huile d'Olive.

Ephém. Centur. 1. & 2. *Append.* pag. 191.

Poudre contre l'Incontinence d'Urine.

Il faut faire calciner une Taupe, la réduire en poudre, & en faire prendre, le soir en se couchant, un demi-gros, en continuant pendant quelques jours. On peut incorporer la Poudre avec quelque Syrop, pour former un petit Bol.

Ephém. Centur. 1. & 2. *Append.* pag. 199.

Mixture contre la Jauniſſe.

Il faut dissoudre de la Fiente d'Oie dans de l'Esprit-de-Vin, & donner de cette liqueur, depuis un gros jusqu'à deux, dans une Décoction apéritive.

Ephém. Centur. 3. & 4. observ. 188. *pag.* 342.

Cataplasme contre la Pleurésie.

Il faut prendre des Crottes de Cheval entier, les incorporer ensuite avec de l'Urine, & apliquer le tout chaudement sur le côté douloureux.

Ephém. Centur. 3. & 4. observ. 178. *pag.* 426.

Poudre contre les Fiévres intermittantes.

Prenez du Quinquina,
quatre ſcrupules ;
des fleurs de Sel-Ammoniac,
un demi-gros ;
du Diagrède ſulfuré,
ſeize grains.

Réduiſez le tout en poudre, & partagez en deux doſes à prendre, l'une douze heures, & l'autre deux heures avant l'accès, ayant ſoin d'avaler par deſſus une taſſe de Thé, qui ſera ſuivie de quelques autres entre la premiére & la ſeconde priſe du Reméde.

Ephém. Centur. 5. & 6. obſerv. 65. *pag.* 110.

Reméde contre la Migraine.

Il faut fumer de la ſemence de Fenouil en guiſe de Tabac.

Ephém. Centur. 7. & 8. obſerv. 28. *pag.* 71.

Poudre contre la Gravelle & la Pierre.

Il faut uſer pendant du tems, le matin à jeun, de la Poudre de Limaçons communs, à la doſe d'un demi-gros à un gros, dans une décoction diurétique.

Ephém. Centur 7. & 8. obſerv. 33. *pag.* 80.

Reméde contre les Engelures ulcérées.

Il faut faire brûler un Rat juſqu'à ce qu'il ſoit réduit en cendres, & répandre de cette cendre ſur les ulcéres ; ce qu'on répétera deux fois le jour, juſqu'à la guériſon qui ſera prompte.

Ephém. Centur. 7. & 8. obſerv. 80. *pag.* 195.

Liniment contre les Hémorroïdes douloureuſes.

Il faut prendre de la Céruſe en poudre, & la faire macérer pendant une nuit dans du Vinaigre ; on jette le matin le Vinaigre, & on ajoute un peu d'Huile d'Olive, pour faire du tout un Liniment.

Ephém. Centur. 7. & 8. obſerv. 4. *pag.* 259.

Reméde contre le poiſon du Stramonium, *apellé* Belladona, *ou bouton noir.*

Il faut commencer par faire vomir, & faire enſuite avaler un grand verre de Vinaigre de Vin.

Ephém. Centur. 9. & 10. obſerv 94. *pag.* 206.

Tiſane contre la Goutte.

Il faut faire bouillir de la Racine d'Ariſtoloche clématite dans de l'eau commune, & en prendre quelques verres dans la jour-

née ; ou bien, faire infuſer cette même Racine dans de l'Eau-de vie, ou de l'Eſprit-de vin, & prendre ſept ou huit gouttes de cette Teinture dans du Thé, le matin à jeun, en continuant pendant quelque-tems.

Ephém. Centur. 9. & 10. obſerv. 94. *pag* 206.

Reméde contre la douleur d'Oreilles.

Il faut tremper du Coton dans de l'Huile d'œuf, & en mettre de tems en tems dans l'Oreille.

Ephém. ann. 1727. vol. 1. obſerv. 40. *pag.* 87.

Cataplaſme contre l'enflûre des Jambes dans l'Hydropiſie.

Il faut apliquer des feuilles ou racines de la Plante apelée *Bon Henri.* On fait auſſi ſécher cette Plante, & on en incorpore la poudre avec une Pommade, contre la Galle.

Ephém ann. 1727. vol. 1. obſerv. 57. *pag.* 110.

Décoction contre l'Aſthme & l'Opreſſion de Poitrine.

Il faut uſer de la Décoction de Raves le matin à jeun, à la quantité de quelques gobelets, en continuant ce Reméde pendant ſix ſemaines.

Ephém. ann. 1727. vol. 1. obſerv. 62. *pag.* 116.

Collyre contre l'Ophthalmie.

Il faut ſe baſſiner ſouvent les Yeux dans la journée avec ſon Urine un peu tiédie auparavant.

Ephém. ann. 1727. volum 1. obſerv. 65. *pag.* 118.

Potion contre l'Accouchement difficile.

Il faut diſſoudre un peu de Savon dans de l'eau commune, & en faire boire à la Malade.

Ephém. ann. 1727. vol. 1. obſerv. 69. *pag.* 119.

Fomentation contre les Pertes.

Il faut apliquer ſur le Pubis des linges trempés dans de l'eau froide, à laquelle on aura ajouté une quatriéme partie de Vinaigre; ce que l'on répétera de tems en tems dans la journée.

Ephém. ann. 1727. vol. 1. obſerv. 103. *pag.* 194.

Poudre contre la Teigne & les Poux.

Il faut répandre ſur la tête de la ſemence de Perſil, réduite en poudre; ce qui ſera continué pendant quelque-tems.

Ephém. ann. 1727. vol. 1. obſerv. 133. *pag.* 285.

Tiſane contre la Goutte, la Colique & la Cachexie.

Prenez deux onces de rapure de bois de Gui de Chêne ; verſez deſſus deux pintes d'eau bouillante, & faites infuſer pendant douze heures dans un vaiſſeau lutté avec de la pâte : faites bouillir enſuite doucement à la conſomption du tiers, paſſez par un linge, & mettez la liqueur dans des bouteilles bien bouchées.

La maniére de s'en ſervir, eſt d'en prendre deux gobelets tiédes, matin & ſoir, pendant quelque-tems, & de faire après, s'il eſt poſſible, un leger exercice.

Ephém. ann. 1727. vol. 1. obſerv. 191. *pag.* 422.

Tiſane contre l'Hydropiſie.

Il faut uſer pendant un mois ou ſix ſemaines de la Décoction d'écorce d'Orme, pour boiſſon ordinaire ; que ſi on la trouve trop déſagréable, on ſe contentera d'en prendre trois ou quatre gobelets tiédes par jour entre les repas.

Ephém. ann. 1727. vol. 1. obſerv. 194. *pag.* 429.

Amulette contre l'incontinence d'Urine.

Il faut faire ſécher un Crapaud au Soleil, ou dans un Four, & le porter pendu à ſon col.

Ephém. ann. 1727. vol. 1. obſerv. 227. *pag.* 505.

Reméde contre la douleur de Tête, apelée le Clou.

Il faut apliquer des Sangſues ſur l'endroit douloureux.

Ephem. ann. 1720. vol. 3. obſerv. 14. *pag.* 41.

Reméde contre la Conſtipation.

Il faut manger quelques jours de ſuite, le matin à jeun, une Rôtie de mie de Pain, arroſée de bonne Huile d'Olive.

Reméde contre le Calcul.

Il faut prendre le matin à jeun, la veille de chaque nouvelle Lune, trois gouſſes d'Ail, en buvant par-deſſus un verre de Vin blanc.

Cataplaſme contre la Cardialgie.

Il faut faire frire dans du Beurre des feuilles récentes de Sauge, & apliquer le tout chaudement en Cataplaſme ſur la région du cœur & ſur le bas-ventre.

Potion contre la Colique.

Il faut boire du Vin doux, mêlé avec de l'Huile d'Amandes douces.

Ephém. ann. 1730. vol. 2. obſerv. 195. *pag.* 43.

Poudre contre la foibleſſe de la Vûe.

Prenez de la Racine de Valériane, & des feuilles de Tabac,
de chacune deux gros.
Réduiſez le tout en poudre ſubtile, & ajoutez-y des Huiles diſtillées de Lavande & de Marjolaine,
de chacune trois gouttes.
On fait uſage de cette Poudre en guiſe de Tabac.

Ephem. ann. 1733. vol. 3. obſerv. 125. *pag.* 384.

Reméde contre le Larmoyement involontaire.

Il faut prendre des feuilles récentes de Bétoine, & en introduire une dans chaque Narine, les y laiſſant pendant une demi-heure chaque fois; ce qui ſera répété de tems en tems.

Ephem. ann. 1737. vol. 4. obſerv. 110. *pag.* 444.

Décoction contre les Fiévres intermittantes.

Il faut faire bouillir de l'écorce de Prunier ſauvage, & s'en ſervir pour boiſſon ordinaire pendant pluſieurs jours.

Ephem. vol. 5. ann. 1740. obſerv. 113. *pag.* 695.

Poudre contre l'Atrophie, ou *la maigreur des Enfans.*

Il faut prendre pendant neuf jours, le matin à jeun, dans le décours de la Lune de la Poudre de feuilles de Lierre grimpant, séchées à l'ombre; la dose en est de ce qu'il en peut tenir deux ou trois fois sur la pointe d'un couteau.

On prend cette Poudre, soit infusée en guise de Thé, soit dans un petit Bouillon; si la maladie n'est pas guérie dans les premiers jours, on recommence le même Remède au décours de la Lune suivante.

Ephem. vol. 5. ann. 1740. observ. 120. *pag.* 402.

Amulette pour faire évader le Lait.

Il faut emplir un tuyau de plume de Vif-argent, sceller le tuyau avec de la Cire d'Espagne, & le porter suspendu entre les Mammelles jusqu'à ce que le Lait soit dissipé insensiblement.

Ephem. vol. 5. ann. 1740. observ. 149. *pag.* 503.

Poudre contre la Gangréne.

Il faut donner un demi-gros de Quinquina en poudre, de trois heures en trois heures, & continuer le Reméde plusieurs jours de suite.

Ephem. vol. 5. ann. 1740. observ. 156. *pag.* 220.

Reméde contre l'Hémorragie du Nez.

Il faut attirer de l'eſprit de Vin par les Narines à différentes repriſes, & uſer pour boiſſon de l'Eau commune, à laquelle on ajoute de l'Eſprit de Vitriol juſqu'à une agréable acidité.

Ephem. vol. 6. ann. 1742. obſerv. 20. *pag.* 104.

Reméde contre l'Empyême, & les Abcès du Foie.

Il faut ſe ſervir en injection de l'eſſence de Myrrhe.

Ephem. vol. 6. ann. 1742. obſerv. 29. *pag.* 115.

Reméde contre la Rage.

Prenez cinq Hannetons pour un Adulte, & trois pour un Enfant ; étouffez-les dans du Miel ; ôtez en enſuite la tête, & pilez le reſte, pour faire prendre au Malade dans une cuillerée de Miel, le matin à jeun, pendant ſept jours de ſuite, en donnant la premiére doſe ſur le champ.

Ephém. vol 6. ann. 1742. obſerv. 92. *p.* 10. 325.

Mixture tonique contre les Hémorragies.

Prenez deux gros d'Eſprit de Vitriol ; ajoutez-y de l'Eſprit volatil de Corne de Cerf juſqu'à ſaturation ; mêlez vingt

gouttes de cette Mixture avec trois onces d'Eau de Plantain, pour faire prendre en une doſe qui ſera repétée d'heure en heure jusqu'à la ceſſation de l'Hemorragie.

Ephém. vol. 7 ann. 1744. obſerv. 15. *pag.* 56.

Bouillon contre la conſtipation invétérée.

Prenez une Poule que vous ferez mourir en lui tordant le coû, ſans la ſaigner ; faites-la cuire lentement enſuite avec ſes plumes dans une pinte d'Eau, réduiſant le tout à moitié : partagez en deux doſes, à prendre tiédes à quatre heures l'une de l'autre.

Ephém. vol. 7. ann. 1744. obſer. 27. *pag.* 75.

Topique contre l'Hémorragie utérine.

Il faut mettre les bras juſqu'aux épaules dans du Sel commun bien chaud, & les y laiſſer pendant quelques heures.

Ephém. vol. 7. ann. 1744. obſerv. 65. *pag.* 247.

Potion contre la Folie & la Manie.

Prenez du linge blanc trempé dans du ſang d'Anon, & ſéché enſuite, telle quantité que vous voudrez.

Coupez un petit morceau de ce linge de la longueur d'un doigt, & de la largeur de trois.

Mettez-le infuſer avec une demi-poi-

gnée de Mouron à fleurs rouges, dans quatre ou cinq onces d'Eau bouillante : coulez ensuite par un linge, & donnez cette Potion trois fois le jour pendant quelque-tems.

Ephém. vol. 8. ann. 1748. *Append.* pag. 11.

Poudre contre les Vers, & sur-tout les Vers plats.

Prenez des grains de Tilli, ou Pignons d'Inde, la pesanteur de quatre grains ;
du Sucre blanc, un demi-gros.

Pulvérisez le tout, & l'ayant mêlé exactement dans un mortier, partagez-le en quatre prises.

Le Malade prendra chaque dose de deux jours l'un, le matin à jeun, avalant par dessus un petit bouillon au Lait tiéde, & prenant quelques autres verres de Lait de quart d'heure en quart d'heure pendant la matinée.

Ephém. vol. 9. ann. 1752. observ. 13. *pag.* 34.

Autre Poudre de même qualité.

Prenez de la Poudre de Jalap,
un scrupule ;
du Tartre vitriolé,
douze grains ;
de l'*Assa Fœtida.*
quatre grains.

Mêlez le tout pour une dose à donner le matin à jeun, & un Bouillon par-dessus.

Ce Remède ſera répété le lendemain ou ſur-lendemain, s'il n'a pas purgé ſuffiſamment la premiére fois.

Ephem. vol. 9. ann. 1752. obſerv. 14. *p.* 41.

Poudre contre les Rhumatiſmes.

Prenez de l'Antimoine crû,
& du Sucre blanc pulvériſés,
de chacun douze grains.
Mêlez le tout pour prendre deux fois le jour pendant quelque-tems.

Ephem. vol. 9. ann. 1752. obſerv. 52. *p.* 213.

Fin de l'Extrait des Ephémérides d'Allemagne.

TABLE

TABLE ALPHABÉTIQUE

Des Remedes, Extraits des ÉPHÉMÉRIDES D'ALLEMAGNE.

AMULETTE contre les Hémorroïdes. pag. 306
contre l'incontinence d'Urine, 329
pour faire évader le Lait, 332
BOL contre les Vers, 317
BOUILLON contre la Colique, 314
contre la constipation invétérée, 334
Autre Vermifuge, 313
Autre de même qualité, 314
CATAPLASME contre la piqûre des Guêpes, & des Araignées, 309
Autre de même qualité, 321
contre la Rétention d'Urine, 311
contre la Suppression d'Urine, ibid.
contre les Plaies récentes, 320
contre la Pleurésie, 324
contre l'enflure des Jambes dans l'Hydropisie, 327
contre les Pertes de Sang, 318
contre la Sciatique, 319
contre les Vuidanges & les mois immodérés, 320
contre les douleurs & tumeurs des Articulations, 310
contre la Cardialgie, 330

COLLYRE *contre l'Ophthalmie*, 328
DÉCOCTION *contre la Goutte*, 308
contre l'Asthme, l'Opression de Poitrine, 327
contre la Jauniſſe invétérée, 308
contre le Diabétes, 309
contre les Fiévres intermittantes, 331
Vermifuge, 306
Vulnéraire, ibid.
EMULSION *contre la Rétention d'Urine*, 310
ERRHINE *ou Remede pour faire couler la pituite du Cerveau*, 307
FOMENTATION *contre la Gangréne*, 305
contre les marques que les Enfans aportent en naiſſant, 318
contre les Pertes, 328
contre le tremblement des Membres, 316
FUMIGATION *contre le flux exceſſif des Hémorroïdes*, 312
GARGARISME *contre l'inflammation & les ulcéres de la Bouche & du Goſier*, ibid.
JULEP *contre l'ardeur d'Eſtomac*, 307
contre le Flux hépatique, 315
LAVEMENT *contre la Gangréne des inteſtins*, 313
LINIMENT *contre les Aphthes*, 323
contre la Brûlure, ibid.
contre les Dartres, 320
contre les Hémorroïdes, 326
MIXTURE TONIQUE *contre les Hémorragies*, 333
Autre contre la Jauniſſe, 324
PILULES *contre la Colique de* Miſerere, 323
POTION *contre un Accouchement laborieux*, 315
Autre de même qualité, 328
Autre contre la Colique, 330

Autre contre la Fiévre quarte, 339
Autre contre les Contuſions & Bleſſures internes, 316
POTION *contre les douleurs après l'Accouchement*, 317
Autre contre la Folie & la Manie, 318
Autre contre la Jauniſſe invétérée, 334
POUDRE *contre l'Atrophie, ou la maigreur des Enfans*, 318
contre la Gangréne, 332
contre la Lépre, ibid.
contre l'Enrouement, 322
contre l'Hémorragie du Nez, 315
contre la Pierre & la Gravelle, 305
contre les Fiévres intermittantes, 325
contre l'incontinence d'Urine, ibid.
contre la foibleſſe de la Vûe, 324
contre les Rhumatiſmes, 331
contre les Ulcéres ichoreux, 336
contre la Teigne & les Poux, 320
contre les Vers & ſur-tout les Vers plats, 328
Autre de même qualité, 335
TISANE *contre la Goutte, la Colique & la Cachexie*, ibid.
Autre contre l'Hydropiſie, 326
Autre de même qualité, 319
Autre de même qualité, 380
REMEDE *contre la Diarrhée invétérée*, 329
contre la foibleſſe & ſyncope d'un Enfant nouvellement né à la ſuite d'un Accouchement laborieux, 309
contre la Dyſſenterie, 311
contre la Phthiſie, 313
contre la ſupreſſion des Régles, 314
contre la Surdité & le Bourdonnement d'Oreilles, ibid.
312

contre les Diabétes, 321
contre la Difficulté d'uriner, 319
contre la Sciatique & le Rhumatiſme, 317
REMEDE *contre l'enrouement*, 321
Autre de même qualité, 323
contre le Maraſme, ibid.
contre les Regles immodérées, 322
contre les Fleurs blanches, 318
contre l'Hémorragie qui ſuit quelquefois une Dent arrachée, 322
contre l'enflure de Ventre des Enfans, apelée le Carreau, 308
contre l'incontinence d'Urine, 306
pour empêcher les marques de la petite-Vérole, 315
contre la douleur d'Oreilles, 327
contre la Migraine, 325
contre la douleur de Tête, appellée le Clou, 330
contre la Conſtipation, ibid.
contre la Rage, 33
contre le Calcul, 33
contre le Larmoyement involontaire, 33
contre l'Hémorragie du Nez, 33
contre les Engelures ulcérées, 32
contre le poiſon du Belladona, ibid.
contre l'Empyême & les abſcès de Foie, 33
TOPIQUE *contre l'Hémorragie de la Matrice*, 33
contre les douleurs aiguës des Inteſtins, 31

Fin de la Table.

TRAITÉ
DE LA
SAIGNÉE.

In exceſſum delabuntur, qui omnium ferè Morborum ortum & cauſas ex nimiâ ſanguinis abundantiâ deducunt atque derivant, eaque propter liberales nimiùm ſunt in ſanguine profundendo ; ac in omnibus tantùm non morbis Venam ſecandam eſſe præcipiunt, prætereàque ſciunt ferè nihil.

Fridericus Hoffmanus, *De Venæ ſectionis abuſu*, Tom. V. *pag.* 340. §. 11.

C'eſt tomber dans l'excès, que d'attribuer preſque toutes les Maladies à la plénitude du ſang, & en conſéquence de ſaigner à outrance. On doit donc ſe défier de ces Gens qui ſaignent toujours, & ne ſçavent rien de plus.

TRAITÉ
DE LA
SAIGNÉE.

REGLES A OBSERVER, pour placer comme il faut les différentes Saignées dans tous les cas de Pratique, ſuivant les vraies indications.

LES RÉFLEXIONS que nous avons à faire touchant la Saignée, ſe réduiſent aux cinq Chefs ſuivans ; ſçavoir,

1°. Combien il y a d'eſpeces de Saignées.

2°. Quel avantage on doit attendre des trois différentes ſortes de Saignées, évacuative, révulſive & dérivative

3°. Quelles ſont les choſes qui permettent la Saignée, & celles qui la défendent.

4°. Quelles ſont les précautions néceſſaires qu'il faut aporter en ſaignant.

5°. Enfin, du Manuel de la Saignée, & des moyens de remédier aux accidens qui ſuivent quelquefois cette opération.

ARTICLE PREMIER.

Combien il y a d'eſpéces de Saignées.

COMME il y a deux ſortes de Vaiſſeaux dans le Corps humain ; ſçavoir les Artéres & les veines , on peut tirer du ſang des uns & des autres , & les anciens. Médecins faiſoient ſouvent ouvrir les Artéres ; mais les accidens qui ſouvent auſſi s'enſuivoient , ont fait abandonner cette méthode , & l'on s'eſt réduit à la Phlébotomie , c'eſt-à-dire , à l'ouverture des Veines , dont on n'a pas tant à craindre de mauvaiſes ſuites. Auſſi eſt-elle à préſent preſque la ſeule employée. Cependant ſi dans des cas déſeſpérés on vouloit pratiquer l'ouverture des Artéres, cette ouverture ne doit ſe faire qu'aux Artéres temporales : ou à celles qui ſont derriére les Oreilles , où par l'apui de l'Os qui ſe trouve deſſous , on peut les comprimer plus fortement , de peur que le ſang ne s'échape , & les rejoindre plus ſûrement , de peur que la cicatrice ne s'entrouve , ou ne ſe dilate par la force du ſang ; ce qui cauſeroit une Anévriſme.

Autrefois les Medecins choiſiſſoient avec un ſcrupule étonnant les Veines pour la Saignée ; car ils attribuoient des Veines propres à chaque Partie , & croyoient que c'étoit un crime de ne pas les ouvrir , toutes les fois que ces Parties étoient atta-

quées de maladies. Ainſi il falloit ouvrir la Veine interne du Coude, nommée Baſiliques, ſi les Parties qui ſont ſous les Clavicules étoient affectées ; & la Veine externe nommée Céphalique, lorſque les Parties, qui ſont au deſſus de la Gorge, ſçavoir, la Face, le Goſier, les Yeux, la Tête, étoient affligées ; enfin la Médiane, qui eſt commune aux unes & aux autres, quand il paroiſſoit néceſſaire de tirer du ſang des Parties ſupérieures & inférieures travaillées de maladies en même-tems. Mais on a abandonné ces Pratiques, qui ne ſont fondées ni ſur l'expérience, ni ſur la raiſon, & uniquement ſur les préjugés ; car aujourd'hui que la circulation du ſang eſt découverte, il eſt clair que toutes les Veines ont communication avec le Cœur, qui eſt le réſervoir univerſel du ſang, & de là avec toutes les autres Parties du corps, & que par conſéquent la quantité du ſang eſt diminuée également dans toutes les Parties, quelque Veine que l'on ouvre, & le ſang ſuperflu évacué également par tout. C'eſt pourquoi ſans penſer aux rameaux des moindres Veines, qu'on a de la peine à piquer, & qui étant piquées rendent peu de ſang, on n'ouvre que les plus grandes Veines enfoncées bien avant ſous la peau, qui ſont plus faciles à ouvrir, & qui verſent promptement beaucoup de ſang : telles ſont 1°. Les Veines du Bras droit ou gauche dites Céphalique, Médiane & Baſilique ; 2°. Les Veines des Malléoles, ſçavoir,

l'interne ou la Saphéne, l'externe ou la Sciatique ; & les branches de l'une & de l'autre répandues sur le cou du pied ; 3°. Les Veines Jugulaires externes placées des deux côtés du col.

Au reste, la Saignée, de quelque Veine qu'elle se fasse, a coutume d'être pratiquée pour trois fins : premiérement, pour diminuer la plénitude du sang, desemplir les vaisseaux trop gonflés ; & alors elle s'apelle Evacuative. Secondement, afin que le sang qui dilate violemment quelque Partie, qui l'enflamme & l'accable, en soit retiré & ramené ; & alors on la nomme Révulsive. En troisieme lieu, pour faire aborder le sang plus abondamment & plus promptement dans quelque Partie, de maniere qu'il emporte comme un torrent tous les embarras qui s'y sont formés ; & alors c'est ce qu'on apelle Saignée dérivative. Toutes ces Saignées ont chacune en particulier des avantages qui leur sont propres.

ARTICLE II.

De l'utilité de la Saignée évacuative.

1°. CETTE Saignée diminue la quantité du sang, desemplit les vaisseaux trop gonflés, relâche les Parties accablées, & tempére celles qui sont échauffées par une chaleur excessive, favorise la liberté de la circulation, excite une

ſécrétion plus facile des humeurs, rétablit l'exercice naturel des fonctions; d'où il eſt évident qu'il en réſulte de très-grands avantages pour le Corps humain.

2°. La Saignée évacuative, ſoit qu'on la faſſe d'un Artére ou d'une Veine, ſoit d'une groſſe Veine ou d'une petite, ſoit avec impétuoſité ou goutte à goutte, eſt également profitable, quoique le ſoulagement ſoit plus prompt, lorſqu'elle ſe fait plus promptement, puiſque de quelque façon qu'on tire du ſang, la maſſe qui en eſt dans le corps décroît viſiblement à meſure qu'on ôte de ſa quantité, & cela proportionnellement dans chaque Partie.

3°. Cette Saignée ſe réitére juſqu'à ce que la maſſe du ſang ſoit réduite à ſa juſte meſure, qui doit être eſtimée différemment, ſuivant l'âge, le ſexe, le tempérament, le régime de vivre, & la force du corps.

4°. Enfin la même Saignée cauſe à la vérité la léſion des forces & des fonctions, ſupoſé qu'elle paſſe les bornes preſcrites; mais toutefois elle peut être adminiſtrée ſûrement & utilement, ſi la grandeur de la maladie l'éxige, pourvû que la quantité du ſang qui reſte dans les vaiſſeaux ſuffiſe pour les fonctions néceſſaires à la vie, c'eſt-à-dire, le battement du Cœur & des Artéres, & quelque legére ſécrétion des Eſprits, pour ſoutenir les digeſtions: cette quantité du ſang qui ſuffit pour vivre, varie ſuivant les Sujets, & par conſéquent ne ſçauroit ſe définir avec

certitude, mais uniquement en examinant attentivement les forces des Malades ; ce qui eſt eſſentiel, pour ne pas excéder dans le nombre des Saignées, que l'on pouſſe ſouvent trop loin, au grand détriment des Malades.

ARTICLE III.

De l'utilité de la Saignée révulſive.

CETTE Saignée, comme nous l'avons déja dit, retire & ramene à une Partie opoſée le ſang qui aborde ailleurs avec trop d'abondance, & par-là menace ou cauſe de l'inflammation.

1°. L'effet de la Saignée révulſive s'éxécute en trois manieres ; ſçavoir, ſuivant la longueur de haut en bas, comme fait la Saignée du pied, en détournant les engorgemens de la tête ; ou ſuivant la largeur, de droite à gauche, ou de gauche à droite, comme fait la Saignée du bras opoſé à la douleur dans la Pleuréſie, ou enfin ſuivant la profondeur, de dedans en dehors, comme fait la Saignée de la Jugulaire.

2°. Cette Saignée produit la révulſion d'autant plus efficacement que la Veine eſt piquée dans des parties plus opoſées, ou ce qui eſt la même choſe, à meſure que la révulſion ſe fait par des vaiſſeaux plus éloignés. C'eſt ainſi que l'ouverture de la Veine du pied fait une plus puiſſante

révulsion du Cerveau, que la Saignée du bras ; & que cette derniere, en tant que révulsive, sans avoir égard à la dérivation, est plus efficace dans le même cas, que la Saignée de la Jugulaire.

3°. La révulsion est d'autant plus prompte & efficace, que la Veine piquée est plus ample, que l'on en fait l'ouverture plus grande, & que le sang en sort plus promptement.

4°. La Saignée révulsive est en même-tems évacuative. Elle est révulsive, tant que l'on tire actuellement du sang, & évacuative, après que le sang est tiré.

5. Enfin dans quelque Saignée que ce qui puisse être, il faut avoir égard à la révulsion, c'est-à-dire, qu'il faut tirer du sang des Parties les plus opposées à l'endroit qui est affecté. Ainsi quand les Parties supérieures qui reçoivent le sang de l'Aorte ascendante, ou qui sont au-dessus du Diaphragme, sont malades, il faut ouvrir les Veines des pieds ; quand au contraire les Parties inférieures, c'est-à-dire, celles qui sont situées au-dessous du Diaphragme, & qui reçoivent le sang de l'Aorte descendante, sont affectées, il faut ouvrir les Veines des bras : enfin si le côté droit ou gauche de la Poitrine est enflammé, comme dans la Pleurésie, il faut saigner du bras opposé au côté malade.

ARTICLE IV.

De l'utilité de la Saignée dérivative.

LA Saignée dérivative eſt celle qui fait aborder promptement & ſubitement ſur une Partie plus de ſang qu'elle n'en recevoit auparavant, & qui par-là entraîne les embarras qui pouvoient s'y être formés. Il en eſt de cette Saignée comme d'une écluſe qu'on leveroit ſur un foſſé qui auroit de la pente, & qui ſeroit plein d'immondices ; l'eau en venant rapidement par derriére, ne manqueroit pas d'entraîner & de balayer toutes les ſaletés qui s'y ſeroient amaſſées. C'eſt ainſi que dans la ſupreſſion des Mois, ſi l'on ouvre la Saphène de l'un des pieds, le ſang, qui deſcend de plus haut, eſt incontinent dérivé plus copieuſement & plus promptement vers la Matrice qui ſe rencontre ſur ſa route ; & que par ſa ſubite affluence il procure d'ordinaire les Régles pareſſeuſes & engourdies. De même, la Saignée de la gorge, après quelques Saignées du pied préalablement faites, réuſſit aſſez ſouvent dans les engorgemens du Cerveau. Il arrive auſſi quelquefois que dans les Pleuréſies, après avoir fait pluſieurs Saignées du bras opoſé à la douleur, ſi l'on vient à en faire une du même côté, cette Saignée dérivative ôte la douleur ſur le champ.

ARTICLE V.

Quels ſont les cas, qui permettent ou défendent la Saignée.

NOus avons diſtingué trois ſortes de Saignées, l'évacuative, la révulſive, & la derivative. Comme elles ont chacune leurs avantages propres & particuliers, que nous avons expoſés ci-deſſus, elles ſont auſſi conſeillées, permiſes, ou contre-indiquées par des raiſons particuliéres.

D'abord, ce qui indique ou permet la Saignée évacuative, c'eſt 1°. La quantité du ſang augmentée, accumulée, multipliée, ou la Pléthore vraie, qui gonfle les vaiſſeaux, rallentit la circulation & les ſécrétions.

2°. La trop grande raréfaction du ſang, ou la fauſſe Pléthore ou plénitude, qui équivaut à la vraie, & cauſe de pareils ſymptômes.

3°. L'accablement, la diſtenſion, l'inflammation de quelque Partie, provenant d'un ſang trop abondant, échauffé, épais.

4°. Une Hémorragie opiniâtre, ſoit du Nez, ou de la Matrice, ou des Hémorroïdes, qui montre manifeſtement que les vaiſſeaux ſont crevés par l'extrême abondance du ſang qui y aborde, ou par la raréfaction de ce même ſang qui fermente; ce qui les empêche de ſe réunir. Car ſi

l'Hémorragie étoit causée par l'âcreté du sang, qui eût corrodé les vaisseaux, il faudroit employer d'autres Remédes que la Saignée, qui même deviendroit nuisible en ce cas.

5°. La supression de quelque évacuation habituelle, comme celle des Régles, ou des Hémorroïdes, d'où il résulte un accroissement notable de la masse du sang.

6°. La Cacochymie, qui demande une circulation du sang plus libre, plus rapide, plus forte, afin que les parties nuisibles qui y sont mêlées, se brisent mieux par cette circulation augmentée, & qu'étant brisées, elles se séparent à travers les couloirs, ou se dissipent insensiblement par les pores de la Peau.

7°. La nécessité de préparer un vuide dans le corps, afin que les Remédes qu'on employera dans la suite, puissent être admis plus aisément, & se distribuer plus commodément & plus promptement dans chaque Partie.

8°. L'habitude de se faire tirer du sang dans des intervalles réglés.

Ce qui démontre que la Saignée révulsive est nécessaire, c'est,

1°. La tension, la douleur, l'oppression, la contraction convulsive, l'inflammation, l'abscès de quelque Partie.

2°. Une partie du sang qui coule d'un endroit déterminé, comme de la Matrice, du Poumon, du Nez: car alors il est également nécessaire, non-seulement de diminuer la trop grande quantité du sang, mais encore de détourner ailleurs le plus

promptement & le plus efficacement qu'il eſt poſſible, par le moyen de la révulſion, le ſang qui coule trop abondamment & trop impétueuſement dans certains vaiſſeaux.

Enfin, ce qui demande la Saignée dérivative, c'eſt la ſupreſſion d'un écoulement de ſang, ſoit naturel, comme le Flux menſtruel, ou devenu comme naturel par l'habitude, comme le Flux hémorroïdal. Car nous ſçavons, par expérience, que les évacuations ſuprimées ſont ordinairement rétablies par le cours plus rapide & plus abondant du ſang, que la dérivation attire ſur la partie, pourvû toutefois, & c'eſt à quoi il eſt eſſentiel de bien prendre garde, que la ſupreſſion à laquelle on veut remédier, ne dépende point d'une réplétion, d'une diſtenſion douloureuſe ou inflammation de la partie: auquel cas on auroit beſoin de révulſion, bien loin d'avoir recours à la dérivation, parce que la partie étant trop engorgée & trop diſtendue, ne céderoit point à l'effort du ſang qui y aborderoit pour en enlever les embarras, & que ce nouveau ſang ne pouvant paſſer outre, augmenteroit l'inflammation & tous ſes accidens. Il eſt donc eſſentiel en pratique de bien prendre garde à l'état de la partie engorgée, pour ſçavoir ſi elle n'eſt point douloureuſe, avant que d'y attirer de nouveau ſang par une Saignée dérivative.

En ſecond lieu, les cas qui permettent la Saignée copieuſe & fréquente, ſi les indications l'exigent, ſont, 1°. Un âge vi-

goureux, jeune & floriſſant ; 2°. Une vigueur entiére des forces ; 3°. La couleur de la peau, ſur-tout du viſage, fleurie & vermeille ; 4°. La chaleur répandue également dans toute l'habitude du corps ; 5°. Un pouls égal, plein, fort ; 6°. Une vie délicate & ſomptueuſe par raport aux viandes & aux autres mets de bon ſuc & fort nourriſſans ; 7°. Une vie ſédentaire, pareſſeuſe, oiſive ; 8°. Des viſcéres ſains, libres, mollets, & exempts de toute dureté ſquirreuſe ; 9°. Enfin, la connoiſſance du tempérament du Malade, qui ſuporte facilement de ſa nature, ou par l'uſage, des Saignées fréquentes & abondantes. Toutes ces circonſtances, ſi l'on y fait bien attention, démontrent qu'il y a dans les vaiſſeaux une trop grande quantité de ſang, ou que la circulation s'éxécute librement dans tous les viſcéres ; ce qui donne plus d'aſſurance dans les Saignées que l'on a à faire.

En troiſiéme lieu, on doit au contraire ou omettre abſolument la Saignée, ou ne la pratiquer qu'avec circonſpection, ſi les ſignes que nous allons expoſer, la contre-indiquent ou défendent.

1°. Si l'âge eſt caduc, comme dans les Vieillards décrépits; ou trop tendre comme dans les petits Enfans. 2°. Si les forces ſont foibles par une conſtitution naturelle, ou épuiſées par une maladie précédente, par les plaiſirs, les veilles, ou par des éxercices immodérés. 3°. Si la peau, particuliérement du viſage, eſt pâle, ou teinte d'une bile jaune, verte, noire. 4°. Si les

extrêmités du corps ſont froides, ſoit continuellement, ou par de fréquens intervalles. 5°. Si le pouls eſt foible, rare, moû, inégal, intermittant. 6°. Si le régime de vivre a été frugal, comme de poiſſon, de légumes, de fruits, & d'autres alimens peu ſucculens. 7°. Si l'on méne une vie dure, pauvre, laborieuſe. 8°. Si différens viſcéres ſe trouvent obſtrués, engorgés, tuméfiés, ſquirreux. 9°. Enfin ſi le Malade eſt d'un tempérament infirme, uſé, & nullement accoutumé à la Saignée: car de toutes ces circonſtances on peut conclure qu'il y a peu de ſang, ou que la force motrice du cœur eſt foible, ou qu'il y a divers embarras qui s'opoſent à la liberté de la circulation; ce qui doit détourner une Perſonne prudente des Saignées abondantes & fréquentes.

ARTICLE VI.

Quelles ſont les Précautions néceſſaires pour la Saignée.

C'EST le devoir d'un Médecin prudent, non ſeulement de bien connoître l'utilité & la néceſſité de la Saignée, mais auſſi de faire attention à ce qui concerne le tems, la maniére, la quantité du ſang qu'il faut tirer; en un mot, à tout ce qui doit précéder & ſuivre la Saignée. Ainſi il eſt à propos de retenir ſoigneuſe-

ment les régles ſuivantes, comme étant aprouvées par l'uſage & la raiſon, qui en montrent l'heureuſe pratique.

1°. On ne doit point tirer du ſang que loin du repas, & quand l'Eſtomac eſt vuide ; de façon qu'il ne fourniſſe plus de Chyle au ſang, & que celui qui lui a déja été fourni, ne conſerve plus ſa forme : car autrement on tire avec du ſang un Chyle tout pur, qui ſurnage, comme du lait, le ſang qui a été tiré. C'eſt pour cela qu'il eſt d'uſage de ſaigner le matin à jeun, ou quatre à cinq heures après le dîner. Néanmoins ſi la maladie eſt preſſante, comme une grande Inflammation, une Apoplexie, une Suffocation conſidérable, une chûte grave, une forte contuſion, à quelque heure du jour que ce ſoit, il eſt permis d'ouvrir la veine ſans aucun délai.

2°. Il convient auſſi de faire précéder la Saignée par un Lavement, afin que la circulation du ſang dans le bas-ventre devenant plus libre, la révulſion & l'évacuation ſe faſſent plus commodément, & que les matiéres viciées contenues dans les premiéres voies ne paſſent pas dans le ſang, pour y remplir le vuide que la Saignée a laiſſé.

3°. Il faut bien ſe donner de garde de ſaigner dans le friſſon, qui eſt d'ordinaire le prélude d'un accès de Fiévre : car il paroît clairement par la foibleſſe du pouls, que la circulation du ſang eſt alors beaucoup rallentie & embarraſſée ; mais ſi-tôt qu'il y a une grande chaleur, on ouvre la veine en toute ſûreté, parce qu'alors

le ſang coule rapidement, & qu'il dilate extrêmement les vaiſſeaux de tout le corps; ce qui rend la néceſſité de la Saignée plus urgente. Auſſi choiſit-on aujourd'hui le montant de la Fiévre pour faire les Saignées. Il y a même de grands Médecins qui font ouvrir la veine dans le fort de l'accès, ſans qu'il paroiſſe que leur Pratique ſoit ſuivie d'aucun mauvais effet.

4°. Il ne faut pas ſaigner les Femmes dans le tems de leurs Régles attendu qu'il paroit téméraire de troubler une évacuation qui ſe fait ſuivant les loix de la Nature, par une autre évacuation qui peut la déranger. Cependant ſi la maladie requiert la Saignée, comme l'Apoplexie, la Pleuréſie, la Suffocation, on peut en aſſurance la faire de la Saphène, c'eſt-à-dire, de l'un des Pieds, même dans le Flux menſtruel, qui n'en eſt pas pour cela diminué, mais plutôt augmenté au moyen de la dérivation.

5°. La Saignée eſt tellement utile aux Femmes enceintes, qu'il en eſt peu à qui elle ne convienne, ſoit pour empêcher qu'elles ne ſe bleſſent, ſoit pour les guérir de pluſieurs incommodités qui leur arrivent dans ce tems-là. Car comme elles n'ont point de menſtrues, leurs vaiſſeaux ſont plus remplis de ſang, & ne ſe contractent par conſéquent que foiblement: la circulation du ſang y eſt lente, principalement dans les Parties internes, où il s'accumule en plus grande quantité; & cela arrive ſur-tout dans les Femmes qui ſont jeunes, qui ont bon apétit, &

qui ſont d'un tempérament ſanguin. De cette grande plénitude du ſang viennent les dilatations des vaiſſeaux, même ſur la peau, la peſanteur de tête, les laſſitudes ſpontanées, la difficulté de ſe mouvoir, le ſaignemeut de Nez qui leur arrive ſi ſouvent. Tous ces ſymptômes demandent néceſſairement la Saignée.

On ſaigne vers le troiſiéme ou le quatriéme mois de la groſſeſſe, & enſuite vers le huitiéme ou neuviéme : cependant ſi une Femme enceinte étoit d'un tempérament ſanguin, on pourroit réïtérer quelquefois la Saignée depuis le troiſiéme juſqu'au neuviéme mois, & même on pourroit ſaigner dans quelque mois que ce fût de la groſſeſſe, ſi le cas le requéroit, ſans craindre de faire avorter ; mais il faut toujours ſaigner du bras, & jamais du pied, ſi ce n'eſt dans un danger évident de perdre la vie, & qu'il n'y eût que ce ſeul Reméde pour la conſerver, parce que cette Saignée attirant une plus grande quantité de ſang dans la Matrice, pourroit procurer l'avortement.

Il faut remarquer que les Saignées aux Femmes enceintes doivent être petites, de peur que ſi on les faiſoit trop grandes, les vaiſſeaux déja un peu affaiſſés à cauſe de la lenteur du mouvement du ſang, ne fuſſent expoſées à un affaiſſement ſubit : le ſang étant épais, & ne roulant qu'avec peine, ne pourroit compenſer aſſez-tôt la quantité de celui qui ſort par la veine ouverte, pour conſerver par-tout l'équilibre ſi néceſſaire entre les ſolides & les fluides.

C'eſt pour éviter cet affaiſſement ſubit, (ou pour parler communément, une trop grande révolution) qu'en certains Pays, lorſqu'il s'agit de ſaigner les Femmes enceintes, l'uſage eſt d'ouvrir quelqu'une des plus groſſes branches qui rampent ſur l'avant-bras, ſur le poignet, ou le deſſus de la main, & qu'on ouvre rarement les veines qui ſe preſentent au pli du bras.

On ne doit pas oublier qu'il faut également faire de petites Saignées dans les maladies des Femmes enceintes qui en demandent de fréquentes ; telles que ſont la Péripneumonie, la Pleuréſie, &c. car les Saignées trop fortes leur ſont ſouvent plus pernicieuſes que favorables.

6°. Il a été reconnu par des obſervations réïtérées, que l'on peut ſaigner avec ſûreté dans les Fiévres malignes, quand même il paroîtroit des taches pourprées ſur la peau, ſi la grandeur de la Fiévre & la violence des accidens le demandent, & que les forces du Malade le permettent ; ce qui eſt d'ailleurs conforme à la raiſon, puiſque les taches pourprées, & toutes les éruptions de la peau qui s'obſervent dans les Fiévres malignes, ſont autant de legers embarras du ſang dans le tiſſu de la peau, leſquels ſemblent indiquer la Saignée, afin d'en rendre la circulation plus libre.

7°. Il faut toujours tirer du ſang d'une groſſe veine, & par une large ouverture, non pas parce qu'on tire un ſang plus pur d'une petite veine, comme s'imagine ſans

raiſon le Vulgaire ignorant, mais parce que le ſang ſort avec plus d'impétuoſité d'une groſſe veine, & par une large inciſion ; ce qui procure une révulſion plus grande, plus prompte & plus efficace.

8°. Si le Malade apréhende la Saignée, ou qu'il ſoit foible de complexion, & qu'ainſi il ſoit en danger de tomber en ſyncope ; on a coutume de le ſaigner couché dans ſon lit, parce que dans cette ſituation le ſang circule plus aiſément, & par conſéquent la défaillance eſt plus rare. Il ſera encore très-utile d'apliquer dans le moment une compreſſe avec la bande ſur l'ouverture de la veine, & de différer un peu la Saignée, juſqu'à ce que l'eſprit du Malade ſoit parfaitement raſſuré.

9°. Si le ſang coule trop lentement de la veine qu'on a ouverte, on pourra en accélérer le mouvement par la toux, l'éternuement, ou l'agitation des muſcles du bras, c'eſt-à-dire, en faiſant tourner dans la main l'étui à Lancettes. Il eſt même quelquefois expédient de plonger le bras dans l'eau chaude, comme c'eſt la coutume dans la Saignée du pied, parce que la chaleur de l'eau, en raréfiant & dilatant le tiſſu de la Partie, attire un flux plus rapide de ſang.

10°. Au commencement de la maladie en doit faire les Saignées plus copieuſes, les forces étant encore entiéres : mais dans la ſuite il faut tirer du ſang avec plus de ménagement, les forces étant déja abbatues par la longueur de la maladie, par une diéte plus exacte, & par les Saignées

gnées précédentes. Néanmoins il ne faut jamais aller à plus de quatre palettes, ou d'une livre de ſang : en effet, il vaut beaucoup mieux réïtérer la Saignée pluſieurs fois dans un jour, ſi la maladie le demande, que de porter préjudice à la circulation du ſang, en tirant d'une ſeule fois une quantité de ſang démeſurée, & de cauſer une défaillance conſidérable, qui n'eſt jamais ſans danger.

11°. Enfin, il eſt permis au Malade de s'endormir après qu'on lui a tiré du ſang ; & même il convient qu'il dorme, s'il le peut, parce que rien ne renouvelle les forces plus promptement que le ſommeil. Nous ſçavons bien que les anciens Médécins étoient d'un ſentiment contraire, puiſqu'ils défendoient avec ſoin de dormir après la Saignée ; mais nous croyons que cela venoit de ce qu'étant dans l'uſage de faire des Saignées copieuſes, & de pluſieurs livres de ſang à la fois, ils apréhendoient avec raiſon que ſous l'aparence du ſommeil, leur Malade ne fût tout à coup enlevé par une défaillance.

ARTICLE VII.

Du Manuel de la Saignée *.

LA Saignée eſt l'ouverture d'un vaiſſeau ſanguin, que l'on fait avec une Lancette, pour tirer du ſang.

Cette opération eſt très-ancienne, & une des plus ordinaires de la Chirurgie. Quoique la pratique en paroiſſe fort ſimple, elle ne laiſſe cependant pas d'avoir ſes difficultés ; & il ſe rencontre quelquefois des circonſtances qui rendent cette opération très-délicate. Elle peut être ſuivie d'accidens plus ou moins fâcheux pour les Malades, & qui terniſſent la réputation du Chirurgien * *. Il eſt donc bien important pour ceux qui ſe deſtinent à la Chirurgie, d'aprendre de bonne heure à bien ſaigner, & de connoître les accidens qui réſultent d'une Saignée ma faite, afin de les éviter, ou d'y remédier.

* *Cet Article eſt tout entier de M. de Courcelles, Médecin de la Marine à Breſt. Comme il convient parfaitemene à notre ſujet, & qu'il s'en eſt répandu fort peu d'Exemplaires dans le Public, nous avons ſuivi ſon intention, en l'enſérant dans cet Ouvrage.*

** Nous employons ici le terme de Chirurgien préférablement à tout autre. C'eſt un mot générique, qui peut convenir à toute perſonne qui ſaigne.

Des qualités que doit avoir un Chirurgien, pour bien ſaigner.

Un Chirurgien, pour bien ſaigner, doit avoir la vûe bonne, la main ferme & aſſurée, le tact fin & délicat; & commencer de bonne heure. Il faut qu'il ſoit ambi-dextre, c'eſt-à-dire, qu'il ſçache opérer également des deux mains; car il faut ſaigner de la main droite au bras & au pied droit; & de la gauche, au bras & au pied gauche. Il évitera ſoigneuſement les excès, & les éxercices qui pourroient lui rendre la main peſante & chancelante. Il doit être prudent & ſage, hardi ſans témérité, & avoir une connoiſſance exacte des vaiſſeaux qu'il doit ouvrir, & des Parties qui les avoiſinent. Cette connoiſſance lui inſpirera de la confiance, & le mettra en état de prévoir les accidens, & d'y remédier, s'il en arrive.

Des Vaiſſeaux qu'on doit ouvrir.

On diſtingue dans le Corps humain deux ſortes de vaiſſeaux ſanguins, des Artéres & des Veines. Les premiers reçoivent le ſang du Cœur pour le porter à toutes les Parties; les ſeconds raportent des Parties au Cœur une portion du ſang qui y a été diſtribué. Ces deux ſortes de vaiſſeaux ſont fort aiſés à diſtinguer dans le corps vivant, les Artéres ayant un mouvement de pulſation que les Veines n'ont pas, ou du moins qui eſt ſi foible dans celles-ci, qu'on ne les diſtingue point au toucher.

L'ouverture des Artéres s'apelle *Artériotomie* : on la pratique rarement ; encore n'eſt-ce qu'à l'Artére Temporale. Celle des Veines s'apelle *Phléboiomie* : c'eſt celle qui eſt la plus uſitée, & que l'on entend ordinairement par le mot de *Saignée*.

On peut ouvrir toutes les Veines qui ſe préſentent à l'extérieur ; mais celles qu'on ouvre aujourd'hui le plus communément, ſont celles du Bras, du Pied & du Col.

Des Veines que l'on ouvre au Bras.

Il y a au pli du bras quatre Veines que l'on peut ouvrir, ſçavoir, la Céphalique, la Médiane, la Baſilique & la Cubitale.

La Céphalique eſt placée à la partie ſupérieure externe du coude, vers le condyle externe de l'Humerus.

La Médiane eſt ſituée un peu plus bas, au milieu du bras : c'eſt une communication de la Céphalique avec la Baſilique. C'eſt ſous cette Veine que ſe rencontre ordinairement le tendon du Muſcle *biceps*.

Au deſſous de la Mediane, & plus près de la partie interne du bras, eſt placée la Baſilique, ſous laquelle ſe rencontre ordinairement l'Artére.

La Cubitale eſt cette Veine qui eſt la plus voiſine du condyle interne de l'Humérus.

Ces quatre Veines ſont des ramifications de la Veine Axillaire, qu'elles forment en ſe réuniſſant au haut du bras. Elles raportent le ſang de la main, & ne ſont recouvertes que de la peau & de la graiſſe.

On peut ouvrir l'une ou l'autre de ces quatre Veines. On préfére cependant ordinairement d'ouvrir la Médiane, ou la Baſilique, parce qu'elles ſont plus commodément ſituées, & qu'étant plus groſſes, elles fourniſſent plus de ſang en tems égal. Au défaut de celles-ci, on ouvre la Céphalique, où il n'y a aucun riſque. Pour la Cubitale, quoiqu'il n'y ait rien à craindre en la piquant, on y ſaigne aſſez rarement, tant à cauſe de ſa ſituation, qui n'eſt pas commode pour l'Opérateur, que parce que le ſang ne forme point l'arcade en ſortant.

Lorſqu'on ne peut ouvrir aucune de ces Veines, ſoit parce qu'elles ne ſont pas aſſez ſenſibles, ou qu'on courroit riſque de bleſſer l'Artére, ou le Tendon du Muſcle *biceps*, ou ſon Aponévroſe; alors on ouvre quelqu'une de celles qui rampent ſur l'avant-bras ou ſur le poignet, qui ſont les racines de ces quatre Veines principales. Elles ſont à la vérité moins conſidérables; mais on n'eſt pas expoſé aux mêmes dangers. On choiſit par préférence celles qui ſont plus groſſes & plus aparentes. Si l'on ſe détermine pour l'une de celles qui rampent ſur le poignet, il faut prendre garde de piquer les Tendons des Muſcles; ce que l'on évite en faiſant une inciſion peu profonde.

Des Veines que l'on ouvre aux Pieds.

Il y a aux pieds deux Veines que l'on peut ouvrir; ſçavoir, la Saphéne interne,

& la Saphéne externe, que l'on nomme auſſi Veine Sciatique.

La premiére eſt cette branche aſſez conſidérable, qui eſt couchée ſur la Malleole interne. La ſeconde eſt couchée ſur la Malléolé externe.

Quand ces deux Veines ne ſont pas aſſez aparentes, ſi on ſaigne quelqu'une de celles qui rampent ſur le pied, en évitant de faire l'inciſion trop profonde, pour ne point bleſſer les Tendons.

Des Veines que l'on ouvre à la Gorge.

On trouve aux parties latérales du col deux Veines aſſez conſidérables, une de chaque côté, qui reçoivent le ſang de toutes les parties extérieures de la tête & de la face, pour s'en décharger dans les ſoûclavieres. Ce ſont les Veines Jugulaires externes qui ſe trouvent recouvertes par la peau, la graiſſe & le Muſcle peaucier. C'eſt l'une ou l'autre de ces deux Veines que l'on ouvre, lorſqu'on ordonne la Saignée du col.

Les meilleurs Praticiens préférent aujourd'hui cette Saignée à celles de la Préparate, de la Temporale, de l'Angulaire, de la Nazale & des Ranines, ſi recommandées chez les Auteurs qui ont écrit avant la découverte de la circulation du ſang; & l'on n'ouvre plus guéres ces Veines que pour tenir lieu de ſcarifications, & pour dégorger immédiatement du ſang ſurabondant les Parties auſquelles elles ſe diſtribuent.

Les raiſons de cette préférence ſont, 1°. Que toutes ces Veines vont ſe décharger dans les Jugulaires externes, & que par conſéquent en vuidant celle-ci, on n'évacue pas moins les premiéres, que ſi on les ouvroit immédiatement. 2°. Les Veines Jugulaires ſont plus groſſes, & par conſéquent plus faciles à ouvrir : étant plus groſſes, elles fourniſſent plus de ſang en tems égal, l'opération dure moins, & le ſoulagement eſt plus prompt.

Des Lancettes.

La Lancette eſt l'inſtrument dont on ſe ſert ordinairement pour ſaigner. On y conſidére en général la lame & la châſſe, ou le manche. La lame eſt une eſpéce de lance d'acier bien trempé, très-pointue, & tranchante ſur les côtés. Elle a trois parties, la pointe, le milieu & le talon. La châſſe eſt faite de deux petites lames d'écaille aſſez minces, qui ſervent à conſerver la lame. Plus cette châſſe eſt ſimple, & moins elle eſt chargée d'ornemens, plus elle eſt legére ; & par conſéquent meilleure elle eſt.

Les conditions d'une bonne Lancette ſont de n'être point trop grande, afin de ne point embarraſſer par ſa grandeur ; d'avoir le tranchant net, fin & fort adouci, & la pointe fort aiguë, conſervant cependant un peu de corps & de ſoutien.

Il convient qu'un Chirurgien ait toujours un étui garni de pluſieurs Lancettes de différentes ſortes, qui ne ſoient ni rouil-

lées, ni émouſſées. On en trouve chez les Couteliers de trois eſpéces ; ſçavoir, des Lancettes à grain d'orge, des Lancettes à grain d'avoine, & d'autres en pyramide.

La Lancette à grain d'orge eſt celle qui ne commence à perdre de ſa largeur que fort près de la pointe, & vers le milieu du bruni.

La Lancette à grain d'avoine a la pointe plus alongée que la précédente, & commence ordinairement à perdre de ſa largeur au milieu du fer, & ſe termine en une belle pointe.

La Lancette en pyramide, ou à la langue de ſerpent, diminue en largeur dès ſa baſe, & ſe termine en une pointe très-allongée, très-fine & très-aiguë. On ne ſe ſert guères de celle-ci que pour des vaiſſeaux extrêmement fins & très-profonds. Il faut avoir pour cela la main bien ſûre ; & un Commençant ne doit point abſolument s'en ſervir.

On ſe ſert plus ordinairement des deux premiéres. Celle à grain d'orge convient particuliérement pour les vaiſſeaux qui ſont gros & ſuperficiels, qui n'ont pas beaucoup de ſaillie en-dehors, qui ſont avoiſinés de peu de graiſſe, & qui ſont recouverts d'une peau fine & délicate. Comme elle a la pointe plus large que les autres, il ſuffit de la plonger dans le vaiſſeau, pour faire une ouverture raiſonnable, ſans être obligé de la lever pour l'agrandir. C'eſt celle que l'on recommande ſur-tout aux Commençans, qui n'ont pas encore la main bien aſſurée.

Pour les vaiſſeaux profonds & enfoncés on prefére la Lancette à grain d'avoine. On peut même dire qu'elle eſt la meilleure de toutes, & qu'elle convient également aux vaiſſeaux qui ſont ſuperficiels, & à ceux qui ſont profonds.

De la maniére d'ouvrir les Vaiſſeaux.

On peut ouvrir les veines de trois maniéres; ou ſuivant la direction des fibres longitudinales, ou tranſverſalement, ou obliquement. Quelques Chirurgiens recommandent de faire une ouverture longitudinale aux groſſes Veines, d'ouvrir en travers celles qui ſont petites, & obliquement celles qui ſont médiocres.

L'ouverture longitudinale a cet avantage ſur les deux autres, que les lévres de la plaie ſe réuniſſent plus aiſément, que lorſqu'elle eſt tranverſale ou oblique : cependant cette derniére eſt plus commode pour la ſortie du ſang, & quelquefois pour l'Opérateur même.

On diſtingue deux tems dans l'ouverture d'une Veine, celui de la ponction & celui de l'élévation. Le tems de la ponction eſt celui que l'on met à faire le chemin de dehors en dedans du vaiſſeau, & à percer avec la pointe & les deux tranchans de la Lancette les tégumens & le vaiſſeau. Le tems de l'élévation eſt celui que l'on emploie pour retirer la Lancette de dedans le vaiſſeau, en faiſant avec le tranchant ſupérieur une petite élévation, afin d'agrandir l'ouverture du vaiſſeau & des tégu-

mens. Voici comme ces deux mouvemens s'exécutent.

On prend le talon de la Lancette qui eſt pliée à angle mouſſe, avec le pouce & le doigt indice ; car il n'y a que ces deux doigts qui doivent agir. On poſe legérement les autres doigts ſur la Partie qu'on doit ſaigner, afin d'affermir la main : on fléchit les deux doigts qui tiennent la Lancette ; & en les allongeant, on perce les tégumens à l'endroit marqué. On la plonge doucement juſqu'à ce que l'on ſoit entré dans le vaiſſeau ; ce que l'on reconnoit par une legére réſiſtance de la Veine, ſemblable à celle que l'on ſent en perçant du cannepin, & par quelques goutes de ſang qui ſortent de la plaie. Alors on retire la Lancette en l'élevant un peu, pour agrandir l'ouverture avec le tranchant ſupérieur.

Il faut avoir attention de porter la Lancette plus ou moins à plomb ſur la peau, ſuivant que le vaiſſeau que l'on veut ouvrir, eſt plus ou moins enfoncé. S'il eſt fort profond, on porte la lancette preſqu'à plomb : autrement on courroit riſque de paſſer par deſſus ſans le toucher ; ou bien on ne feroit que l'effleurer.

Quant à la grandeur de l'ouverture, il faut la proportionner à la groſſeur du vaiſſeau. Elle doit être aſſez grande pour procurer au ſang une ſortie libre. En général, lorſque les vaiſſeaux le permettent il vaut mieux faire une ouverture raiſonnablement grande, qu'une petite, parce qu'en tems égal on tire plus de ſang, & que la Saignée dure moins.

De la Saignée du Bras.

Quand un Chirurgien eſt apelé pour faire une Saignée du bras, il doit avant ſon opération faire attention aux choſes ſuivantes.

1°. Il faut préparer une bande, une compreſſe, un verre d'eau, ou du vinaigre, ou quelque eau ſpiritueuſe, pour faire revenir le Malade, en cas qu'il lui ſurvienne une foibleſſe. La bande doit être de toile, qui ne ſoit ni trop neuve, ni trop uſée, ſans liſiére, ni ourlets, afin que la compreſſion ne ſoit pas plus forte ſur les bords qu'au milieu : ainſi un ruban de fil ne convient point. Elle doit avoir une aune & demie de longueur, & un pouce de largeur. La compreſſe ſera faite d'un linge fin, blanc de leſſive, plié en carré & en pluſieurs doubles. Une ſeule ſuffit pour l'ordinaire ; mais quand on a affaire à un bras bien gras, on a ſoin d'en avoir deux, dont l'une ſoit un peu plus grande que l'autre, afin que la compreſſion ſoit plus ſûre & plus exacte.

2°. Il faut avoir des palettes pour recevoir le ſang, & ſe régler ſur la quantité que l'on veut en tirer. Chaque palette contient ordinairement trois ou quatre onces.

3°. Si la lumiére du jour n'éclaire pas ſuffiſamment, on fait allumer une chandelle, que l'on donne à tenir à un aſſiſtant. La chandelle eſt préférable à la bougie, à moins que ce ne ſoit celle qu'on apelle *Bougie de Saint Côme*, parce que s'il tom-

boit quelque goutte de ſuif ſur le bras, il ne brûle pas comme la cire des bougies ordinaires, & le Malade n'eſt point expoſé à retirer ſon bras, & dans le cas de ſe faire eſtropier.

4°. On a une ligature de drap écarlate, qui ne ſoit ni trop fin, ni trop gros, dont on ſe ſert pour faire gonfler les vaiſſeaux. Elle doit être coupée de droit fil, afin de ſerrer également; & avoir environ une aune de longueur, afin qu'elle puiſſe convenir à toutes ſortes de bras; & un pouce de largeur: plus larges, elles ne compriment pas ſuffiſamment, parce qu'elles agiſſent ſur un trop grand eſpace; d'où il s'enſuit que le vaiſſeau ne ſe gonfle & ne durcit pas aſſez pour ſe faire ſentir: plus étroites, elles cauſent beaucoup de douleur, & meurtriſſent le bras, qui devient tout noir quelque-tems aprés la Saignée, ſur-tout ſi la peau eſt fine & délicate.

5°. Après ces préparatifs, le Chirurgien doit mettre ſon Malade dans une ſituation commode. Si c'eſt une Saignée de précaution, il peut le faire aſſeoir dans un fauteuil; mais s'il a peine à ſoutenir la Saignée, & s'il eſt ſujet à tomber en foibleſſe, il ſera plus ſûrement & plus commodément dans ſon lit, ſoit à ſon ſéant, ſoit couché horiſontalement.

6°. Lorſque le Chirurgien a bien ſitué ſon Malade, il lui découvre le bras juſqu'à environ quatre travers de doigt au deſſus du coude, obſervant que le poignet de la chemiſe ou de la camiſole ne le ſerre pas trop; ce qui feroit une contre-ligature qui

gêneroit le cours du ſang. Il fait enſuite étendre le bras du Malade, dont la main doit être ouverte, & la paume apliquée ſur la poitrine, afin que les Muſcles de l'Avant-bras n'étant pas gonflés, ne faſſent pas changer la ſituation des Veines: en un mot, il le met dans la même ſituation où il doit être quand on le pique.

7°. Il examine enſuite les Veines, & ſi elles ne ſe découvrent pas d'abord à la vue, ni au toucher, il les rend ſenſibles par la ligature. Mais avant que de la faire, il doit s'aſſurer de la ſituation de l'Artére & du Tendon, afin de les éviter. Car il y a des bras, où l'Artére eſt preſque auſſi ſuperficielle que la Veine, de maniére qu'on pourroit s'y tromper, ſur-tout dans les perſonnes maigres & âgées. Lorſqu'il eſt bien aſſuré de la ſituation de l'Artére, il prend la ligature preſque par le milieu, laiſſant le chef qui pend en dedans du bras, un peu plus long que l'autre, parce qu'il doit ſervir à faire un nœud coulant. Il poſe la ligature trois ou quatre travers de doigt au-deſſus de l'endroit où il doit piquer; il fait croiſer les deux chefs derriére le bras, ayant attention de ne pas pincer la peau, pour venir faire à la partie externe du bras une boucle, dont l'anſe doit être en haut, & les chefs pendans. On ne ſerre d'abord la ligature qu'autant qu'il eſt beſoin pour comprimer la Veine, ſans ſerrer l'Artére. Si la Veine qu'on ſe propoſe d'ouvrir eſt ſuperficielle, on raproche un peu plus la ligature; ſi au con-

traire elle eſt profonde, on l'éloigne davantage, pour lui donner plus de ſaillie. Après avoir mis la ligature, on fait ſur l'Avant-bras quelques frictions avec le doigt indice & celui du milieu, en montant du poignet vers le pli du Coude, & on détermine la Veine que l'on doit ouvrir. On plie enſuite le bras, & on le remet dans le lit, pour donner aux vaiſſeaux le tems de ſe gonfler, & choiſir dans ſon étui une Lancette convenable. Quand on a choiſi ſa Lancette, on l'ouvre à angle mouſſe, & on la porte à la bouche, de maniére que la pointe ſoit tournée du côté du bras qu'on veut ſaigner. Enſuite le Chirurgien reprend le bras de ſon Malade, qu'il fait étendre & apuyer ſur la poitrine comme auparavant, en lui faiſant fermer la main, le pouce entre les doits, afin que les muſcles pouſſent les Veines en dehors, & les aſſujettiſſent : ou bien il donne à tenir ſon Lancetier ; ce qui produit le même effet. Il reſerre la ligature, s'il eſt néceſſaire ; il détermine l'endroit qu'il veut piquer ; il fait quelques frictions ſur l'Avant-bras de bas en haut, afin de gonfler le vaiſſeau ; il l'aſſujettit, ſoit en mettant le pouce deſſus, trois ou quatre travers de doigt plus bas que l'endroit où il a deſſein de piquer, ſoit en embraſſant l'Avant-bras par derriére avec la main, de ſorte que la peau ſoit un peu tendue ; de cette maniére on aſſujettit mieux le vaiſſeau, & c'eſt la Pratique qu'on doit ſuivre pour les vaiſſeaux roulans. Il touche l'en-

droit marqué avec ſon doigt indice, pour voir ſi par les mouvemens qu'il vient de faire, la Veine n'a pas changé de ſituation. S'il retrouve la Veine dans le même état, il y fait une petite marque avec ſon ongle, ou bien ſans perdre de vue l'endroit qu'il a obſervé, il prend la Lancette avec le pouce & le doigt indice, & il fait ſon ouverture, comme il a été dit ci-deſſus.

Le ſang jallit dès qu'on retire la Lancette. La perſonne chargée de la palette la preſente ; on recommande au Malade de tourner le Lancetier dans ſa main, afin que le mouvement des muſcles faſſe paſſer plus vîte le ſang des Veines internes dans les externes. Pendant que le ſang ſort, le Chirurgien ſoutient avec ſa main l'Avant-bras du Malade. Si le ſang ne fait point l'arcade, on lâche un peu la ligature, ſi elle eſt trop ſerrée, afin qu'il coule plus librement par l'Artére ; ſi au contraire la ligature étoit trop lâche, & qu'elle ne comprimât pas aſſez la Veine, on la ſerreroit un peu. Mais il faut toujours avoir attention de mettre l'ouverture des tégumens vis-à-vis de celle de la Veine, quand on veut que le ſang ſorte d'un plein jet, & que la Saignée ne ſoit pas baveuſe.

Quand on a tiré aſſez de ſang, on ôte la ligature, & on fait plier l'Avant-bras ; après quoi on poſe le doigt indice & celui du milieu de la main qui n'a point fait la Saignée, à côté de l'ouverture, & avec ces deux doigts on fait faire à

la peau un petit mouvement demi-circulaire, afin de couvrir l'ouverture de la Veine, & d'empêcher le ſang de ſortir. On prend de l'autre main une compreſſe ſans la mouiller ; & avant que de la poſer, on relâche l'ouverture ; on fait au deſſus & au deſſous une petite friction pour dégorger le vaiſſeau ; on replace enſuite les deux doigts à côté de l'ouverture, & on arrête le ſang ; on nettoie les endroits du bras que le ſang a tachés, ou avec la compreſſe, ou pour plus de propreté, avec le coin d'une ſerviette mouillée. On met enſuite la compreſſe ſur l'ouverture, que l'on aſſujettit avec le doigt indice. Après quoi l'on poſe ſur la compreſſe une bande, dont on laiſſe pendre un demi-pied derriére l'Avant-bras ; on la conduit au deſſus du coude, d'où repaſſant ſur la Saignée, on fait une circulaire au haut de l'Avant-bras ; & l'on continue ainſi, en croiſant toujours ſur la compreſſe autant de fois que la bande le permet. On noue les deux bouts ſur le derriére de l'Avant-bras, & on recommande au Malade de le tenir à demi fléchi & apuyé ſur ſon eſtomac ſans le remuer, afin que le ſang ne s'échape pas.

REMARQUES.

1°. Le vaiſſeau qu'on ſe propoſe d'ouvrir, eſt quelquefois ſitué directement ſur le Tendon du Muſcle *biceps*, qui fait ſaillie dans certains Sujets. Pour éviter de le piquer, on fait mettre le bras

du Malade en pronation, c'eſt-à-dire, la paume de la main tournée en bas, & ce Tendon qui a ſon attache derriére la petite Apophyſe du *Radius*, ſe cache pour ainſi dire, & s'enfonce ; ou bien, ce qui vaut encore mieux, on fait un peu fléchir l'Avant-bras, pour éloigner le vaiſſeau du Tendon.

2°. Lorſqu'on a mis la ligature, ſi le vaiſſeau n'eſt pas bien aparent, on met le doigt indice on le pouce d'une main ſur la Veine, & l'on fait de l'autre main avec le doigt du milieu & l'indice pluſieurs frictions le long de l'Avant-bras : le Chirurgien renvoie par ce moyen la colomne de ſang vers ſon pouce ; le vaiſſeau devient plus ſenſible, & fait connoitre s'il fournira aſſez de ſang, & s'il eſt bien enfoncé, le lieu où il l'eſt moins, eſt celui où il faut faire l'ouverture.

3°. Il ne faut jamais piquer, à moins que le vaiſſeau ne ſoit ſenſible au tact, quand même quelques cicatrices l'indiqueroient : car on ne pourroit piquer qu'au hazard ; ce qui ſeroit imprudent. Il y a des vaiſſeaux qui ne ſe font pas ſentir auſſi-tôt que la ligature eſt faite, mais ſeulement quelque-tems après.

4°. S'il y a du danger d'ouvrir les vaiſſeaux au pli du bras, à cauſe de leur petiteſſe, jointe à la proximité de l'Artére ou du Tendon, il faut ſaigner à l'Avant-bras ou au poignet.

5°. Lorſque les vaiſſeaux ſont ſi enfoncés, qu'on ne les diſtingue pas au

pli du coude, ni même à l'Avant-bras, on fait mettre l'Avant-bras dans l'eau chaude, qui, en raréfiant le ſang, fait gonfler les Veines.

6°. Les perſonnes graſſes ont ordinairement les vaiſſeaux très-enfoncés, & entourés de beaucoup de graiſſe; ainſi il n'y a pas tant à craindre de piquer l'Artére, ou le Tendon, l'Aponévroſe, que dans les perſonnes maigres ou âgées, qui ont les vaiſſeaux fort aparens, & quelquefois collés ſur l'Artére, le Tendon, ou l'Aponévroſe. Il faut dans ce cas-là porter la pointe de la Lancette preſque horizontalement, afin d'éviter de piquer ces Parties.

7°. En général, il faut toujours ouvrir la Veine où elle paroît le mieux au-deſſous des cicatrices des Saignées précédentes. Car ſi l'on ouvroit les cicatrices mêmes, le ſang n'en ſortiroit pas ſi bien, à cauſe que ces cicatrices rétréciſſent le diamétre du vaiſſeau. C'eſt pourquoi un Chirurgien qui veut ménager un bras qu'il aura ſouvent occaſion de ſaigner, commence par piquer la Veine le plus haut qu'il peut; puis en allant toujours en deſcendant, il place ſes ouvertures proche les unes des autres, pour ſe conſerver un terrein qu'il retouvera en tems & lieu.

8°. C'eſt une mauvaiſe méthode, de mouiller la compreſſe, parce qu'en ſe ſéchant elle durcit & peut meurtrir le bras. Si l'on prévoit que l'on ſera obli-

gé de répéter la Saignée dans la journée, on met sur la compresse quelques gouttes de suif ou d'huile, pour empêcher la plaïe de se fermer si-tôt, & qu'on puisse retirer du sang par la même ouverture. Mais quand le Malade ne craint pas la piqûre de la Lancette, il est bien plus à propos d'en faire une nouvelle.

De la Saignée du Pied.

1°. Il faut faire asseoir le Malade dans un fauteuil, ou sur le bord de son lit, avoir une compresse & une bande roulée, & un peu plus longue que pour la Saignée du bras.

2°. On a un chaudron, ou un sceau de faïance plein d'eau d'une chaleur supportable, dans laquelle on met les pieds, pour faire raréfier le sang, & gonfler les vaisseaux. Quoiqu'on ne saigne qu'un pied il est cependant nécessaire de les faire mettre tous les deux dans l'eau, tant pour la commodité du Malade, que pour déterminer une plus grande quantité de sang vers les extrémités inférieures, & pour que le Chirurgien puisse, sans perdre de tems, choisir le pied où les vaisseaux seront les plus aparens.

3°. Quand les pieds ont resté dans l'eau assez de tems pour donner aux vaisseaux celui de se gonfler, le Chirurgien prend le pied qu'il veut saigner, le porte sur son genou; il l'essuie avec la nape ou la serviette qu'il a sur lui; il pose la ligature deux travers de doigt au dessus

des Malléoles, & ne la ſerre que médiocrement ; il la noue d'un nœud coulant vers la Malléole externe ; puis ayant examiné avec ſon doigt ſi les Veines répondent, il remet le pied dans l'eau pendant qu'il tire ſon étui, & choiſit une Lancette.

La ligature la plus convenable pour la Saignée du pied, eſt une ligature de tiſſu de fil ou de ſoie : une de drap ſe lâche quand elle eſt mouillée, & elle rompt aiſément, quand on eſt obligé de beaucoup ſerrer ; ce que le tiſſu ne fait pas.

4°. Lorſque le Chirurgien a choiſi ſa Lancette, il l'ouvre, & la porte à la bouche, la pointe tournée du côté du pied qu'il doit piquer ; il tire le pied de l'eau, & en aplique la plante ſur ſon genou, afin de comprimer les Veines intérieures ; il reſſerre la ligature pour mieux aſſujettir la peau & les veines ; il eſſuie le pied, & après avoir aſſujetti le vaiſſeau avec le pouce de l'autre main : il en fait l'ouverture au deſſus ou au deſſous de la Malléole, ſans trop enfoncer, afin de ne pas piquer le Périoſte, qui n'en eſt pas éloigné. On ne craint point ici de piquer l'Artére, ni le Tendon, à moins qu'on ne ſaignât quelqu'une des Veines qui rampent ſur le col du pied.

5°. Dès que la Veine eſt ouverte, on remet le pied dans l'eau ; & ſi la ligature eſt trop ſerrée, on la lâche tant ſoit peu. Comme on ne ſe ſert pas de

palettes pour cette Saignée, on eſtime la quantité du ſang tiré par la maniere dont le ſang coule plus ou moins vite, par une grande ou une petite ouverture, par le tems que la Saignée dure, par la couleur de l'eau plus ou moins rouge, eu égard au volume, ou en trempant le coin d'une ſerviette dans l'eau, d'où elle ſort plus ou moins teinte.

Quand on a tiré la quantité de ſang qu'on s'étoit propoſé, on défait la ligature ſans tirer le pied hors de l'eau, où on le laiſſe encore un inſtant, pour donner le tems au vaiſſeau de ſe dégorger. Enſuite on retire le pied de l'eau, on le porte ſur ſon genou, on l'eſſuie, on tire un peu la peau avec le doigt indice & celui du milieu, comme dans la Saignée du bras, pour recouvrir l'ouverture de la Veine, on met une compreſſe un peu épaiſſe ſur l'ouverture, & on fait le bandage apelé l'*Etrier*. On eſſuye auſſi l'autre pied, & on remet le Malade au lit.

REMARQUES.

Il arrive quelquefois à la Saignée du pied, quoiqu'elle ſoit bien faite, que le ſang s'arrête tout-à-coup, après avoir coulé pendant quelque-tems. Il peut y en avoir deux cauſes.

La premiere, c'eſt un ſang trop gluant & trop épais, qui s'aplique ſur l'ouverture, & en colle les lévres. Cet accident eſt plus ordinaire aux perſonnes gra-

ſes. Pour l'éviter, le Chirurgien doit donner ſes ſoins à ce que le ſang ſorte en arcade, & toujours à la ſurface de l'eau. Pour cela il placera ſa main ou une ſerviette ſous la plante du pied ; afin de le ſoulever, & qu'en comprimant les Veines intérieures, le ſang refoule dans les extérieures.

Une ſeconde cauſe de l'arrêt du ſang, c'eſt lorſque le vaiſſeau eſt fort petit, & que le pied eſt trop enfoncé dans l'eau. La colomne d'eau qui péſe ſur l'ouverture, empêche le ſang de ſortir ; & le fait grumeler. On y remédie en paſſant un linge ſur l'ouverture, pour en détacher les grumeaux, & en ſoutenant le pied à fleur d'eau.

De la Saignée de la Gorge.

1°. On fait aſſoir le Malade ſur le bord de ſon lit, ou dans un fauteuil.

2°. On garnit l'épaule & la poitrine d'une ſerviette de pluſieurs doubles, & on aplique la ligature de la maniére ſuivante. On met ſur les Clavicules & ſur la Veine que l'on a deſſein de piquer, une compreſſe épaiſſe. On fait deux tours autour du col, avec une ligature ordinaire, mais plus étroite, de maniére qu'elle porte ſur la compreſſe : on la ſerre legérement, & on la noue vers la nuque du col à deux nœuds, l'un ſimple, & l'autre en roſette ; on y paſſe un ruban ou une bandelette, dont les deux bouts tombent par-devant &

vis-à-vis la Trachée-Artére. Un ſerviteur tire les deux bouts du ruban, afin que la ligature circulaire ne comprime pas la Trachée-Artére, & qu'elle ne faſſe effort que ſur les Veines jugulaires externes, & principalement ſur celle ou eſt la compreſſe.

Ou bien, on met vers les Clavicules & ſur les Veines jugulaires une compreſſe épaiſſe ; on aplique ſur la nuque du col une ligature ordinaire, dont on fait paſſer les chefs en devant, de maniére qu'ils portent ſur les compreſſes ; on noue ces chefs vers le Sternum, & un Serviteur, ou même le Malade, tire le neud en en bas, afin que la ligature faſſe effort ſur les compreſſes, & gonfle les Veines jugulaires.

3°. Cela fait, on tire une Lancette, & on la porte à la bouche ; on aplique le pouce ſur la compreſſe, & le doigt indice au deſſus, afin d'aſſujettir le vaiſſeau, & de tendre la peau ; on ouvre la Veine entre les deux doigts. L'ouverture doit être longitudinale, à cauſe de la direction des fibres du muſcle Peaucier, & un peu plus grande qu'aux Saignées du bras, parce que les Jugulaires ſont plus groſſes.

4°. Pour faciliter la ſortie du ſang, on fait mâcher au Malade un morceau de papier, ou un bâton de Régliſſe, & s'il coule le long de la peau, on ſe ſert d'une carte pliée en goutiére, qui s'aplique au deſſous de l'ouverture par un bout, & par l'autre conduit le ſang dans la palette.

5°. Pour fermer le vaiſſeau, on ôte la ligature, on met une compreſſe ſur l'ouverture, & par-deſſus un bandage circulaire médiocrement ſerré. Souvent même il ſuffit de mettre ſur la plaie une mouche de taffetas gommé, ou un petit Emplâtre agglutinatif; parce que le ſang tombant à plomb, trouve moins de reſiſtance à ſuivre la direction de la Veine, lorſque la ligature eſt ôtée, qu'à ſortir par l'ouverture.

REMARQUES.

1°. Il y a des Auteurs qui propoſent de faire la ligature avec une cravate, ou un mouchoir roulé en boudin, dont ils apliquent le milieu à la nuque du col, & font paſſer en devant les deux chefs, qu'ils croiſent au haut du Sternum. Ils donnent ces deux chefs à tenir à un Serviteur, qui ſerre autant qu'il eſt néceſſaire pour faire gonfler les Veines, ſans gêner la reſpiration.

2°. D'autres ſe ſervent d'une ligature auſſi roulée en boudin, dont ils apliquent le milieu ſur le côté du col où ils ont deſſein de ſaigner; & ils font revenir les deux chefs ſous l'aiſſelle opoſée.

Cette derniere maniere de faire la ligature eſt préférable à la précédente. C'eſt même celle que l'on doit employer, lorſque les vaiſſeaux de la gorge ſont conſidérablement gonflés, parce que la compreſſion

preſſion ne ſe faiſant que d'un ſeul côté, le retour du ſang n'eſt pas gêné dans la Jugulaire oposée, & on a moins à craindre la ſuffocation.

3°. Lorſque les Jugulaires ſont tellement enfoncées, qu'on ne peut les rendre bien aparentes, on ſaigne deux de leurs rameaux qui ſont ſitués plus antérieurement, s'ils ſe trouvent aſſez conſidérables pour remplir les mêmes vues.

Accidens de la Saignée.

Il ne ſuffit pas à un Chirurgien d'avoir une parfaite connoiſſance de tout ce qui regarde l'opération de la Saignée, il doit encore être inſtruit des accidens qui peuvent ſurvenir, ſoit pour les éviter, ſoit pour y remedier.

Ces accidens ne ſont pas tous de la même conſéquence. Il y en a de legers, de médiocres, & d'autres plus dangereux. les uns arrivent par la faute du Chirurgien, les autres par la faute du Malade. La Saignée blanche & la Syncope ſont des accidens d'une legere conſéquence. Les Dépôts, le Thrombus, l'Ecchymoſe, la Tumeur lymphatique, la Douleur & l'Engourdiſſement de la Partie ſont plus conſidérables. La Piqûre du Tendon, de l'Aponévroſe, du Périoſte & de l'Artére, ſont des accidens très-graves & très-fâcheux.

De la Saignée blanche.

On dit qu'un Chirurgien a fait une

Saignée blanche, lorsqu'il a piqué sans avoir de sang ; ce qui arrive, ou parce que le vaisseau étant trop enfoncé, on ne plonge pas la Lancette assez avant ou assez à plomb ; ou parce que le vaisseau étant roulant, il fuit, pour ainsi dire, la Lancette ; ou parce qu'on pique au milieu de beaucoup de cicatrices qui rétrecissent le diamétre du vaisseau ; ou parce que le Malade retire son bras.

Cet accident effraye ordinairement beaucoup le Malade, & sur-tout les Femmes ; mais il ne doit pas déconcerter un Chirurgien, qui doit lui representer qu'il y a souvent de la prudence à manquer une Saignée, & qu'il aime mieux la manquer, que de courir risque de le blesser. Il doit en même-tems éxaminer laquelle de ces causes lui a fait manquer la Saignée, pour l'éviter en piquant une seconde fois.

De la Syncope.

Il y a plusieurs moyens de faire revenir le Malade, s'il tombe en foiblesse pendant qu'on le saigne. On le fait coucher sur le dos, & on lui fait respirer quelque Eau spiritueuse, ou du vinaigre bien fort ; ou on lui fait avaler un peu d'eau fraîche, & on lui en jette avec la main sur le visage, & il ne tarde pas à revenir. Ordinairement le sang s'arrête de lui-même, ou bien on l'arrête, en mettant le doigt sur l'ouverture.

Des Dépôts.

Un effort que le Malade aura fait avec ſon bras, la piqûre de quelques fibres Aponévrotiques, la mauvaiſe qualité des humeurs, une Lancette malpropre ou rouillée, peuvent occaſionner à l'endroit de l'ouverture, ou aux environs, un dépôt phlegmoneux ou éréſipélateux. Si la tumeur eſt fort enflammée, on y aplique un Cataplaſme anodin (*a*) : ſi elle menace de tourner en ſupuration, ou ſi elle eſt abſcédée, on y met un Emplâtre d'Onguent de la Mere (*b*), & on la traite comme les autres abſcès.

Du Thrombus.

Le Thrombus eſt une tumeur formée par un ſang épanché & grumelé aux environs de l'ouverture de la Veine. Si l'on a piqué le vaiſſeau de part en part, ou que l'ouverture de la peau ne ſe rencontre pas avec celle de la Veine, ou qu'il ſe preſente un petit morceau de graiſſe à l'ouverture, une petite portion du ſang qui ne peut ſortir librement, ſe gliſſe dans les cellules du corps graiſſeux, & fait élever la tumeur dont il s'agit.

Si le Thrombus ſe forme immédiate-

(*a*) *Voyez le Chapitre des Cataplaſmes*, pag 244.

(*b*) *Voyez le Chapitre des Onguens*, pag. 281.

ment après avoir retiré la Lancette, on empêche qu'il n'augmente, en ne levant que peu à-peu le pouce qu'on avoit mis sur le vaisseau pour l'assujettir, sans desserrer la ligature. Si la tumeur augmente malgré ces précautions, & qu'on ne puisse pas tirer la quantité de sang dont on a besoin, on pique la même Veine au-dessous du Thrombus, ou l'on en pique une autre.

Cet accident au reste n'est pas considérable. On procure la résolution du sang épanché, en apliquant dessus une compresse trempée dans quelque Eau spiritueuse, ou dans de l'eau commune, que l'on rend plus résolutive, en mettant quelques grains de sel dans la duplicature.

Si la tumeur venoit à abscéder, on y mettroit un petit Emplâtre d'Onguent de la Mere (*a*), ou un peu de Cérat de Galien, avec un Cataplasme anodin (*b*) par-dessus, & on étuveroit les environs avec quelque Eau spiritueuse.

De l'Ecchymose.

L'Ecchymose est une tumeur superficielle, molle, rouge, livide ou jaunâtre, produite par une infiltration du sang dans les vaisseaux lymphatiques de la peau ou de la graisse, ou par une

(*a*) *Voyez le Chapitre des Onguens*, pag. 297.
(*b*) *Voyez le Chapitre des Cataplasmes*, pag. 244.

extravaſion ſanguinolente dans ces tégumens. Elle eſt d'abord rouge ou livide, enſuite elle devient jaunâtre & ſe diſſipe.

Ce ſont principalement les perſonnes graſſes, & qui ont la peau fine & délicate, qui ſont ſujettes aux Ecchymoſes à la ſuite d'une Saignée, ſoit qu'on ait fait de trop fortes frictions, ou qu'on ait tenu la ligature trop long-tems ſerrée, ou qu'il ſe ſoit fait quelque pli à la bande ou à la compreſſe, ou que le Malade ait étendu ſon bras avant la réunion de la plaie, ou que le Chirurgien ait piqué la Veine d'outre en outre, ou enfin que ce ſoit la ſuite d'un Thrombus.

On remedie à cet accident, qui n'eſt pas ordinairement de grande conſéquence, en frottant la Partie avec quelque Eau ſpiritueuſe, telle que l'Eau-de-Vie, celle de Lavande, l'Eau vulnéraire, celle de la Reine d'Hongrie, &c. & en apliquant deſſus une compreſſe trempée dans ces mêmes Eaux.

de la Tumeur Lymphatique.

La Tumeur lymphatique eſt une tumeur luiſante & indolente, produite par un épanchement de lymphe, & qui ne change pas la couleur de la peau. Elle arrive, lorſqu'en piquant la Veine, on a ouvert en même-tems un ou pluſieurs vaiſſeaux lymphatiques, qui en ſe cicatriſant, forment cette tumeur.

Mais il arrive quelquefois que le vaisseau lymphatique ne se cicatrise qu'imparfaitement ; & alors au lieu d'une tumeur, il reste une petite fistule imperceptible, par où il suinte un peu de lymphe qui mouille la chemise.

La Tumeur lymphatique n'est point un accident fâcheux. Il suffit assez ordinairement d'apliquer dessus une compresse trempée dans quelque Eau spiritueuse, & de la comprimer un peu avec la bande. Si elle résiste à ce Remede, on y fait une petite ouverture, pour évacuer la lymphe épanchée, & on fait ensuite sur l'endroit ouvert une legére compression.

Si l'ouverture du vaisseau lymphatique étoit restée fistuleuse, ce que l'on reconnoît à la manche de la chemise, qui en est mouillée, on fait dessus une compression qui arrête l'écoulement de la lymphe, & procure la réunion des lévres de la plaie. Mais si ce moyen ne réussit pas, il faut avec la Pierre infernale cautériser & emporter les callosités de la plaie, & la réduire à une plaie simple : après quoi on y met un petit Emplâtre de Céruse ; ce qui suffit avec la compression.

De la Douleur & de l'Engourdissement.

Il y a un petit Cordon de Nerf apellé *Cutané intérieur*, qui accompagne la veine Basilique. Un autre apelé *Musculo cutané*, passe derriere la Médiane. La Saphene est accompagnée d'un rameau de Nerf Crural.

On peut en ouvrant ces veines, piquer ou couper un de ces petits Cordons de Nerfs. Quand on le pique ſeulement, le Malade reſſent une douleur vive, qui s'étend tout le long de la Partie à laquelle le Nerf ſe diſtribue, & qui dure quelquefois aſſez long-tems, quoiqu'avec moins de violence. Quand le Nerf eſt coupé en entier, la douleur eſt vive dans l'inſtant, & ſuivie de l'engourdiſſement de la Partie,

C'eſt un accident qu'il n'eſt pas aiſé de prévoir, & que l'on éviteroit, ſi l'on pouvoit toujours ouvrir les veines longitudinalement, mais il n'eſt pas toujours poſſible de le faire.

Pour apaiſer la douleur, on frotte la Partie avec un mêlange d'Huile d'Amandes douces, d'Huile de Vers, & d'eau-de-vie. On remédie à l'engourdiſſement avec le Baume de Fioraventi & l'Huile de Vers, que l'on mêle enſemble, & dont on frotte la Partie, après avoir fait chauffer le mêlange.

De la piqûre du Tendon.

Il peut arriver en ſaignant la Médiane, que l'on pique le Tendon du Muſcle *biceps*, qui eſt ſitué deſſous, ſoit parce qu'on aura trop enfoncé la Lancette, ou que le Malade aura remué le bras. Cet accident eſt des plus fâcheux pour le Malade, & des plus mortifians pour le Chirurgien.

On connoît qu'on a bleſſé le Tendon par la réſiſtance que l'on ſent à la pointe de

la Lancette, & par la douleur vive que le Malade reſſent au moment de la piqûre, qui s'étend tout le long du bras depuis l'Acromion juſqu'au bout des doigts.

Lorſque la piqûre a été legére, cette douleur paſſe quelquefois ; mais ſi elle continue, elle eſt bientôt ſuivie de Gonflement, de Tenſion, d'Inflammation de toute la Partie, de Fiévre, de mouvemens convulſifs, de Dépôts, de Gangréne : en un mot, de tous les accidens des plaies des Parties tendineuſes.

Si-tôt qu'on aperçoit qu'on a eu le malheur de piquer le Tendon, rien n'eſt plus preſſé que de faire de fréquentes Saignées à l'autre bras, afin d'empêcher le progrès du mal. On preſcrit au Malade une diéte exacte, délayante & rafraîchiſſante. On couvre toute la Partie d'un Cataplaſme émollient ou anodin (*a*), pour calmer la douleur & les autres accidens. Si ces moyens ne ſuffiſent pas, on dilate la plaie, & l'on découvre le Tendon piqué, ſur lequel on aplique un plumaceau trempé dans de l'Huile jaune ou rouge de Térébenthine, diſtillée pluſieurs fois au bain de cendre avec de l'eau commune, pour en enlever les parties acrimonieuſes. C'eſt un Remede excellent pour les plaies des Tendons. Au défaut de cette Huile on emploie l'Eſprit de Térébenthine, ou la Térébenthine même, la Colophane, les Baumes de Copahu ou du Pérou mêlés avec l'Huile d'œuf, & par-

(*a*) *Voyez le Chapitre des Cataplaſmes*, p. 244.

deſſus le tout des Cataplaſmes émolliens & anodins.

Si malgré tous ces Remedes la mortification ſurvenoit, il n'y auroit point d'autre reſſource pour ſauver le bras, que de couper tout-à-fait le Tendon.

De la piqûre de l'Aponévroſe.

Il eſt plus ordinaire de piquer l'Aponévroſe du Muſcle *biceps*, que ſon Tendon. Le Chirurgien s'en aperçoit par la réſiſtance qu'il ſent à la pointe de la Lancette, qui en eſt quelquefois émouſſée, & par la douleur que le Malade reſſent au moment de la Saignée. Cet accident eſt ordinairement ſuivi d'une douleur vive au bras & à l'avant-bras, de gonflement, de tenſion, d'inflammation, & quelquefois d'un abſcès ſous l'Aponévroſe.

Le traitement eſt à peu près le même que pour la piqûre du Tendon; c'eſt-à-dire, qu'on emploie des Saignées réïtérées, une diete ſévére, délayante & rafraîchiſſante, les Cataplaſmes émolliens anodins (*a*). Lorſque la douleur vive eſt paſſée, on a recours aux Réſolutifs; mais ſi le dépôt, au lieu de ſe réſoudre, tourne à ſupuration, il faut en faire l'ouverture, & débrider l'Aponévroſe; ſi elle eſt tendue.

(*a*) *Voyez le Chapitre des Cataplaſmes*, pag. 244.

De la piqûre du Périoſte.

C'eſt principalement en ouvrant la Saphene ſur la Malléole interne, que l'on court riſque de piquer le Périoſte, ſi le Malade remue ſon pied, ou ſi l'on plonge la Lancette trop avant. On a auſſi le même danger à craindre, lorſqu'on ouvre la Cubitale, ou la Radiale vers le poignet, ou l'Artére & la veine temporales.

On connoît que l'on a piqué le Périoſte, par la réſiſtance que l'on ſent à la pointe de la Lancette, qui s'en trouve émouſſée, par la douleur, la tenſion & l'inflammation, qui s'étendent le long de l'os dont le Périoſte eſt piqué, & qui en ſont ordinairement les ſuites.

Si ces accidens ſont legers, on y remédie par quelques compreſſes trempées dans une cinquieme partie d'Eau-de-vie, & quatres parties d'eau. Lorſque l'inflammation eſt diſſipée, on met un Emplâtre d'Onguent de la Mere ſur l'ouverture (*a*), pour en faire ſupurer les bords.

Si les accidens ſont conſidérables, on aplique ſur la Partie un Cataplaſme anodin (*b*), & un peu de Supuratif ſur la plaie (*c*), afin de l'entretenir ouverte, & d'exciter un petit ſuintement & une legere ſupuration. Quand la douleur & l'inflammation ſont diſſipées, on met ſur

(*a*) *Voyez le Chapitre des Onguens*, pag. 281.
(*b*) *Voyez le Chapitre des Cataplaſmes*, p. 244.
(*c*) *Voyez le Chapitre des Onguens*, pag. 281.

la plaie un Emplâtre d'Onguent de la Mere, & on la deſſéche enſuite avec l'Onguent de Céruſe ou de Pompholyx.

Si ces accidens perſiſtoient, & que le Périoſte demeurant fort tendu & enflammé, menaçât de tomber en mortification, il faudroit néceſſairement le débrider par quelques inciſions, & panſer enſuite la plaie méthodiquement.

de la piqûre de l'Artére.

Quelque précaution que l'on prenne pour ne pas piquer l'Artére en ouvrant la veine Baſilique, on a cependant vû de très-habiles Chirurgiens avoir le malheur de la bleſſer. C'eſt un accident des plus graves; & l'on ne ſçauroit trop recommander à tous ceux qui ſe mêlent de ſaigner, de bien reconnoître auparavant par la pulſation la ſituation de l'Artére, afin d'ouvrir la veine dans les endroits ou l'Artére n'eſt pas trop proche, ou de n'introduire la Lancette qu'avec bien de la circonſpection.

En piquant l'Artére, il peut arriver qu'on n'ait fait que l'effleurer, & qu'on n'ait diviſé que quelqu'une de ſes tuniques, ou bien qu'on les ait percées toutes; ce qui fait deux cas très-différens.

1o. Lorſque l'Artére n'eſt qu'effleurée, le ſang qui trouve en cet endroit moins de réſiſtance, dilate & étend peu-à-peu les tuniques qui reſtent entiéres, & il ſe forme un Anévryſme vrai, dont on ne s'aperçoit pas dans le moment de la Sai-

gnée, mais seulement quelque-tems après.

Cette tumeur est fort petite au commencement; elle ne change pas la couleur de la peau. On y sent un mouvement de pulsation semblable à celui de l'Artére : elle disparoit par la compression, & en appuyant le pouce sur l'Artére brachiale; mais dès que la compression cesse, elle revient, & quelquefois même avec un petit bruit.

On peut guérir cette espece d'Anévrysme, en faisant une compression exacte & continuelle sur la tumeur, après avoir fait rentrer le sang qui la formoit.

2°. Lorsqu'on a eu le malheur d'ouvrir toutes les tuniques de l'Artére avec la pointe de la Lancette, on s'en aperçoit à l'instant. Le sang artériel sort avec impétuosité, en arcade & par bonds, suivant le mouvement de pulsation. Il est d'une couleur beaucoup plus rouge & plus vermeille que le sang des Veines; il se caille très-vîte : une compression faite sur l'Artére brachiale en arrête le cours; au lieu que celle que l'on fait à l'Avant-bras ne l'empêche pas de couler.

Un Chirurgien dans ces circonstances ne doit pas perdre la tête. Dès qu'on reconnoit que le sang vient de l'Artére, il faut le laisser couler jusqu'à ce que le Malade tombe en syncope, & qu'il s'arrête de lui même. Cependant si c'étoit à une Femme grosse que cet accident fût arrivé, ou à quelqu'un qui tombât difficilement en foiblesse, il ne seroit pas

prudent de l'attendre. Dans ce cas, lorſque le Malade a perdu une certaine portion de ſang, on prend le parti de l'arrêter.

Il y a encore une autre cas où il ne faut pas attendre que le Malade tombe en foibleſſe pour arrêter le ſang; c'eſt lorſqu'il ſe fait un épanchement aux environs de l'Artére, comme quand l'ouverture des tégumens n'eſt pas vis-à-vis de celle de l'Artére: il ſe forme alors un Anévryſme faux ou par épanchement, & il ne reſte point d'autre parti à prendre, que celui de ſerrer fortement la ligature, ou de faire une eſpece de tourniquet, pour arrêter l'écoulement du ſang. Lorſqu'il ne coule plus, on met ſur l'ouverture un petit morceau de papier mâché & exprimé; de la groſſeur d'une noiſette, ou d'un bouton. On aplique enſuite une petite compreſſe de la largeur d'un ongle, & ſur celle-ci pluſieurs autres graduées, autant qu'il en eſt beſoin pour ſurpaſſer le niveau du bras, & faire une compreſſion plus exacte. On fait le bandage ordinaire de la Saignée; mais avec une bande plus longue. On deſſerre peu-à-peu la ligature ou le tourniquet, & on met ſur le trajet des vaiſſeaux une compreſſe longitudinale épaiſſe, que l'on ſoutient avec une bande, dont on ſerre plus les tours qui ſont proches de l'ouverture, que ceux qui en ſont plus éloignés. Par ce moyen on rallentit le mouvement du ſang, & on empêche qu'il n'aille heurter trop fortement ſur l'ouverture: on met le bras en écharpe, on recommande au Malade de ne point

le remuer ; on le saigne de l'autre bras, & on lui fait observer un régime éxact.

Il faut avoir atttention que les compresses graduées fassent sur l'ouverture la conpression la plus éxacte qu'il est possible, & que la bande soit suffisamment serrée sans excès, de crainte d'attirer la mortification. Cet apareil doit être continué long-tems, afin de donner lieu à l'Artére de se réunir. Pour que la compression soit plus éxacte, on fait fléchir l'Avant-bras, afin de relâcher l'Aponévrose du Muscle *biceps*, qui recouvre l'Artére. Il faut aussi que les compresses graduées soient plus élevées que le niveau du bras, afin que la compression se fasse uniquement sur l'ouverture, & non sur les parties latérales.

Si malgré l'attention qu'on a eue de faire une bonne compression, on remarque que le sang s'extravase & s'infiltre dans les cellules graisseuses, le seul parti qui reste à prendre, est de faire l'opération qu'on apelle de l'Anévrysme, pour laquelle je renvoie au Cours d'opérations.

De l'Artériotomie.

L'Artériotomie est l'ouverture des Artéres, comme la Phlébotomie est l'ouvertures des Veines.

C'est ordinairement à l'Artére temporale qu'on fait cette Saignée, parce que cette Artére portant sur l'os, on a un point d'apui suffisant pour consolider la plaie.

Pour l'éxécuter, 1°. On fait asseoir le Malade dans un fauteuil, ou sur le bord de son lit.

2°. On met une ligature un peu au-deſſus de l'endroit qu'on veut ouvrir, afin d'aſſujettir le vaiſſeau, & de le faire gonfler; ce que l'on obtient encore mieux, en mettant une compreſſe ſous la ligature, comme quelques-uns le font pour la Saignée du col. La ligature doit être étroite, & miſe de biais, afin qu'elle ait plus de priſe. M. Dionis propoſe de faire cette Saignée ſans ligature. Quand l'Artére eſt pleine & bien aparente, on peut abſolument s'en paſſer, & ſe contenter de faire pancher la tête, pour que le ſang s'y porte en plus grande quantité; mais quand l'Artére n'eſt pas fort aparente, il eſt plus ſûr de faire la ligature.

3°. On prend une Lancette ordinaire que l'on porte à la bouche à demi-pliée; & après avoir reconnu l'Artére que l'on veut ouvrir, on marque l'endroit avec l'ongle: on aſſujettit le vaiſſeau, on tend la peau avec le doigt indice & le pouce, & on fait la ponction & l'élévation comme aux autres Saignées. Le ſang jaillit auſſi-tôt, & ſort en arcade & par ſauts.

4°. Quand on a tiré une ſuffiſante quantité de ſang, on ôte la ligature, & on arrête le ſang. Pour cela on fait une petite pelote de papier brouillard mâché & bien exprimé, de la groſſeur d'une noiſette; ce qui vaut infiniment mieux qu'une piéce de monnoie, que quelques-uns conſeillent de mettre dans le pli de la compreſſe. Par-deſſus cette pelote on met quelques compreſſes graduées, afin que la compreſſion du bandage ne porte que ſur l'ouver-

ture. On fait le bandange nommé *Solaire*, ou *Chevrêtre oblique*. On laiſſe cet apareil quatre ou cinq jours, afin de donner à la plaie le tems de ſe refermer & de ſe conſolider entierement.

Cette opération eſt rarement pratiquée ailleurs qu'à l'Artére temporale, parce qu'elle a des inconvéniens qui lui ſont propres, & qu'elle peut avoir de fâcheuſes ſuites.

Comme les Artéres ont un mouvement continuel de contraction & de dilatation, il eſt très-difficile de réunir les lévres de la plaie. Le ſang qui s'y porte avec impétuoſité, peut ſurmonter peu-à-peu l'effort de la bande, & former un Anévriſme faux, en s'épanchant dans les parties voiſines. La cicatrice ne pouvant être d'ailleurs que très-foible, il eſt à craindre qu'elle ne céde aux efforts continuels du ſang, & qu'en ſe dilatant inſenſiblement, elle ne forme un Anévryſme vrai. Ce ſont-là de juſtes raiſons pour rendre cette opération rare. Cependant, comme il eſt des cas où elle eſt la derniere reſſource des Malades déſeſpérés, & qu'il y a des exemples qu'elle a produit de bons effets, il ne convient pas à un Chirurgien d'ignorer la maniere de la pratiquer.

Fin du Traité de la Saignée.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Des Maladies pour lesquelles on trouve des Remedes dans ce Manuel.

A

Abscès, pag. 47. 50. 245. 277. 279. 280. 281. 296.
des Mammelles, 296.
du Foie, 363.
Accouchement laborieux, ou *difficile*, 30. 108. 125. 156.
Acrimonie, ou *âcreté des humeurs*, 21. 22. 37. 38. 39. 41. 45. 46. 58. 62. 65. 66. 67. 164. 265.
Affections hypocondriaques, 70.
ou *Maladies soporeuses*, 93. 94. 292.
des Nerfs, 57. 208.
Rhumatisantes. Voyez *Rhumatisme*.
Agitation. Voyez *Anxiété*.
Aigreurs d'Estomac, 77. 165. 166.
Amaigrissement, 21. 27. 50. 58. 323.
Amertume & mauvais goût dans la Bouche, 126.
Anasarque. Voyez *Leucophlegmatie*.
Angine. Voyez *Esquinancie*.
Ankylose, 278. 279. 283.
Anxiété, 4. 13. 65. 114. 134. 148. 168. 228.
Aphthes, 37. 269. 312. 322.
Apoplexie, 33. 34. 51. 53. 94. 112. 133. 134.

135. 150. 169. 173. 174. 292.
Sanguine, 51. 52. 53. 94. 152. 169. 174.
Ses symptômes, 51.
Séreuse, 51. 52. 94. 126. 133. 152. 196. 208. 209. *Ses symptômes*, 52.
Apétit perdu, ou *perte d'apétit*, 23. 26. 77. 82. 126. 223.
Ardeur d'Estomac, 307.
Ardeur d'Urine, ou *Dysurie*, 39. 63. 87. 129. 211. 212. 293.
Ascarides, ou *petits Vers qui s'attachent au Fondement*, 101.
Assoupissement, 112. 126. 150.
Asthme. Sa définition & ses symptômes, 121.
Humide, ou *humoral*, ou *glaireux*, 60. 71. 79. 121. 122. 123. 133. 158. 172. 192. 205. 206. 223. 224. 232. 327.
Sec, ou *Convulsif*, 39. 122. 157.
Atonie, ou *Foiblesse*. Voyez *Relâchement des Fibres*.
Atrophie. Voyez *Rachitis*.
Avortement, ou *fausse-Couche*, 154. 155. 213. 214. 250. 251.

B

Bile épanchée. Voyez *Jaunisse*.
exaltée, 37.
noire & résineuse, 37. 72.
Blessures. Voyez *Plaies*.
Bouffissure, ou *Menace d'Hydropisie*, 7. 14. 15. 16. 21. 24. 47. 71. 72. 79. 82. 85. 131. 137. 153. 156. 185. 196. 202. 223. 240. 327.
Universelle. Voyez *Leucophlegmatie*.
Bouillonnement des Humeurs, 36 38. 64. 67.

88. 152. 165. 166.
Bourdonnemennt, Bruiſſement, ou *Tintement d'Oreilles*, 126. 219.
Brûlure, 276. 277. 287. 288. 294. 296. 223.

C

Cachéxie, 70. 77. 87. 115. 131. 137. 185. 196. 197. 329.
Calcul. Voyez *Pierre*.
Cancer, 50. 149. 296.
Cardialgie, 330.
Carie, 57. 289. 290.
Carreau, 308.
Caterre, 39.
Caterre, ou Fluxions Caterrales ſur les Poumons, 291.
ſuffoquant, 150. 158.
Chaleur, ou *Ardeur interne*, 8. 19. 36. 37. 50. 62. 63. 68. 69. 75. 76. 77. 87. 88. 93. 129. 156. 236.
Chancre de la Bouche. Voyez *Aphthes*.
Chartre des Enfans. Voyez *Rachitis*.
Chaſie, 264. 266.
Chûte, 47. 48. 109. 110. 115. 135. 257.
du Fondement, 253.
Cloux, 279. 296.
Colique, 20. 29. 55. 71. 88. 96. 99. 100. 126. 128. 149. 153. 206. 236. 289. 298. 323. 329. 338.
Néphrétique, 40. 41. 42. 60. 86. 87. 96. 106. 149. 212. 213. 223. 249.
Ses ſymptômes, 40.
Venteuſe. 97. 98. 113.
de Miſerere, 323.

Congestions 279. 295.
Consomption. Voyez *Marasme.*
Constipation, 41. 50. 101. 126. 330. 334.
Contusion, 110. 111. 243. 256. 281. 282. 317. 390.
Convulsion, 55. 56. 112. 113. 134. 135. 136. 167. 228. 298.
des Enfans, 116. 171. 172.
Coqueluche, 32.
Cours de Ventre, 20. 36. 37. 48. 49. 63. 109. 120. 127. 143. 149. 166. 309.
Crachement de Sang, 4. 21. 23. 37. 44. 45. 46. 73. 74. 103. 104. 129. 134. 138. 155. 163. 164. 187. 196. 202. 213. 214. 226. 231. 251. *Ses symptômes*, 45.
de Pus, ou *Crachats purulens.* Voyez *Phthisie.*
Crudités. Voyez *Mauvais Levains de l'Estomac.*

D

Dartres, 43. 49. 73. 177. 178. 193. 273. 289. 290. 320.
Débilité de Nerfs, 237. 255.
Défaillance, 40. 55. 56. 103. 112. 113. 120. 128. 135. 150. 156.
Défaut d'apétit. Voyez *Apetit perdu.*
de Régles, 178. 231.
Dégoût, 6. 27. 85. 125. 153.
Déjections crues, 16. 153.
purulentes, 153.
Délire, 55. 135.
Démangeaisons, 54. 55. 73. 273. 274. 287.
Dépôt, 209. 271. 292. 386.
Dérangement dans les Digestions. Voyez *Indigestion.*
Descentes. Voyez *Hernies.*

Dévoiement. Voyez *Cours de Ventre.*
Diabétes, 306 321.
Diarrhée. Voyez *Cours de Ventre.*
Difficulté de reſpirer, 6. 8. 13. 27. 29. 51. 60. 82. 111. 121. 160. 205.
d'Uriner. Voyez *Ardeur d'Urine.*
Diminution des Lochies ou *Vuidanges*, 28. 31. *Deſcription & ſymptômes de cette Maladie*, 27.
Diſlocation, 281.
Diſſolution du Sang, 9. 64.
Douleurs, 4. 5. 6. 8. 27. 29. 30. 40. 41. 42. 45. 50. 54. 57. 63. 65. 87. 96. 99. 106. 110. 114. 121. 124. 128. 129. 149. 150. 152. 153. 155. 160. 183. 236. 145. 250. 251. 257. 259. 277. 78. 289. 316. 391. ou *Tranchées après l'Accouchement*, 28. 29. 240. 241. 318.
Dyſſenterie, 37. 47. 63. 96. 98. 121. 149. 152. 153. 154. 164. 182. 183. 313. *Sa deſcription & ſes ſymptômes*, 152.

E

Eblouiſſement, 52.
Ecchymoſe. Voyez *Contuſion.*
Ecorchures, 287.
Ecrouelles, 48. 57. 58. 59. 178. 192. 193. 277. 278. 296. *Deſcription de cette Maladie*, 57.
Effervéſcence. Voyez *Bouillonnement du Sang.*
Embarras, ou *Engorgement des Viſcéres.* Voyez *Obſtructions.*
Enflure. Voyez *Bouffiſſure.*
Engelures, 296. 326.
Engourdiſſement, 71. 150. 390.

Enrouement, 39. 233. 315. 321.
Entorſe, 258. 289.
Epaiſſiſſement du Sang, 13. 70. 71. 77. 81. 178. 209. 292.
Epilepſie, 56. 112. 116. 133. 167. *Ses ſymptômes*, 167.
Eréthiſme, 20. 93. 167. 168. 202.
Eruption, *ou Sortie des Dents des Enfans*, 276.
Eréſipele, 54. 238. 239. 245. 255. 273. 276.
Eſquinancie, 160. 161. 163. 173. 247. 248. 271. 272. *Sa deſcription, ſes effets & ſes ſymptômes*, 160.
Eſtomac affoibli & relâché. Voyez *Foibleſſe d'Eſtomac*.
froid & pareſſeux, 87.
glaireux. Voyez *Glaires*.
Etouffement, 56. 111. 160.
Etourdiſſement. Voyez *Vertige*.
Excoriations. Voyez *Ecorchûres*.
Expectoration, ou *Crachement difficile*, 39. 159.
Extrêmités froides, 41. 152. 160. 199.

F

Fievre aigue, 6. 29. 36.
ardente, 2. 36. 62.
bilieuſe, 2.
continue, 4. 6. 14. 16. 18. 41. 135. 160.
intermittantes, 18. 95. 126. 197. 198. 199. 201. 331. *Ses ſymptômes*, 197.
lente ou *hectique*, 16. 21. 25. 27. 36. 45. 50. 58. 196. 202.
maligne, 13. 36. 37. 103. 133. 289. 292. 293.
quarte, 133. 198. 199. 201. 316.
Fiſtules, 47. 265.

Flatuosités. Voyez *Vents.*
Fleurs Blanches, 26. 28. 178. 318. *Description & symptômes de cette Maladie*, 26.
Flux de Sang. Voyez *Dyssenterie.*
de Ventre. Voyez *Cours de Ventre.*
d'Urine. Voyez *Diabetes.*
d'Urines sanglantes. Voyez *Pissement de Sang.*
Hépatique, 315.
Fluxion sur la Gorge. Voyez *Esquinancie.*
sur les Oreilles, 292.
sur les Yeux. Voyez *Ophthalmie.*
de Poitrine. Voyez *Péripneumonie.*
Fœtus mort, 155. 156.
Foiblesse. Voyez *Tempérament foible*,
d'Estomac, 50. 189.
de Vûe, 176. 177. 267. 331.
Folie, 324.
Fonte. Voyez *Dissolution du Sang.*
Foulures de Tendons & de Nerfs, 258. 259.
Fourchés, ou *Abscès aux mains*, 279.
Frissons au Sein, 250.

G

Gale, 43. 49. 73. 177. 178. 188. 189 193. 261. 262. 263. 265. 290. 327.
du Nez des Enfans, 260.
Gangréne, 153. 190. 238. 241. 242. 243. 288. 305. 332.
des Intestins, 313.
Gencives ulcérées, 8. 9.
Glaires de l'Estomac & des Intestins, 33. 71. 72. 77. 87. 196. 222. 232.
des Reins & de la Vessie, 60. 86. 87. 211. 224.

Gonflement d'Eſtomac, 75. 76. 111. 224.
des Articulations, 277.
Goût dépravé, 85.
Goutte, 47. 149. 172. 220. 222. 308. 329.
Sciatique, 48. 172. 220. 256. 272. 273. 317. 319.
Gratelle, 273. 274. 287.
Gravelle, 39. 44. 47. 59. 86. 87. 106. 224. 310. 325.
Grumelliement de Lait dans les Mammelles, 250. 332.

H

Haleine courte, 21.
puante, 8. 7.
Hémophthyſie. Voyez *Crachement de Sang*.
Hémorragie, 2. 24. 44. 45 50. 62. 129. 164. 187. 188. 196. 224. 225. 333.
du Nez. Voyez *Saignement de Nez*.
Uterine, ou *de Matrice*, 23. 24. 26. 135. 155. 183. 184. 187. 224. 225. 226. 251. 310. 320. 322. 328. 334. *Symptômes de cette Maladie*, 23.
qui ſuit une Dent arrachée, 328.
Hémorroïdes, 96. 187, 214. 215. 257. 258. 286. 297. 306. 312. 326.
Hernies, 88. 89. 135.
Humeurs épaiſſes, 44. 81. 176. 238. 265. 271. 279. 294.
bilieuſes, 98. 117. 118.
froides. Voyez *Ecrouelles*.
gluantes ou *viſqueuſes du Poumon*, 32. 60. 172.
âcres, *putrides* ou *corrompues*, 95. 96. 99. 100. 117. 120. 136.

Hydropiſie, 12. 13. 16. 18. 44. 47. 77. 78. 79. 80. 81. 87. 114. 118. 150. 172. 184. 196. 219. 310. 319. 327. 329. *Sa deſcription*, 13.
Aſcite, ou *de Bas-Ventre*, 14. 15. 16. 17. 25. 197. *Ses ſymptômes*, 14.
de Poitrine, 15. 123. 192. *Ses ſymptômes*, 14.
Univerſelle. Voyez *Leucophlegmatie*.

I

Jauniſſe, ou *Ictére*, 43. 70. 77. 308. 324. ou *Pâles-Couleurs*, 84. 86. 115. 133. 138. 170. 215. 230. *Remarques ſur cette Maladie, & ſes ſymptômes* 74. 84.
Impuretés du Sang, 12. 38. 49. 71. 87 292.
Incontinence d'Urine, 306. 324. 329.
Inflammation, 2. 5. 19. 29. 36. 87. 88. 104. 115. 129. 159. 162. 174. 175. 238. 278. 286. 298.
des Yeux. Voyez *Ophthalmie*.
de la bouche, de la Langue, des Amygdales & du Goſier, 160. 270. 312.
de l'Eſtomac, 36. 135.
des Inteſtins, 36. 50. 96. 99. 135. 152. 230.
du Foie, 135.
des Mammelles, 250. 278.
des Reins & de la Veſſie, 40. 62. 211.
des Parties exiternes, 239. 242. 244.
Indigeſtion, 24. 28. 31. 71. 75. 76. 77. 81. 94. 133. 172.
Inſomnie, 4. 63. 65. 111. 121. 148.

L

Lait accumulé, ou *grumelé dans les Mammelles*. Voyez *Grumellement*.
Langue chargée & blanche, 126.
noire, 160.
Langueur. Voyez *Fiévre lente*.
Larmoyement involontaire, 331.
Laſſitude, 8. 82. 198.
Lépre, 322.
Léthargie, 94. 126. 133. 150. 292.
Levains (mauvais *ou* viciés) *de l'Eſtomac*, 12. 18. 27. 36. 64. 103. 130. 134. 198.
Leucophlegmatie, 13. 17. 18. 23. 24. 197.
Ses ſymptômes, 3.
Lienterie, 37.
Lochies ſuprimées. Voyez *Supreſſion des Vuidanges*.
Loupe, 25. 252. 279.
Lymphe âcre & viſqueuſe, 49. 57. 177.

M

Maigreur exceſſive. Voyez *Maraſme*.
des Enfans. Voyez *Rachitis*.
Maladies aiguës, 2. 3. 35. 66. 93. 103. 108. 133. 142. 165. 236.
Maladies chroniques, 12. 103. 149. 208.
Hypocondriaques. Voyez *Mélancolie*.
Maladies cachétiques. Voyez *Cachéxie*.
Spaſmodiques. Voyez *Spaſme*.
Venteuſes. Voyez *Vents*.
du Poumon, 37. 39.
Des Reins & de la Veſſie, 39.

de la Peau, 43. 47. 49. 73. 74. 177. 178. 193. 274. 292.
Manie, 334.
Maraſme, 22. 26. 50. 57. 78. 153. 323.
Matiéres glaireuſes. Voyez *Glaires*.
Maux d'aventure, 280.
de Tête, 48. 71. 84. 127. 289.
Mélancolie, 70. 197. 228.
Météoriſme. Voyez *Gonflement d'Eſtomac*.
Migraine, 172. 175. 325.
Mois immodérés. Voyez *Hémorragie Utérine*.
Morſure des Animaux venimeux, 189.
Mouvemens ſpaſmodiques. Voyez *Spaſme*.
Mucoſité glaireuſe. Voyez *Glaires*.

N

Nauſées, 41. 84. 111. 135. 153. 179.
Noueure. Voyez *Rachitis*.

O

Obſtructions des Viſcéres, 12. 16. 43. 60. 69. 74. 77. 79. 80. 81. 136. 137. 178. 195. 196 200. 202. 208.
Deſcription & ſymptômes de cette Maladie, 81.
Oedéme, 123. 239. 249.
Ophthalmie, 133. 265. 328.
Opreſſion de Poitrine, 21. 27. 28. 75. 85. 121. 150. 202. 224. 274. 327.
Ouverture de Vaiſſeau dans les premiéres Voies, 45. 187.

P

Pales-Couleurs. Voyez *Jauniſſe.*
Palpitation de Cœur, 82.
Panaris, 263. 279. 296.
Paralyſie, 48. 49. 51. 196. 208. 209. 256.
de la Langue & du Goſier, 175. 269.
Pareſſe du Ventre. Voyez *Conſtipation.*
Paſſion hyſtérique. Voyez *Vapeurs.*
Iliaque. Voyez *Colique de* Miſerere.
Péripneumonie, 3. 5. 6. 7. 37. 50. 122. 123. 129, 134. 149. 159. *Ses ſymtômes*, 5.
Perte de Sang. Voyez *Hemorragie.*
Peſanteur d'Eſtomac, 126.
de Tête, 51. 175.
Phthiſie, 21. 22. 37. 44. 45. 61. 63. 68. 196. 203. 204. *Sa deſcription & ſes ſymptômes*, 22.
Pieds enflés, 14. 23. 82.
Pierre des Reins & de la Veſſie, 39. 213. 214. 329.
Piqûres d'Inſectes, 309. 321.
de l'Aponévroſe, 392.
du Périoſte, 394.
de l'Artére, 395.
du Tendon, 388.
Piſſement de Sang, 37. 107. 187. 212. 213. 214. 223. 224.
Pituite âcre & tenue, 10. 39. 148. 166.
viſqueuſe, 71. 79. 174. 175. 307.
Plaies, 47. 240. 279. 285. 287. 288. 293. 297. 317. 320.
Pléthore, 298.

Pleuréſie, 3. 4. 5. 6. 7. 37. 39. 50. 106. 108. 122. 123. 124. 257. 204. 245. 246. 247. 289. 324. *Ses ſymptômes.*
Poiſon du Belladona, 326.
Pourritures, 59. 61. 288.
Pus, 58.
Puſtules, 73.

R

Achitis, 171. 172. 259. 332.
Rage, 333.
Ralement, 158.
Raports aigres ou *amers*, 126.
Nidoreux, 36.
Redoublement, 18. 29. 35. 129.
Régime des Convaleſcens, 185. 186.
Régles trop abondantes. Voyez *Hémorragie Utérine*,
Relâchement du reſſort des Fibres de l'Eſtomac & des inteſtins, 43. 67. 75. 76. 77. 81. 94. 99. 109. 238.
ou *Chûte de la Luette*, 262.
Reſpiration laborieuſe ou *difficile.* Voyez *difficulté de reſpirer.*
Reſſerrement de Poitrine, 231.
Rétention d'Urine, 211. 248. 311. 312.
Rhumatiſme, 47. 48. 71. 149. 176. 220. 236. 237. 272. 288. 292. 317. 336.
Rhume, 21.
Rigidité, 77. 156.
Rougeole, 54. 103. *Sa deſcription*, 54.
Rougeur des Yeux, 264. 265.

S

Sables. Voyez *Gravelle.*
Saignement de Nez, 175. 187. 239. 305. 333.

Salure du Sang. 21. 22. 45.
Sang epais, tenace, viſqueux, 12. 49. 137.
couenneux, 105.
extravaſé, 47. 101. 240. 259. 309.
Sanie, 8.
Schirre du Foie & de la Rate, 57. 135. 295.
Sciatique. Voyez *Goutte.*
Scorbut, 7. 8. 9. 10. 89. 258. 259. 270.
Ses ſymptômes, 8.
Séchereſſe de Poitrine, 10.
Semences vermineuſes. Voyez *Vers.*
Séroſités, 48. 50. 68. 69. 119. 193. 220. 229. 254. 272. 284.
Soif, 15. 35. 76. 153. 199.
Spaſme, 99. 116. 149.
Sueur, 24. 40. 50. 107. 112. 129. 199. 215.
Superpurgation, ou *Purgation exceſſive*, 109. 128.
Supreſſion des Régles, 84. 115. 116. 117. 210. 227. 229. 414. *Symptômes de cette Maladie*, 84.
des Vuidanges, 28. 29. 240.
d'Urine, 44. 60.
Séparation des Plaies, 57. 58.
Surdité, 313.
Syncope, 56. 103. 112. 152. 160. 386.
d'un Enfant nouvellement né, 311.

T

TAches de la Peau, noires, ou *livides*, 8. 9.
rouges, 55.

Taies des Yeux, 265.
Teigne, 261. 328.
Tempérament ſec, bilieux, échauffé, 70. 72. 73. 78. 82. 83. 139. 177.
froid, humide, relâché, 71. 73. 78. 85. 127. 175. 196.
foible, délicat, 117. 128. 135. 137.
Teneſme, 96. 148.
Tenſion douloureuſe du Bas-Ventre, 29. 30. 56. 75. 96. 98. 125. 135. 236.
Thrombus, 388.
Tiraillemens de Poitrine, 34.
Toux, 4. 5. 10. 20. 21. 32. 35. 37. 40. 45. 46. 54. 60. 68. 121. 128. 149. 157. 166. 192. 232. 233.
violente ou convulſive des Enfans. Voyez *Coqueluche*.
Trachée-artére, ſéche & rude, 39.
Tranchées, 20. 29. 37. 65. 96. 128. 142. 153. 236.
Tranſpiration ſuprimée, 120.
Tranſport au Cerveau. Voyez *Délire*.
Tremblement, 56. 316.
Tubercules du Poumon, 61. 121. 203. 204.
Tumeur Carcinomateuſe. Voyez *Cancer*.
Eréſipélateuſe. Voyez *Ereſipéle*.
Lymphatique, 390.
Oedémateuſe. Voyez *Oedéme*.
Phlegmoneuſe, 54. 244.
Schirreuſe. Voyez *Schirre*.
Scrophuleuſe. Voyez *Ecrouelles*.
dure, 57. 245. 281. 282. 294.
& Ulcére des Mammelles, 279.
des Oreilles & ſous la Gorge, 278.
des Articulations, 310.

V

Vapeurs Hyſtériques, 110. 111. 112. 113. 114. 159. 227. 240. 298.
Deſcription & ſymptômes de cette Maladie, 111.
Veille exceſſive. Voyez *Inſomnie*.
Ventre dur & ſerré. Voyez *Conſtipation*.
Vents, 38. 41. 27. 88. 97. 98. 99. 111. 126. 179.
Vermine, 160. 328.
Vérole (*petite*) 54. 103. 133. 315. *Ses ſymptômes*, 54.
Vers, 55. 56 77. 144. 194. 220. 221. 232. 254 309. 313. 317. 335. *Deſcription & ſymptômes de cette Maladie*, 55.
Vertige, 27. 33. 34. 51. 71. 127. 133. 172. 176.
Vices cutanés. Voyez *Maladies de la Peau*.
Virus écrouelleux. Voyez *Ecrouelles*.
Viſcéres échauffés. Voyez *Chaleur interne*.
Ulcéres, 47. 50. 149. 175. 280. 281. 288. 289. 292. 361.
de la Cornée, 266.
des Jambes, 296.
chancreux. Voyez *Cancer*.
ichoreux, 320.
des Yeux, 266.
& démangeaiſon des Paupiéres, 265.
de la Bouche & du Goſier, 269.
du Poumon, 21. 45. 59. 60. 68.
internes du Bas-Ventre, 59.
des Reins & de la Veſſie, 37. 211.
Vomiſſement, 25. 27. 36. 37. 41. 48. 107. 110. 131. 132. 134. 137. 148. 166. 179.

Vomiſſement de Sang 135. 163. 187. 196. 225.
Urines ſanglantes. Voyez *Piſſement de Sang*
claires & aqueuſes, 16. 41. 75. 81.
fétides, 9.
groſſiéres, troubles & bourbeuſes, 9. 15. 41. 75. 76. 85.
rouges, 18. 41. 77. 84 129.
Vûe foible. Voyez *Foibleſſe de Vûe.*
Vuidanges immoderées. Voyez *Hémorragie Utérine.*

Fin de la Table des Maladies.

TABLE ALPHABETIQUE DES FORMULES

Contenues dans ce Manuel, & des Indications qu'elles rempliſſent.

APOZEME tempérant, *pag.* 1
contre la pleuréſie & la Péripneumonie, 3
anti-Scorbutique, *ou* contre le Scorbut, 6
pectoral adouciſſant, 10
ſolutif, ou laxatif, 11
apéritif & purgatif contre l'Hydropiſie, 12
fébrifuge-laxatif, 18

B

BISCUIT purgatif, 146
Bol purgatif, 181
contre la Dyſſenterie, 182
contre la Dyſſenterie, & les Pertes habituelles invétérées, *ibid.*
contre les Hydropiſies naiſſantes, & les Enflures qui viennent à la ſuite des longues Maladies & des Fiévres, 184
contre le crachement de Sang, & autres Hémorragies, 187
contre la Galle, 188
fortifiant & calmant, 189
Stomachique, *ibid.*
contre la Gangréne, 190
purgatif & anti-Aſthmatique, *ou* contre l'Aſthme, 191
Anti-Aſthmatique, & pour prévenir

l'Hydropisie de Poitrine, 192
Bol contre les Ecrouelles, 193
contre les vers, & sur-tout contre les Vers plats, 194
Bouillon, ou Eau de Veau, 66
rafraichissant, 67
pectoral-adoucissant, 168
tempérant & apéritif, 69
apéritif & laxatif, 70
contre l'Hémophthysie, *ou* le crachement de Sang, 73
contre les Maladies de la Peau, comme Pustules, Galles, Dartres, Demangeaisons, *ibid.*

C

CATAPLASME de mie de Pain, 244
émollient & maturatif, 245
anti-Pleurétique, *ou* contre la Pleurésie, *ibid.*
Cataplasme anti-Pleurétique de l'Hôpital de la Charité de Paris, 246
de Bec de Gruë contre l'Esquinancie, 247
contre la Rétention d'Urine, 248
contre l'Œdême & l'enflure des Jambes, 249
contre les engorgemens inflammatoires des Mammelles, *ibid.*
pour prévenir l'Avortement, 250
contre les Régles immodérées, 251
contre les Loupes, *ibid.*
contre la Goutte remontée, 252
contre la chute du Fondement, 253
contre les Vers, 245
Collyre rafraichissant contre la rougeur des Yeux, 264
contre l'Ophthalmie, *ou* inflammation des Yeux commençante, S. 6 265

Collyre contre la Rougeur, Chaſſie, Taie, & Ulcéres des Yeux, 66
contre l'Ulcére de la Cornée, *ibid.*
contre la foibleſſe & la rougeur des Yeux, 67

D

DEcoction blanche aſtringente, 19
pectorale contre la Toux, l'Opreſſion de Poitrine, & la Phthiſie commençante, 20
contre les Mois immodérés, *ou* Pertes, 22
Décoction contre la Leucophlegmatie, *ou* Bouffiſſure univerſelle, 24
purgative contre l'Hydropiſie-Aſcite, *ou* de Bas-ventre. 25
contre le Fleurs blanches, & les Hémorragies de la Matrice, 26
contre les douleurs après l'Accouchement, & la diminution ou ſupreſſion des vuidanges, 28

E

EAu minérale artificielle, pour les perſonnes d'un tempérament foible, 137
minérale artificielle, pour les perſonnes plus robuſtes attaquées des Pâles-couleurs, 138
Electuaire Lénitif, 216
Emplâtre Véſicatoire, 320
Véſicatoire adouci, 321
de Céruſe, *ou* deſſicatif, 323
fondant, 324
de Nuremberg, *ibid.*
Hyſtérique, 327
Emulſion commune, 62
contre la Phthiſie, 63

Emulsion narcotique, 64
purgative agréable, 65
purgative pour un Enfant de trois à quatre ans, 145

F

FOMENTATION émolliente, 235
contre le Rhumatisme, & les débilités de Nerfs, 237
contre l'Erésipéle, 238
contre le Saignement de nez, 239
aromatique contre l'enflure des Jambes, & les Tumeurs œdémateuses, 239
pour apaiser les douleurs après l'Accouchement, 240
contre la Gangréne, 241
contre les excoriations des Enfans par écoulement d'urine, & défaut de propreté, 242
contre la Contusion de l'œil, 243

G

GARGARISME rafraîchissant, 295
adoucissant, contre le Chancre & les petits ulcéres de la Bouche & du Gosier, 296
contre la Paralysie de la Langue & du Gosier, *ibid.*
anti-Scorbutique, *ou* contre le Scorbut, 297
contre l'inflammation des Amygdales, *ibid.*
Gargarisme contre l'Esquinancie œdémateuse, 298

H

HYDROMEL simple, 59
composé, 60
balsamique, contre la Phthisie, 16

I

INFUSION contre la Coqueluche des Enfans, 31
céphalique, contre les étourdiſſemens & menaces d'Apoplexie, 33
Julep ſomnifére, *ou* pour procurer le ſommeil, 147
contre l'Apoplexie, 151
anodin, contre la Dyſſenterie, 152
pour prévenir l'Avortement, 154
pour faire ſortir le fœtus mort, 155

L

LAVEMENT commun, *ou* émollient, 91
émollient & rafraîchiſſant, 92
laxatif, *ibid.*
dans les grandes Conſtipations, 93
purgatif commun, *ibid.*
purgatif majeur, contre l'Apoplexie, & autres affections ſoporeuſes, *ibid.*
Lavement fébrifuge, 95
anodin, *ou* adouciſſant, 96
carminatif, contre la Colique venteuſe, 97
contre la Colique Néphrétique, 98
contre les Coliques violentes & opiniâtres, 99
Liniment contre les Rhumatiſmes, 254
contre la Paralyſie, & les débilités de Nerfs, 255
contre les Contuſions & douleurs internes venant de chûtes, ou de coups reçus, 256
contre les Hémorroïdes gonflées & douloureuſes, 257
anti-Scorbutique, *ou* contre le Scorbut, 258

contre les entorſes, & les foulures de Tendons & de Nerfs, *ibid.*
contre le Rachitis, *ou* la Noueure des Enfans, 259
contre les Galles du Nez des Enfans, 260
contres la Vermine, & les différens inſectes qui attaquent le Corps humain, *ibid.*
contre la Teigne, 261
contre le relâchement ou la chute de la Luette, 262
contre le Panaris, *ibid.*
Lohoch commun, 157
anti-Aſthmatique, *ou* contre l'Aſthme, *ibid*
dans la Péripneumonie, lorſque l'expectoration eſt ſuprimée, 158
contre l'Eſquinancie, 159
contre l'Hémophthyſie, *ou* le crachement de Sang. 163

O

ONGUENT contre la Goutte Sciatique, & les Rhumatiſmes, 272
contre les Galle, Gratelle, & Démangeaiſons, 273
pour faciliter l'éruption ou la ſortie des Dents des Enfans, 276
contre la Brulure, *ibid.*
contre les Humeurs froides, 277
noir, émollient, fondant & réſolutif, 278
ou Beaume d'*Arcæus*, 280
de la Mer, *ou* Onguent brun, 281
de Styrax, 282
véſicatoire perpétuel, dans les Fluxions & douleurs opiniâtres des Yeux, 283
digeſtif ſimple, 284
ſupuratif *ou* Baſilicum, 285
adouciſſant *ou* Onguent Roſat, *ibid.*

deſſicatif, *ou* Onguent blanc de Rhaſis, 287
Onguent déterſif, *ou* Ægyptiac, *ibid.*
pour les Bleſſures, les Ulcéres gangrénés ou avec carie, 288
contre les Dartres rongeantes, 289
Opiate martiale-fondante & purgative contre les Obſtructions, 195
apéritive & purgative contre l'Hydropiſie, 197
fébrifuge & purgative, 198
contre la Fiévre-quarte, 201
fébrifuge pour les Poitrines délicates, *ib.*
fondante, contre les Tubercules du Poumon, 203
contre la Phthiſie, 204
anti-Aſthmatique, *ou* contre l'Aſthme, *ib.*
Mézentérique, *ou* contre les Obſtructions du Mézentére, 207
contre l'Apoplexie, la Paralyſie, & autres affections des Nerfs, 208
anti-Epileptique, *ou* contre l'Epilepſie, 210
contre la Néphrétique, difficulté & ardeur d'Urine, 211
contre la Néphrétique, l'ardeur d'Urine, & les Urines ſanglantes, 212
pour prévenir l'Avortement, 213
contre les Hémorroïdes, 214
contre la Jauniſſe, 215

P

PILULES purgatives-univerſelles, 218
Hydragogues, *ou* contre l'Hydropiſie, 219
vermifuges-purgatives, 221
anti-Aſthmatiques, ou contre l'Aſthme, 222

contre les embarras des Reins, la Colique Néphrétique, & les Urines sanglantes, 223
contre les Pertes, & autres Hémorragies, 224
contre les supressions des Régles invétérées, 226
anti-Hystériques, *ou* contre les Vapeurs, 227
anti-Caterrales, contre la Toux nocturne, 129
Potions Altérantes, ou *Correctives.*
Potion cordiale, 402
contre l'Hémophthysie, *ou* le crachement de Sang. 103
contre la Pleurésie, 104
huileuse, contre la Néphrétique, 106
contre le Vomissement, 107
diaphorétique-anodine, 108
Potion anodine-astringente, 109
vulnéraire, contre les Chutes & les Contusions, *ibid.*
anti-Hystérique, *ou* contre les Vapeurs, 111
diurétique, contre l'Hydropisie, 114
pour apaiser les douleurs après l'Accouchement. *ibid.*
contre la supression subite des Régles, 115
pour faire sortir une portion d'arriére-faix, *ibid.*
contre les Convulsions des Enfans, 116
Potions Purgatives.
Potion purgative-commune, *ibid.*
purgative-commune, qui peut servir à une Femme grosse, 117

Potion purgative-moyenne, 117
purgative-majeure, 118
Hydragogue, *ou* contre l'Hydropisie, *ibid.*
purgative, astringente, 119
laxative, contre l'Asthme, 121
huileuse-laxative, dans la Fluxion de Poitrine & la Pleurésie, 123
laxative-douce, *ou* Eau de Casse simple, 124
pour exciter les douleurs dans un Accouchement difficile, 125
Potion, ou Eau Minérale-Emétique, 131
ou Eau de Casse composée avec les grains d'Emétique, 132
Potions purgatives pour les Enfans, 139
pour un Enfant de quatre mois, 142
pour un Enfant de huit mois, qui a des tranchées, 143
pour un Enfant de dix-huit mois, *ibid.*
pour un Enfant de trois ans, *ibid.*
pour un Enfant de six ans, auquel on soupçonne des Vers, 144
pour un Enfant de huit à dix ans, *ibid.*
Potion tempérante, 164
absorbante, 165
contre l'Epilepsie, 167
contre les Convulsions des Enfans, 171
contre le *Rachitis*, & l'Atrophie des Enfans, *ibid.*
anti-Asthmatique, *ou* contre l'Asthme, 172
contre l'Esquinancie, 173
sternutatoire, dans l'Apoplexie, *ibid.*
dans le même cas, 174
contre la Pituite visqueuse du Cerveau, & les maux de Tête invétérés, *ibid.*
Poudre Ophthalmie, contre la foiblesse de

la Vûe, 176
Poudre Æthiopique, contre les Dartres, Galles, & autres Maladies de la Peau, 177
contre la Jauniſſe, & le défaut des Régles, 178
contre les Fleurs blanches, *ibid.*
contre les Nauſées & Vomiſſemens des Femmes groſſes, 179
contre les Flatuoſités de l'Eſtomac, *ibid.*
purgative-univerſelle, 180
Préparation de la Craie, 165
des Coquilles d'Huître, 166
du Verre d'Antimoine avec la Cire, 184
de l'Eau de Chaux, 243
Tiſane commune, 34
rafraîchiſſante, avec le Citron, 36
tempérante & apéritive, autrement dite Tiſane de Santé, 38
pectorale-adouciſſante, 39
diurétique-adouciſſante, contre la Colique Néphrétique, 40
de Patience, 42
apéritive, 43
aſtringente, contre l'Hémophthyſie, *ou* le crachement de Sang, & les Hémorragies, 44
vulnéraire, 46
Tiſane ſudorifique, 48
ſudorifique & laxative, 49
contre l'Apoplexie & la Paralyſie, ou autres affections des Nerfs, 51
dans la Rougeole & la petite-Vérole, 54
contre les Vers, 55
contre les Humeurs froides, *ou* Ecrouelles 57

R

REMARQUES générales sur l'usage de la Tisane dans les Maladies aigues, 35
sur l'usage des Sudorifiques ; 49
sur ce qu'on apelle Corps humides & pituiteux, 71
sur la nature des Indigestions, 75 & 77
sur l'usage du Quinquina dans les Fiévres intermittentes, 195 & 202
sur l'usage des Purgatifs, 126
sur l'usage de l'Emétique, 132
sur l'usage de l'Opium, 148
sur les Remédes internes, 234

S

SUPOSITOIRE simple, ou commun, 100
Supositoire composé & purgatif, 101
contre les Ascarides ou petits Vers blancs, qui sont souvent logés dans le Fondement des Enfans, *ibid.*

T

TABLETTES Martiales-apéritives, contre les Pâles-couleurs, 230
anti-Asthmatiques, *ou* contre l'Asthme, 232
vermifuges-purgatives, *ibid.*
pectorales, 233

V

VIN Enulé-Stomachique, 75
d'Absinthe, 75
diurétique, contre l'Hydropisie, 78
apéritif & purgatif contre l'Hydropisie, 80
apéritif & laxatif contre les Obstructions, 81
pour procurer les Régles, 83
contre la Colique Néphrétique, la Gravelle & les glaires de la Vessie, 86
contre les Hernies des Enfans, 88
anti-Scorbutique, *ou* contre le Scorbut, 89

Fin de la Table des Remédes.